

# Stapfia<sup>\*</sup>

Publikation der  
Botanischen Arbeitsgemeinschaft am O.Ö.  
Landesmuseum Linz

## BEITRÄGE ZUR FLORA DER TÜRKEI II

von Friederike Sorger



BEITRÄGE ZUR FLORA DER TÜRKEI II  
=====

Inhaltsverzeichnis

1. Neue Fundorte von Arten der in Davis  
"FLORA of TURKEY" Band 1,2 und 3 be-  
handelten Familien. ... Seite 3
2. Die Ergebnisse meiner Sammelreisen im  
Bergland westlich des Beyşehirsees. ... Seite 89



Neue Fundorte von Arten der in Davis "FLORA of TURKEY"  
Band 1,2 und 3 behandelten Familien.

In der vorliegenden Arbeit sind die Funde meiner Reisen bis einschließlich 1977 berücksichtigt.

Aufgenommen sind in dieser Aufzählung nur jene Arten mit Fundorten, die in den Arbeiten von Davis "Flora of Turkey", Band 1 bis 3 und in den Veröffentlichungen von Huber-Morath, Baytop, Quezel et al. und der Universität Ankara (siehe Literaturverzeichnis) noch nicht publiziert worden sind.

Arten, die neu für ein Rasterfeld der von P.H.Davis verwendeten geographischen Einteilung (Felder von je 2 Grad Länge und Breite) sind, wurden durch ein Kreuz(+) vor der Feldbezeichnung hervorgehoben. Die übrigen angeführten Belege wurden zwar für das betreffende Feld bereits zitiert, sind jedoch Neufunde für den darin liegenden genannten Provinzteil.

Für die Revision vieler Belege bin ich P.H.Davis und seinen Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet. Ein spezieller Dank gebührt Dr. Huber-Morath (Basel), der viele meiner Belege bearbeitete. M.N. Chaudhri (Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan) bestimmte alle Illecebraceen-Belege, wofür ich ihm herzlich danke. Während seines Aufenthaltes in Wien durfte ich Herrn Dr. K. Browicz (Poznan, Polen) meine sämtlichen Gehölzpflanzen-Belege zur Revision vorlegen. Für die Bestimmung der Hypericum-Belege danke ich Dr. N.K.B. Robson (British Museum).

Besonders möchte ich auch Herrn K.Fitz (Naturh. Museum, Wien) für die vielen Literatur-Hinweise und die unermüdliche Hilfe beim Bestimmen danken. Ferner schulde ich großen Dank Herrn Ing.J.Donner, der sich der mühevollen Arbeit unterzog, die Listen der Arten aus meinen floristischen Aufzeichnungen zusammenzustellen.

Verwendete Abkürzungen:

- E = Osten oder östlich von
- N = Norden oder nördlich von
- W = Westen oder westlich von
- S = Süden oder südlich von
- D = Dağ (Berg)

P T E R I D O P H Y T A

## EQUISETALES

## EQUISETACEAE

EQUISETUM L.

2.E.ramosissimum Desf.

C6 Adana: Karatepe, feuchter Graben

23.6.1971 50 m 71-31-17

## SELAGINELLALES

## ISOETACEAE

ISOETES L.

1.I.olympica A.Braun

+ A4 Ankara: 26 km N Kizilçahamam, Quellfluren

24.6.1970 1550 m 70-5-119

## FILICALES

## SINOPTERIDACEAE

4.CHEILANTHES Swartz

2.C.persica (Bory) Kuhn

+ B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht

26.6.1971 1600 m 71-49-35

C6 Adana: 14 km E Osmaniye, Bachrand, Fels

24.6.1971 900 m 71-34-30

3.C.marantae (L.) Domin

+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde

16.7.1969 1400 m 69-59-15

## ADIANTACEAE

5.ADIANTUM L.

1.A.capillus-veneris L.

C6 Maraş: 1 km S Andirin, Bachrand

3.6.1973 700 m 73-17-1

## GYMNOGRAMMACEAE

8.ANOGRAMMA Link

1.A.leptophylla (L.) Link

C4 Konya: Sertavul-Paß, Felswände

9.6.1966 1610 m 66-34-30

## HYPOLEPIDACEAE

9.PTERIDIUM Scop.

1.P.aquilinum (L.) Kuhn

+ C6 Adana: 14 km E Osmaniye, Mischwald

24.6.1971 900 m 71-34-28

C6 Maraş: W Çokak, Ağça D., Waldrand

2.6.1973 1400 m 73-15-3

## ASPLENIACEAE

11.ASPLENIUM L.

1.A.trichomanes L.

C6 Malatya: 31 km NE Gölbaşı, Bachrand

25.6.1971 1250 m 71-44-7

10.A.ruta-muraria L.

A5 Çorum: Boğazkale, Fels

16.6.1971 1000 m 71-7-42

+ B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht

26.6.1971 1600 m 71-49-34

11.A.haussknechtii God. &amp; Reut.

C5 Adana: Tekir Tepesi, Felswände

2.6.1962 1268 m 62-68-45

12.CETERACH DC.

ASPLENIACEAE

1.C.officinarum DC.

A5 Çorum: Boğazkale, Fels

16.6.1971 1000 m 71-7-43

ATHYRIACEAE

14.ATHYRIUM Roth2.A.distentifolium Tausch ex Opiz

+ A2 Bursa: Ulu D., Felshöhlenwand

8.8.1976 2300 m 76-36-15

ASPIDIACEAE

18.POLYSTICHUM Adans.3.P.aculeatum (L.) Roth

+ A2 Bursa: Ulu D., Felsfluren

8.8.1976 2200 m 76-36-53

19.DRYOPTERIS Adans.1.D.filix-mas (L.) Schott

+ B9 Bitlis: 15 km S Küçüksu, Felshang

5.9.1977 1850 m 77-98-8

2.D.borreri Newm.

+ A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Laubmischwald

3.7.1969 1300 m 69-13-49

4.D.pallida (Bory) Fomin

C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang

1.6.1973 1000 m 73-13-3

S P E R M A T O P H Y T A

## GYMNOSPERMAE

PINACEAE

4.PINUS L.1.P.sylvestris L.

A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D., Felssteppe

13.7.1969 1800 m 69-52-13

2.P.nigra Arn.

ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Wald

5.6.1973 1600 m 73-21-118

C 6 Maraş: W Çokak, Wald

2.6.1973 1500 m 73-15-81

3.P.brutia Ten.

A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, offener Bestand

14.5.1963 300 m 63-2-14

CUPRESSACEAE

2.JUNIPERUS L.1.J.drupacea Lab.

C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang

1.6.1973 1000 m 73-13-5

4.J.oxycedrus L.

ssp. oxycedrus

A3 Ankara: 2 km E Nallihan, Gebüschveget.

14.6.1973 700 m 73-43-5

A4 Ankara: 16 km E Ayaş, Steppenhügel

14.6.1973 1195 m 73-41-17

B6 Maraş: 19 km E Göksun, Pinus pall.-Wald

31.8.1977 1330 m 77-79-10

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Laubwald

5.6.1973 1200 m 73-21-31

## JUNIPERUS (Forts.)

## CUPRESSACEAE

6. *J. foetidissima* Willd.+ A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D., Felssteppe  
13.7.1969 1800 m 69-52-128. *J. excelsa* Bieb.+ B6 Sivas: 42 km N Gürün, NW-expon. Steppenhang  
1.7.1970 1700 m 70-33-77

## ANGIOSPERMAE

## DICOTYLEDONES

## 1. RANUNCULACEAE

1. *HELLEBORUS* L.2. *H. orientalis* Lam.A2 Bursa: 25 km E Söğütalan, S Uluabat-Gölü,  
Laubwald  
26.6.1977 500 m 77-6-193. *NIGELLA* L.2. *N. oxypetala* Boiss.+ B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Feld  
9.7.1969 1500 m 69-42-128+ C4 Konya: 21 km N Karaman, Feldrand  
9.6.1966 1000 m 66-36-22+ C5 Niğde: 5 km W Ulukışla, Brache  
1.6.1962 1200 m 62-65-25. *N. arvensis* L.var. *glauca* Boiss.B3 Eskişehir: 16 km E Eskişehir, Artemisia-Steppe  
7.8.1976 900 m 76-33-8B3 Isparta: 6 km S Şarki Karaağaç, Brache  
17.7.1968 1150 m 68-40-12B5 Nevşehir: Göreme, sandiges Tal  
26.8.1977 1200 m 77-68-44B5 Yozgat: 48 km W Yozgat, Peganum-Steppe  
28.7.1976 700 m 76-6-69. *N. damascena* L.A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Waldrand  
29.5.1966 100 m 66-2-611. *N. nigellastrum* (L.) Willk.A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Ruderalvegetation  
15.6.1971 900 m 71-5-28C6 Adana: 3 km SE Kadirli, Myrthus-Macchie  
22.6.1971 100 m 71-29-126. *CALTHA* L.1. *C. polypetala* Hochst. ex Lorent+ A6 Sivas: Yıldız D., Bachrand  
15.7.1969 1800 m 69-58-878. *DELPHINIUM* L.10. *D. albiflorum* DC.+ B6 Sivas: E Gök Pinar, ebene Steinsteppe  
3.8.1976 1800 m 76-21-1618. *D. peregrinum* L.+ B6 Maraş: 19 km E Göksun, Pinus pall.-Wald  
31.8.1977 1330 m 77-79-721. *D. venulosum* Boiss.B5 Nevşehir: 10 km SE Ürgüp, Marillenkultur  
16.7.1969 1300 m 69-62-222. *D. cinereum* Boiss.+ B5 Yozgat: 49 km W Yozgat, Peganum-Steppe  
28.7.1976 700 m 76-6-3

9. CONSOLIDA (DC.) S.F. Gray

1. RANUNCULACEAE

1. *C. aconiti* (L.) Lindley  
 A1 Tekirdağ: 15 km N Şarköy, Eichenbuschwald  
 23.6.1977 400 m 77-3-3
4. *C. scleroclada* (Boiss.) Schröd.  
 var. *scleroclada*  
 + B5 Kayseri: 2 km W Incesu, Stausee  
 13.7.1977 1100 m 77-44-2
8. *C. orientalis* (Gay) Schröd.  
 B4 Konya: 53 km N Konya, Feldrand  
 29.5.1973 1000 m 73-3-33  
 B7 Sivas: 2 km N Mursal, N Yama Dağları, Feldrand  
 1.8.1977 1650 m 76-12-9
12. *C. glandulosa* (Boiss. & Huet) Bornm.  
 + A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde  
 16.7.1969 1400 m 69-59-26
16. *C. cruciata* (Davis & Hossain) Davis  
 + C4 İçel: 6 km S Uzuncaburç, offener  
 Pinus brutia-Wald  
 21.6.1971 500 m 71-25-40
20. *C. hellespontica* (Boiss.) Chater  
 B5 Nevşehir: 4 km S Avanos, Brache  
 29.6.1971 1200 m 71-57-6

10. ANEMONE L.

2. *A. blanda* Schott & Kotschy  
 C6 Maraş: W Çokak, Gebirgssteppe  
 2.6.1973 1700 m 73-15-61

11. CLEMATIS L.

1. *C. vitalba* L.  
 A3 Sakarya: 22 km W Taraklı, Steilhänge  
 29.6.1977 500 m 77-12-4
2. *C. flammula* L.  
 C6 Adana: Karatepe, medit. Vegetation  
 23.6.1971 100 m 71-31-54
3. *C. orientalis* L.  
 B5 Nevşehir: Göreme, sandiges Tal  
 26.8.1977 1200 m 77-68-19  
 B7 Malatya: 22 km SW Malatya, Senke im Kulturland  
 1.9.1977 980 m 77-82-2

12. ADONIS L.

8. *A. eriocalycina* Boiss.  
 + B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Kalkmergel-  
 Steppenhügel  
 9.7.1969 1500 m 69-42-125

13. RANUNCULUS L.

2. *R. sericeus* Banks & Sol.  
 C6 Malatya: 31 km NE Gölbaşı, Bachrand  
 25.6.1971 1250 m 71-44-14
18. *R. neapolitanus* Ten.  
 C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brachen  
 1.6.1973 900 m 73-14-43
20. *R. repens* L.  
 A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, feuchte Wiesen  
 14.6.1971 1550 m 71-3-45  
 B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer  
 4.7.1968 1300 m 68-15-48  
 + B6 Sivas: Gök Pinar, feuchte Wiesen  
 10.6.1973 1600 m 73-35-19

## RANUNCULUS (Forts.)

## 1. RANUNCULACEAE

21. *R. polyanthemos* L.

A5 Sinop: 20 km N Boyabat, offener  
Pinus sylv.-Wald

5.7.1969 1400 m 69-17-26

B6 Sivas: 8 km N Sivas, feuchte Wiesen

26.6.1970 1350 m 70-19-40

26. *R. constantinopolitanus* (DC.) d'Urv.

A6 Sivas: Yildiz D., Bachrand

29.7.1976 1700 m 76-7-30

C3 Isparta: Dedegöl D., feuchte Wiesen

7.7.1970 1300 m 70-45-19

32. *R. sprunerianus* Boiss.

C3 Isparta: Dedegöl D., Schutthalden

15.6.1966 1700 m 66-46-26

35. *R. argyreus* Boiss.

B4 Ankara: 42 km NW Kulu, breiter Feldrand

29.5.1973 900 m 73-2-19

36. *R. cuneatus* Boiss.

B6 Sivas: Gök Pinar, Steinsteppe

10.6.1973 1800 m 73-33-52

+ C7 Adiyaman: Nemrut D., Felssteppe

8.6.1973 2140 m 73-29-42

47. *R. cadmicus* Boiss.

+ C6 Maraş: W Çokak, Felssteppe

2.6.1973 1700 m 73-15-62

63. *R. arvensis* L.

B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand

25.6.1971 1400 m 71-47-23

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brachen

1.6.1973 900 m 73-14-44

14. *CERATOCEPHALUS* Moench1. *C. falcatus* (L.) Pers.

A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache

8.7.1969 950 m 69-32-20

2. *C. testiculatus* (Crantz) Roth

+ A6 Sivas: Sariyar (NE Çirçir), Feldrand

15.7.1969 1500 m 69-57-26

+ B7 Sivas: Yama Dağları, felsig-steiniger Hang

1.8.1976 2000 m 76-16-25

17. *THALICTRUM* L.6. *T. minus* L.

var. *majus* (Crantz) Crépin

B7 Sivas: Yama Dağları, vegetationsreiches  
steiniges Gelände

1.8.1976 1700 m 76-13-58

B9 Van: 10 km N Gevaş, Salvia-Wiese

3.9.1977 1750 m 77-89-3

7. *T. lucidum* L.

A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Damm

27.6.1977 4 m 77-8-46

## 2. PAEONIACEAE

*PAEONIA* L.1. *P. mascula* (L.) Miller

ssp. *arietina* (Anders.) Cullen & Heywood

+ A6 Sivas: 36 km NE Sivas, Fuß des

Kunduz D., Bachrand

13.7.1969 1500 m 69-54-12

## 3. NYMPHAEACEAE

2. NYMPHAEA L.1. *N. alba* L.

- + A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Seeufer  
27.6.1977 4 m 77-8-28

## 5. PAPAVERACEAE

2. GLAUCIUM Adans.1. *G. corniculatum* (L.) Rud.ssp. *refractum* (Náb.) Cullen

B6 Sivas: Gök Pinar, Brache

26.6.1971 1600 m 71-53-7

5. *G. leiocarpum* Boiss.

C4 Içel: 11 km SW Mut, Steppenhügel

19.6.1971 250 m 71-20-15

7. *G. cappadocicum* Boiss.

+ B6 Sivas: E Gök Pinar, Brache

26.6.1971 1600 m 71-53-63

4. PAPAVER Adans.8. *P. strictum* Boiss. & Bal.

+ C3 Isparta: Dedegöl D., Schutthalden

3.7.1965 1600 m 65-43-73

10. *P. tauricola* Boiss.

B7 Sivas: Yama Dağları, Steinsteppe

1.8.1976 1700 m 76-13-45

+ C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde

25.6.1971 1510 m 71-45-29

12. *P. triniifolium* Boiss.

+ A4 Ankara: 16 km E Ayaş, Steppenhügel

14.6.1973 1195 m 73-41-42

+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde

16.7.1969 1400 m 69-59-20

+ B5 Nevşehir: 2 km SE Avanos, sandiger

Steppenhügel

29.6.1971 1200 m 71-58-6

14. *P. fugax* Poiretvar. *fugax*

+ B6 Sivas: Gök Pinar, sandige Steilhänge

3.8.1976 1700 m 76-21-30

C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhang

25.6.1971 1180 m 71-43-18

15. *P. cylindricum* Cullen

B9 Van: S-Ufer Erçek-Gölü, Feldrand

3.9.1977 1850 m 77-88-10

21. *P. macrostomum* Boiss. & Huet ex Boiss.

+ B3 Afyon: 8 km S Dinar, Brache

7.6.1964 900 m 64-45-2

C5 Niğde: 3 km S Çaykavak-Paß, Brache

9.7.1977 1400 m 77-30-7

22. *P. rhoeas* L.

B1 Izmir: 11 km S Aliağa, Garigues

30.5.1966 100 m 66-5-21

28. *P. dubium* L.

A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel

16.6.1971 1000 m 71-7-56

B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand

26.6.1971 1400 m 71-47-17

## PAPAVER (Forts.)

## 5. PAPAVERACEAE

31. *P. clavatum* Boiss. & Hausskn. ex Boiss.C6 Malatya: 31 km NE Gölbaşı, sandiger  
Steppenhänge

25.6.1971 1250 m 71-44-13

32. *P. argemone* L.

+ A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel

16.6.1971 1000 m 71-7-57

5. HYPECOUM L.2. *H. imberbe* Sibth. & Sm.

B2 Izmir: Boz D., Gölçük, Seeufer

4.7.1968 1300 m 68-15-32

3. *H. pendulum* L.

+ C3 Isparta: Fuß des Çiçek D., Feldrand

16.6.1967 1300 m 67-3-34

6. CORYDALIS Medik.6. *C. solida* (L.) Swartzssp. *brachyloba* (Boiss.) Cullen & Davis

+ C6 Maraş: W Çokak, Schutthalde

2.6.1973 1700 m 73-15-54

7. FUMARIA L.10. *F. officinalis* L.

+ C4 İçel: 24 km E Mut, Felshöhle

19.6.1971 1000 m 71-19-2

C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang

1.6.1973 900 m 73-13-41

13. *F. vaillantii* Lois.

+ B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz

4.7.1970 1250 m 70-37-26

B6 Sivas: 8 km N Sivas, Brache

28.6.1970 1350 m 70-19-29

14. *F. parviflora* Lam.

+ B3 Konya: 14 km S Akşehir, Felssteppe

19.7.1968 1300 m 68-46-33

15. *F. asepala* Boiss.

C4 İçel: 18 km E Mut, offener Pinus brutia-Wald

19.6.1971 1100 m 71-17-20

+ C4 Konya: Sertavul-Paß, Steppe

17.6.1971 1610 m 71-10-30

## 6. CRUCIFERAE

1. BRASSICA L.2. *B. elongata* Ehrh.

A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel

15.6.1971 900 m 71-5-7

B5 Nevşehir: 20 km SW Nevşehir, felsiger  
Steppenhügel

29.6.1971 1200 m 71-60-4

4. *B. nigra* (L.) Koch

+ C5 Adana: ca. 12 km SW Kadirli, Feldrand

23.6.1971 100 m 71-32-1

2. SINAPIS L.1. *S. alba* L.

+ B2 Izmir: Boz D., Gölçük, Seeufer

4.7.1968 1300 m 68-15-8

2. *S. arvensis* L.

+ A6 Sivas: NE Çirçir, Feldrand

15.7.1969 1500 m 69-57-13

4. DIPLLOTAXIS DC.

## 6. CRUCIFERAE

1. D. tenuifolia (L.) DC.

- + B5 Nevşehir: Göreme, sandiges Tal  
26.8.1977 1200 m 77-68-23
- + C4 Konya: 4 km N Çumra, Rand einer Schottergrube  
29.5.1973 1020 m 73-5-12

10. RAPISTRUM Crantz1. R. rugosum (L.) All.

- + A3 Bolu: 26 km W Gerede, Feldrand  
13.6.1971 1000 m 71-2-19

13. CONRINGIA Adans.2. C. orientalis (L.) Andr.

- + B5 Niğde: W Aksaray, Brache  
30.6.1971 980 m 71-61-4

6. C. perfoliata (C.A. Mey.) Busch

- + B5 Nevşehir: 8 km NW Ürgüp, Sandsteppe  
12.6.1973 1200 m 73-39-18

14. LEPIDIUM L.1. L. campestre (L.) R. Br.

- + C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brache  
1.6.1973 900 m 73-14-26

4. L. sativum L.

## ssp. sativum

- A4 Ankara: Kizilcahamam-Çeltikçi, Flußtal  
23.8.1977 950 m 77-59-21

## ssp. spinescens (DC.) Thell.

- B8 Elazığ: 40 km W Bingöl, Felsblockhalde  
1.9.1977 1350 m 77-83-8

6. L. perfoliatum L.

- + B5 Nevşehir: 20 km SW Nevşehir, felsiger Steppenhügel  
29.6.1971 1200 m 71-60-5

9. L. cartilagineum (J. May.) Thell.

## ssp. cartilagineum

- + B5 Kayseri: Incesu-Develi, Salzsteppe  
12.7.1977 1100 m 77-39-9

15. CARDARIA Desv.1. C. draba (L.) Desv.

## ssp. chalepensis (L.) O.E. Schulz

- C4 Içel: 25 km E Mut, Feldrand  
19.6.1971 1000 m 71-18-9

16. CORONOPUS Zinn1. C. squamatus (Forssk.) Aschers.

- + A1 Çanakkale: W Şarköy, Brunnen  
23.6.1977 100 m 77-2-1

17. ISATIS L.1. I. cappadocica Desv.

## ssp. cappadocica

- + C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhang  
25.6.1971 1180 m 71-43-12

## ssp. subradiata (Rupr.) Davis

## var. subradiata

- + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D., Felssteppe  
13.7.1969 1800 m 69-52-15

6. I. candolleana Boiss.

- + A6 Sivas: Yildiz D., offener Eichenbuschwald  
15.7.1969 2000 m 69-58-59

## ISATIS (Forts.)

## 6. CRUCIFERAE

9. *I. aucheri* Boiss.

B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht  
26.6.1971 1600 m 71-49-32

11. *I. glauca* Aucher ex Boiss.

ssp. *glauca*

B5 Kayseri: 2 km W Incesu, Stausee  
13.7.1977 1100 m 77-44-4

+ B5 Nevşehir: Göreme, lockerer Sandstein  
6.8.1976 1200 m 76-30-7

+ B6 Sivas: 30 km S Kangal, Weizenfeld  
2.8.1976 1500 m 76-18-6

14. *I. tinctoria* L.

ssp. *corymbosa* (Boiss.) Davis

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, offener Laubwald  
5.6.1973 1200 m 73-21-40

26. *I. buschiana* Schischkin

+ B4 Konya: 60 km N Konya, Feldrand  
17.6.1971 950 m 71-8-1

+ B6 Sivas: 3 km E Gürün, Straßenböschung  
8.9.1977 1260 m 77-103-9

21. *IBERIS* L.3. *I. attica* Jord.

C6 Adana: E Yarpuz, offener Laubwald  
5.6.1973 1200 m 73-21-69

5. *I. taurica* DC.

+ A3 Bilecik: 14 km N Bilecik, Pinus brutia-Wald  
22.5.1962 600 m 62-17-6

+ A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache  
8.7.1969 950 m 69-32-4

B6 Adana: 16 km E Ayaş, Steppenhänge  
17.7.1977 1190 m 77-56-28

22. *HELDREICHIA* Boiss.1. *H. rotundifolia* Boiss.

B7 Sivas: Yama Dağları, NE-expon. Schutthalde  
1.8.1976 2000 m 76-14-19

24. *AETHIONEMA* R.Br.5. *Ae. arabicum* (L.) Andrzej. ex DC.

A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
13.7.1969 1500 m 69-50-4

C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhänge  
25.6.1971 1180 m 71-43-10

9. *Ae. eunomioides* (Boiss.) Bornm.

C6 Maraş: W Çokak, Felsspalte  
2.6.1973 1900 m 73-15-29

19. *Ae. iberideum* (Boiss.) Boiss.

+ A6 Sivas: Yıldız D., Felssteppe  
15.7.1969 2000 m 69-58-53

+ C7 Adıyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe  
8.6.1973 2140 m 73-29-26

20. *Ae. caespitosum* (Boiss.) Boiss.

+ A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D.,  
Felsgesellschaft  
13.7.1969 1900 m 69-53-9

24. *Ae. schistosum* Boiss. & Kotschy

B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, felsige Steilhänge  
7.7.1977 1400 m 77-27-2

## AETHIONEMA (Forts.)

## 6.CRUCIFERAE

## 25.Ae.capitatum Boiss.&amp; Bal.

B6 Sivas: Gök Pinar, sandiger Steppenhang  
26.6.1971 1800 m 71-51-25

## 27.Ae.armenum Boiss.

A4 Ankara: 16 km E Ayaş, sandiger Steppenhügel  
14.6.1973 1195 m 73-41-20

## 29.Ae.grandiflorum Boiss.&amp; Hohen.

B7 Sivas: Yama Dağları, Schutthalden  
1.8.1976 2000 m 76-14-2

25.THLASPI L.

## 10.T.violascens Boiss.

+ B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, Felswand  
7.7.1977 1400 m 77-27-50  
+ C6 Adana: E Yarpuz, offener Laubwald  
5.6.1973 1600 m 73-21-41

## 15.T.lilacinum Boiss.&amp; Huet

A6 Sivas: Yıldız D., Felssteppen  
15.7.1969 2000 m 69-58-60

## 21.T.ceratocarpon Murray

+ B6 Sivas: 36 km W Gürün, feuchte Wiesen  
27.6.1971 1750 m 71-54-3

## 22.T.oxyceras (Boiss.) Hedge

+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde  
16.7.1969 1400 m 69-59-13  
+ B9 Bitlis: 25 km S Bitlis, Schutthalde  
5.9.1977 1600 m 77-95-13

33.OCHTHODIUM DC.

## 1.O.aegyptiacum (L.) DC.

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Feldrand  
1.6.1973 900 m 73-14-24

43.RICOTIA L.

## 6.R.aucherii (Boiss.) B.L. Burt

+ C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhang  
25.6.1971 1180 m 71-43-11

46.FIBIGIA Medik.

## 1.F.clypeata (L.) Medik.

+ A3 Bolu: 11 km E Göynük, Waldrand  
14.6.1973 800 m 73-45-3  
A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-38

## 2.F.macrocarpa (Boiss.) Boiss.

B6 Malatya: 35 km SE Darende, Felssteppe  
25.6.1971 1400 m 71-47-11  
B7 Sivas: 14 km N Divriği, S-expon. Steppenhang  
30.6.1970 1250 m 70-30-2

## 3.F.eriocarpa (DC.) Boiss.

+ A4 Ankara: 16 km N Kizilcahamam, felsige Schlucht  
16.7.1977 1200 m 77-54-6  
C6 Maraş: 10 km N Andirin, Mischwald  
31.5.1973 1000 m 73-12-15

49.BERTEROA DC.

## 2.B.orbiculata DC.

+ B1 Izmir: 28 km SW Bergama, Straßenrand  
3.7.1967 50 m 67-45-2

51. ALYSSUM L.

## 6. CRUCIFERAE

2. *A. meniocoides* Boiss.  
 + B5 Yozgat: 28 km W Yozgat, Brache  
 27.6.1970 1100 m 70-14-3
6. *A. blepharocarpum* Dudley & Hub.-Mor.  
 + A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenügel  
 15.6.1971 900 m 71-6-17  
 + C6 Adana: 25 km NE Feke, Bachrand  
 7.7.1977 1200 m 77-26-4
8. *A. dasycarpum* Steph. ex Willd.  
 B5 Yozgat: 28 km W Yozgat, Brache  
 27.6.1970 1100 m 70-14-4
9. *A. desertorum* Stapf  
 var. *desertorum*  
 A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
 13.7.1969 1500 m 69-50-5  
 B2 Izmir: Boz D., Zwergstrauchzone  
 5.7.1968 1500 m 68-16-19  
 B3 Afyon: 13 km N Bolvadin, Brache  
 19.7.1968 1000 m 68-47-1  
 B5 Kirsehir: Çiçek Dağı, Paßhöhe, Steinsteppe  
 26.6.1970 1300 m 70-13-1  
 var. *prostratum* Dudley  
 + C3 Isparta: 18 km W Eğridir, Brache  
 15.7.1968 1000 m 68-33-1
11. *A. minutum* Schlecht. ex DC.  
 + A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, Felssteppe  
 24.6.1970 1550 m 70-5-33
14. *A. strictum* Willd.  
 B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, Steilhänge  
 7.7.1977 1400 m 77-27-3  
 B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand  
 25.6.1971 1400 m 71-47-10  
 C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Felssteppe  
 5.6.1973 1800 m 73-22-7  
 C7 Malatya: 31 km E Gölbaşı, Felsblockhalde  
 25.6.1971 1510 m 71-45-22
15. *A. contemptum* Schott & Kotschy  
 + C7 Adiyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe  
 8.6.1973 2140 m 73-29-23
17. *A. szowitsianum* Fisch. & Mey.  
 C7 Adiyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe  
 8.6.1973 2140 m 73-29-50
19. *A. minus* (L.) Rothm.  
 var. *micranthum* (Meyer) Dudley  
 + B5 Nevşehir: 8 km NW Ürgüp, Sandsteppe  
 12.6.1973 1200 m 73-39-16  
 + B6 Sivas: 2 km SE Sincan, Brache  
 30.6.1970 1500 m 70-26-13  
 var. *minus*  
 B6 Sivas: 8 km N Sivas, Brachen  
 28.6.1970 1350 m 70-19-16  
 C3 Isparta: W-Ufer Beyşehirsee, felsig, beweidet  
 18.6.1967 1120 m 67-9-20  
 C4 Konya: S Akşehir, Sultan D., Geröllhalde  
 19.7.1968 1300 m 68-46-4  
 C6 Maraş: W Çokak, Bergsteppe  
 2.6.1973 1500 m 73-15-32

## ALYSSUM (Forts.)

## 6.CRUCIFERAE

## 21.A.strigosum Banks &amp; Sol.

ssp. strigosum

C3 Isparta: NW Beyşehir Gölü, Steppenhügel

16.6.1967 1200 m 67-4-25

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları,

vulkanischer Steppenhügel

5.6.1973 1000 m 73-20-5

+ C7 Urfa: 13 km S Hilvan, Feld

7.6.1973 700 m 73-26-7

## 23.A.hirsutum Bieb.

+ B6 Sivas: ca.48 km E Kangal, Bergsteppe

29.6.1970 2000 m 70-22-42

B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand

26.6.1971 1400 m 71-47-9

C2 Denizli: Honaz D., Kazig Beli,

offener Pinus pall.-Wald

1.6.1966 1250 m 66-8-2

C3 Konya: 34 km NE Beyşehir, felsiger Steppenhügel

6.7.1970 1200 m 70-42-6

## 35.A.praecox Boiss. &amp; Bal.

var. praecox

C6 Maraş: W Çokak, Gebirgssteppe

2.6.1973 1700 m 73-15-31

+ C7 Adiyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe

8.6.1973 2140 m 73-29-24

## 45.A.lepidoto-stellatum (Hauskn. &amp; Bornm.) Dudley

+ A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D., Felssteppe

13.7.1969 1900 m 69-53-6

## 47.A.thymops (Hub.-Mor. &amp; Reese) Dudley

+ B5 Nevşehir: N Avanos, Feldrand

14.7.1977 1100 m 77-45-1

## 51.A.harputicum Dudley

+ B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel

9.7.1969 1500 m 69-42-156

## 60.A.constellatum Boiss.

+ B6 Sivas: 42 km N Gürün, NW-expon. Steppenhügel

1.7.1970 1700 m 70-33-78

## 67.A.pateri Nyár.

ssp. pateri

A3 Ankara: 2 km E Nallihan, Gebüschvegetation

14.6.1973 700 m 73-43-2

+ A6 Sivas: Yıldız D., Felssteppen

15.7.1969 2000 m 69-58-52

B3 Eskişehir: 10 km E Eskişehir, Artemisia-Steppe

27.5.1964 800 m 64-10-35

B3 Kütahya: 50 km N Afyon, Steppe

1.6.1963 1000 m 63-46-3

B7 Sivas: Yama Dağları, Schutthalden

1.8.1976 2000 m 76-14-3

ssp. prostratum (Nyár.) Dudley

+ C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde

25.6.1971 1510 m 71-45-21

## 69.A.borzaeanum Nyár.

A3 Ankara: 35 km N Nallihan, Fuß einer Felswand

14.6.1973 800 m 73-44-4

## 70.A.sibiricum Willd.

B5 Yozgat: 1 km E Yozgat, Felssteppe

27.6.1970 1300 m 70-15-6

## ALYSSUM (Forts.)

## 6.CRUCIFERAE

71.A.condensatum Boiss.&amp; Hausskn.

ssp. condensatum

A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache

8.7.1969 950 m 69-32-5

ssp. flexibile (Nyár.)Dudley

+ B5 Nevşehir: 2 km SE Avanos, sandiger

Steppenhügel

29.6.1971 1200 m 71-58-5

B6 Sivas: 42 km N Gürün, NW-expon. Steppenhügel

1.7.1970 1700 m 70-33-34

72.A.filiforme Nyár.

C4 Konya: Sertavul-Paß, Bergsteppe

17.6.1971 1600 m 71-10-18

75.A.murale Waldst.&amp; Kit.

ssp. murale

var. haradjianii (Rech.)Dudley

C6 Adana: 14 km E Osmaniye,

Pinus brutia-Waldrand

24.6.1971 800 m 71-34-17

76.A.cassium Boiss.

C6 Maraş: 19 km SE Maraş, Felrand

24.6.1971 700 m 71-40-3

80.A.pterocarpum Dudley

C2 Denizli: Honaz D., Kazig Beli, Straßenrand

19.6.1965 1250 m 65-15-3

52.CLYPEOLA L.

1.C.jonthlaspi L.

B4 Konya: 20 km N Konya, Felssteppe

29.5.1973 1000 m 73-4-7

56.DRABA L.

1.D.bruniifolia Stev.

ssp. bruniifolia

A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D., Felssteppe

13.7.1969 1900 m 69-53-8

B7 Sivas: Yama Dağları, NE-expon. Schutthalden

1.8.1976 2200 m 76-14-14

C4 Konya: Sertavul-Paß, Bergsteppe

9.6.1966 1610 m 66-34-35

58.ARABIS L.

1.A.turrita L.

C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang

1.6.1973 1000 m 73-13-29

10.A.caucasica Willd.

ssp. caucasica

+ A6 Sivas: Yıldız D., Felssteppe

15.7.1969 2000 m 69-58-55

C6 Adana: Nur Dağları, Felssteppe

5.6.1973 1800 m 73-22-5

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Bachrand

1.6.1973 900 m 73-14-23

12.A.sagittata (Bertol.)DC.

+ A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Geröllhalden

3.7.1969 1300 m 69-13-42

C6 Adana: 10 km E Osmaniye, medit. Vegetation

24.6.1971 600 m 71-34-21

## ARABIS (Forts.)

## 6.CRUCIFERAE

## 14.A.nova Vill.

- + A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-37
- + A6 Sivas: Yıldız D., offener Eichenbuschwald  
15.7.1969 1800 m 69-58-61

## 59.TURRITIS L.

## 2.T.laxa (Sibth. &amp; Sm.) Hayek

- C6 Maraş: W Çökak, Bergsteppe  
2.6.1973 1700 m 73-15-41

## 60.NASTURTIUM R.Br.

## 1.N.officinale R.Br.

- A3 Bolu: 26 km W Gerede, feuchte Wiesen  
1.7.1971 1000 m 71-64-8
- B6 Sivas: Gök Pinar, Seeufer  
7.7.1977 1600 m 77-101-2
- C6 Maraş: 1 km S Andirin, Bachrand  
3.6.1973 700 m 73-17-3

## 61.RORIPPA Scop.

## 2.R.amphibia (L.) Bess.

- + A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Seeufer  
27.6.1977 2 m 77-8-37

## 6.R.sylvestre (L.) Bess.

- C3 Isparta: Dedegöl D., feuchte Wiesen  
7.7.1970 1300 m 70-45-7

## 62.BARBAREA R.Br.

## 7.B.plantaginea DC.

- + C4 İçel: 25 km E Mut, Feldrand  
19.6.1971 1000 m 71-18-8
- C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brache  
1.6.1973 900 m 73-14-27

## 65.AUBRIETA Adans.

## 3.A.canescens (Boiss.) Bornm.

## ssp. canescens

- + B6 Sivas: Gök Pinar, Felssteppe  
26.6.1971 1800 m 71-50-23

## 66.MATTHIOLA R.Br.

## 8.M.longipetala (Vent.) DC.

## ssp. longipetala

- A4 Ankara: 13 km E Beypazari, Schottergrubenrand  
14.6.1973 700 m 73-42-6

## 68.HESPERIS L.

## 3.H.bicuspidata (Willd.) Poiret

- A6 Sivas: Yıldız D., Felssteppen  
15.7.1969 2300 m 69-58-58

## 11.H.matronalis L.

## ssp. cilicica (Siehe ex Bornm.) Cullen

- + C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, offener Laubwald  
5.6.1973 1200 m 73-21-36

## 21.H.campicarpa Boiss.

- + C7 Adiyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe  
8.6.1973 2140 m 73-29-28

## 69.MALCOLMIA R.Br.

## 1.M.africana (L.) R.Br.

- C3 Antalya: 15 km NE Korkuteli, Feldrand  
20.6.1965 1000 m 65-22-5

71. ANCHONIUM DC.

6. CRUCIFERAE

1. *A. elichrysifolium* (DC.) Boiss.  
     ssp. *canescens* (Hausskn. ex Bornm.) Cullen & Coode  
   + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Kunduz D., Felssteppe  
     13.7.1969      1900 m      69-53-7

73. ERYSIMUM L.

4. *E. goniocaulon* Boiss.  
     C6 Maraş: 10 km N Andirin, Mischwald  
       31.5.1973      900 m      73-12-14
9. *E. pulchellum* (Willd.) Gay  
   + A6 Sivas: 36 km NE Sivas, Kunduz D., Bergsteppe  
     13.7.1969      1500 m      69-54-7
17. *E. thyrsoides* Boiss.  
   + A3 Bolu: 35 km N Nallihan, Felswand  
     14.6.1973      800 m      73-44-5  
   + A6 Sivas: Yildiz D., Felsblockhalde  
     29.7.1976      2500 m      76-8-47
24. *E. crassipes* Fisch. & Mey.  
     A5 Çorum: Boğazkale, Steppenügel  
       16.6.1971      1000 m      71-7-5  
     C4 Içel: 18 km E Mut, offener Pinus brutia-Wald  
       19.6.1971      1100 m      71-17-1  
     C5 Adana: 7 km S Kamışli, Pinus pall.-Wald  
       8.7.1977      1150 m      77-28-5
27. *E. purpureum* Aucher  
   + C7 Adıyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe  
     8.6.1973      2140 m      73-29-29
28. *E. smyrnaeum* Boiss. & Bal.  
     B6 Malatya: 35 km E Darende, Feldrand  
       25.6.1971      1400 m      71-47-1  
     C6 Malatya: 31 km NE Gölbaşı, sandiger Steppenhänge  
       25.6.1971      1250 m      71-44-1  
     C7 Malatya: 74 km SW Malatya, Felsblockhalde  
       25.6.1971      1510 m      71-45-4

79. SISYMBRIUM L.

1. *S. polyceratium* L.  
     C1 Aydin: Ephesos, zwischen Ruinen  
       17.5.1973      100 m      63-13-2
5. *S. altissimum* L.  
   + A4 Ankara: 10 km S Kizilcahamam,  
     offener Eichenbuschwald  
     28.5.1973      1240 m      73-1-11  
     C4 Içel: 18 km E Mut, offener Pinus brutia-Wald  
       19.6.1971      1100 m      71-17-8
7. *S. orientale* L.  
     C6 Adana: 14 km E Osmaniye, offener  
       Pinus brutia-Wald  
     24.6.1971      100 m      71-34-19

80. DESCURAINIA Webb & Berth.

1. *D. sophia* (L.) Webb ex Prantl  
   + A4 Ankara: 22 km N Ankara, Ruderalvegetation  
     15.6.1971      900 m      71-5-8
2. *D. kochii* (Petri) Schulz  
   + A3 Bolu: 26 km W Gerede, feuchte Wiesen  
     13.6.1971      1000 m      71-2-20  
   A4 Ankara: 500 m N Kizilcahamam, feuchte Wiesen  
     14.6.1971      950 m      71-4-1

83. ARABIDOPSIS Heynh.

6. CRUCIFERAE

2. A. thaliana (L.) Heynh.

- + B2 Izmir: Boz D., Bergsteppe  
5.7.1968 1500 m 68-16-23
- + C2 Antalya: Yumru D., Kugelpolstersteppe  
26.5.1963 1900 m 63-32-15a

84. CAMELINA Crantz

4. C. microcarpa Andr.

- A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel  
15.6.1971 900 m 71-6-20

5. C. hispida Boiss.

- var. grandiflora (Boiss.) Hedge
- + C4 Konya: 4 km N Çumra, Schottergrubenrand  
29.5.1973 1020 m 73-5-11

C. stiefelhagenii Bornm.

- B5 Nevşehir: Urgüp, Campingplatz  
4.7.1970 1250 m 70-37-17
- wurde in "Flora of Turkey" nicht aufgenommen.  
Siehe Anmerkung bei Hub.-Mor. "Beiträge zur  
Kenntnis der anatolischen Flora III",  
Bauhinia Bd.3, Heft 1, 1966, Seite 40.

7. CAPPARACEAE

2. CLEOME L.

1. C. ornithopodioides L.

- B9 Bitlis: 25 km S Bitlis, Steilhänge  
5.9.1977 1600 m 77-95-4
- + C6 Malatya: 31 km NE Gölbaşı, Bachrand  
25.6.1971 1250 m 71-44-3

8. RESEDACEAE

RESEDA L.

8. R. lutea L.

var. lutea

- A4 Ankara: 16 km E Ayaş, Steppenhügel  
14.6.1973 1195 m 73-41-50
- A4 Bolu: 41 km NW Kizilcahamam,  
steinige Brache  
27.7.1976 1250 m 76-3-10

13. R. luteola L.

- A4 Ankara: 40 km NW Ankara, Straßenrand  
16.7.1977 1000 m 77-55-1
- + C7 Urfa: 13 km S Hilvan, Feldrand  
7.6.1973 700 m 73-26-12

9. CISTACEAE

1. CISTUS L.

1. C. creticus L.

- A3 Sakarya: 22 km W Taraklı, steile Hänge  
mit Buschvegetation  
29.6.1977 500 m 77-12-3
- C1 Izmir: N Kuşadası, mediterr. Vegetation  
11.6.1964 100 m 64-59-19
- C5 Adana: 14 km S Feke, Pinus brutia-Wald  
7.7.1977 1100 m 77-26-6
- C6 Adana: 3 km SE Kadirli, Myrthus-Macchie  
22.6.1971 100 m 71-29-4

2. C. parviflorus Lam.

- A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu, offener  
Pinus brutia-Wald  
29.5.1966 300 m 66-2-28

## CISTUS (Forts.)

## 9.CISTACEAE

## 3.C.salviifolius L.

A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu, Pinus brutia-Wald

14.5.1963 300 m 63-2-8

A6 Ordu: 6 km W Ünye, Strand

6.7.1969 5 m 69-21-8

+ C1 Izmir: N Kusadasi, mediterr. Vegetation

11.6.1964 100 m 64-59-37

C6 Adana: 8 km E Osmaniye, Pinus brutia-Wald

6.7.1977 800 m 77-24-5

## 2.HELIIANTHEMUM Miller

## 7.H.nummularium (L.) Miller

ssp. lycaonicum Coode &amp; Cullen

A4 Ankara: 16 km E Ayaş, Steppenhügel

14.6.1973 1195 m 73-41-9

ssp. tomentosum (Scop.) Schinz &amp; Thell.

+ A6 Sivas: Yildiz D., Felssteppen

15.7.1969 2000 m 69-58-21

C4 Icel: 13 km E Mut, offener Pinus brutia-Wald

19.6.1971 700 m 71-16-13

C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang

1.6.1973 1000 m 73-13-9

## 10.H.ledifolium (L.) Miller

var. ledifolium

+ A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel

16.6.1971 1000 m 71-7-34

+ C4 Içel: 25 km E Mut, Feldrand

19.6.1971 1000 m 71-18-7

C5 Adana: 7 km S Kamlı, Pinus pall.-Wald

8.7.1977 1150 m 77-28-9

C6 Adana: E Yarpuz, Laubwald

5.6.1973 1300 m 73-21-18

var. microcarpum Willk.

+ C4 Konya: Sertavul-Paß, felsige Steppe

17.6.1971 1610 m 71-10-14

## 11.H.salicifolium (L.) Miller

B4 Konya: 20 km N Konya, Felssteppe

29.5.1973 1000 m 73-4-2

B5 Nevşehir: E Topaklı, Steppe

29.5.1964 1200 m 64-22-11

+ C1 Izmir: Kuşadasi, mediterr. Vegetation

17.6.1965 40 m 65-9-34

C3 Burdur: 5 km S Burdur, Steppe

31.5.1963 1000 m 63-43-82

+ C4 Konya: 1 km N Silile, Steppe

10.6.1966 1200 m 66-38-49

## 3.FUMANA Spach

## 4.F.paphlagonica Bornm. &amp; Janchen

B3 Kütahya: 50 km NW Afyon, strauchlose Steppe

1.6.1963 1000 m 63-46-25

+ B5 Kayseri: 23 km W Kayseri, stark

beweidete Steppe

30.5.1964 1200 m 64-23-8

## 6.F.thymifolia (L.) Verlot

var. viridis (Ten.) Boiss.

C1 Izmir: Kusadasi, mediterr. Vegetation

17.6.1965 40 m 65-9-56a

5. TUBERARIA (Dunal) Spach

## 9. CISTACEAE

1. T. guttata (L.) Fourr.var. *guttata*A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu, offener  
Pinus brutia-Wald

29.5.1966 300 m 66-2-26

## 10. VIOLACEAE

VIOLA L.5. V. alba Besserssp. *dehnhardtii* (Ten.) BeckerC5 Adana: W Tekir Tepesi, offener  
Juniperus exc.-Wald

3.6.1962 1300 m 62-73-21

17. V. kitaibeliana Roem. & Schult.A3 Bilecik: 22 km S Bilecik, offener  
Eichenbuschwald

27.5.1964 700 m 64-9-2

C3 Isparta: Çiçek D., offener Cedrus  
lib.-Junip. exc.-Wald

17.6.1967 1600 m 67-5-121

19. V. arvensis Murray

+ B2 Izmir: Boz D., W der Ortschaft, Bachrand

4.7.1968 1150 m 68-13-34

## 11. POLYGALACEAE

POLYGALA L.3. P. pruinosa Boiss.ssp. *pruinosa*

A6 Sivas: 11 km W Girçir, Felsblockhalde

16.7.1969 1400 m 69-59-23

B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, Felssteppe

7.7.1977 1400 m 77-27-37

11. P. anatolica Boiss. & Heldr.A3 Bilecik: 10 km N Bilecik, lockerer  
Eichenbuschwald

27.5.1964 600 m 64-8-3

A3 Sakarya: 24 km E Iznik,

Pinus brutia-Waldrand

29.6.1977 400 m 77-11-10

B7 Sivas: Yama Dağları, Steinsteppe

1.8.1976 1700 m 76-13-47

## 13. CARYOPHYLLACEAE

1. ARENARIA L.1. A. antitaurica McNeill

B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht

26.6.1971 1600 m 71-49-15

4. A. tmolea Boiss.

C2 Antalya: Ak D., Fels-Schutt

11.7.1968 2400 m 68-26-4

18. A. serpyllifolia L.

A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel

16.6.1971 1000 m 71-7-23

+ B3 Eskişehir: 50 km N Kütahya, Steppe

1.6.1963 1000 m 63-50-11

+ B6 Sivas: Gök Pinar, Felssteppe

26.6.1971 1800 m 71-50-40

C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel

25.5.1963 1150 m 63-28-112

C2 Burdur: S-Ufer Saldasee, Buschvegetation

20.5.1963 1170 m 63-19-14

## ARENARIA (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

19. *A. leptoclados* (Reichb.) Guss.

+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde

16.7.1969 1400 m 69-59-2

+ B2 Izmir: Boz D., Schutthalden

5.7.1968 1400 m 68-16-7

C3 Isparta: NE Anamas, Bergsteppe

16.7.1968 1500 m 68-37-8

22. *A. macrosepala* Boiss.

B6 Sivas: Gök Pinar, Felssteppe

26.6.1971 1800 m 71-50-14

23. *A. saponarioides* Boiss. & Bal.

C2 Antalya: Ak D., Fuß einer Felswand

11.7.1968 2200 m 68-26-7a

28. *A. cucubaloides* Smith

B6 Sivas: ca. 40 km E Kangal, Felssteppe

29.6.1970 2000 m 70-22-99

30. *A. gypsophiloides* L.var. *gypsophiloides*

+ B6 Sivas: ca. 40 km E Kangal, Felssteppe

29.6.1970 2000 m 70-22-10

B7 Sivas: Yama Dağları, Schutthalden

1.8.1976 2000 m 76-14-4

35. *A. armeniaca* Boiss.

A7 Giresun: 22 km N Şebinkarahisar, Schutthalden

7.7.1969 1700 m 69-29-4

37. *A. ledebouriana* Fenzlvar. *armeniaca* McNeill

+ B6 Sivas: 18 km S Zara, Steppenhügel

9.7.1969 1500 m 69-37-5

var. *ledebouriana*

A6 Sivas: Yıldız D., Schutthalden

15.7.1969 2000 m 69-58-9

B5 Kayseri: 5 km W Incesu, Felssteppe

13.7.1977 1400 m 77-43-2

var. *parviflora* Boiss.

+ A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache

8.7.1969 950 m 69-32-2

C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhänge

25.6.1971 1180 m 71-43-6

38. *A. acerosa* Boiss.

C3 Isparta: Dedegöl D., Felssteppe

3.6.1965 1500 m 65-43-5

+ C7 Adiyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe

8.6.1973 2140 m 73-29-7

39. *A. drypidea* Boiss.

C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde

25.6.1971 1510 m 71-45-16

40. *A. acutisepala* Hausskn. ex Williams

+ B6 Sivas: 33 km S Zara, Schutthalden

9.7.1969 1700 m 69-38-4

B7 Sivas: Yama Dağları, Dornpolstersteppe

1.8.1976 2200 m 76-15-3

## 2. MINUARTIA L.

4. *M. aizoides* (Boiss.) Bornm.

B5 Kayseri: Erciyas D., Dornpolstersteppe

30.5.1964 2150 m 64-25-4

## MINUARTIA (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

7. *M. hirsuta* (Bieb.) Hand.-Mazz.  
     ssp. *falcata* (Gris.) Mattf.  
     A4 Bolu: 34 km SE Gerede, beginnende Waldsteppe  
         8.6.1962      1500 m      62-82-24  
     A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Waldrand  
         3.7.1969      1300 m      69-13-12  
     + A6 Sivas: Yildiz D., Felssteppen  
         29.7.1976      2200 m      76-8-73  
     B2 Izmir: Boz D., Steppenhügel  
         4.7.1968      1300 m      68-14-1  
     B3 Bilecik: 51 km N Kütahya, beweidete Grassteppen  
         22.5.1962      1000 m      62-19-2  
     8. *M. juressi* (Willd. ex Schlecht.) Lacaita  
         ssp. *asiatica* McNeill  
     + B6 Sivas: 30 km W Divriği, Felsblockhalde  
         10.7.1969      1400 m      69-44-8  
     14. *M. juniperina* (L.) Maire & Petitm.  
         A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhänge  
             16.6.1971      1000 m      71-7-27  
         B7 Sivas: Yama Dağları, NE-expon. Schutthalde  
             1.8.1976      2200 m      76-14-24  
     15. *M. glandulosa* (Boiss. & Huet) Bornm.  
         + B6 Sivas: 14 km N Sivas, Steppenhügel  
             12.7.1969      1500 m      69-49-146  
     18. *M. umbellulifera* (Boiss.) McNeill  
         ssp. *pontica* (Bornm.) McNeill  
         + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe  
             13.7.1969      1800 m      69-52-3  
         ssp. *umbellulifera*  
         var. *umbellulifera*  
         C3 Isparta: Dedegöl D., Gebirgssteppe  
             8.7.1970      2200 m      70-46-9  
         C4 Konya: 43 km N Mut, Bergsteppe  
             9.6.1966      1610 m      66-34-42  
     20. *M. meyeri* (Boiss.) Bornm.  
         + A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
             13.7.1969      1500 m      69-50-1  
         B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
             9.7.1969      1500 m      69-42-20  
         + C2 Antalya: Susuz D., Felssteppe  
             28.5.1963      2000 m      63-35-32  
     21. *M. multinervis* (Boiss.) Bornm.  
         C2 Antalya: Susuz D., Cedrus libani-Wald  
             28.5.1963      1600 m      63-35-6  
         C3 Isparta: W-Ufer Beyşehirsee, Steppe  
             30.6.1965      1150 m      65-41-30  
     22. *M. globulosa* (Lab.) Schinz & Thell.  
         + C2 Antalya: Yumru D., Bergsteppe  
             26.5.1963      1900 m      63-32-30  
     23. *M. montana* L.  
         ssp. *wiesneri* (Stapf) McNeill  
         + A4 Ankara: 16 km NE Çeltikçi, Steppenhänge  
             23.8.1977      1000 m      77-61-6  
         C3 Burdur: 40 km S Burdur, Quercus cocc.-Garigues  
             31.5.1963      900 m      63-42-14  
         C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Bachbett  
             9.6.1973      900 m      73-30-4

## MINUARTIA (Forts.)

## 13.CARYOPHYLLACEAE

24.*M.intermedia* (Boiss.)Hand.-Mazz.

- + C2 Denizli: E Pamukkale, Steppenhang  
19.5.1963 400 m 63-16-43
- + C3 Antalya: 36 km NW Antalya, Pinus brutia-Wald  
24.6.1965 700 m 65-30-12
- C6 Adana: 20 km NW Kadirli, Fuß einer Felswand  
31.5.1973 250 m 73-10-3

25.*M.decipiens* (Fenzl)Bornm.ssp. *decipiens*

- C5 Adana: Tekir Tepesi, Pinus pall.-Wald  
2.6.1962 1268 m 62-68-35

26.*M.sclerantha* (Fisch.& Mey.)Thell.

- + A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel  
15.6.1971 900 m 71-6-11
- + C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Bachbett  
9.6.1973 900 m 73-30-5

27.*M.hamata* (Hauskn.)Mattf.

- A4 Bolu: 1 km W Gerede, Böschung-Straßenrand  
24.6.1970 1300 m 70-4-1
- B3 Eskişehir: 10 km E Eskişehir, Artemisia-Steppe  
27.5.1964 800 m 64-10-18
- B3 Kütahya: N Afyon, Steppe  
1.6.1963 1000 m 63-46-39
- B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
9.7.1969 1500 m 69-42-21
- C2 Denizli: Honaz D., Kazig Beli, Pinus pall.-Wald  
24.5.1962 1250 m 62-31-6

28.*M.leucocephala* (Boiss.)Mattf.

- + B6 Sivas: 59 km E Pınarbaşı, Felssteppe  
10.6.1973 1980 m 73-37-1

30.*M.anatolica* (Boiss.)Woron.var. *arachnoidea* McNeill

- + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe  
13.7.1969 1900 m 69-53-1
- B6 Malatya: 5 km NW Darende, Steppenhang  
8.9.1977 1200 m 77-105-27
- B6 Sivas: Gök Pinar, Felssteppe  
26.6.1971 1800 m 71-50-19

var. *lanuginosa* McNeill

- B4 Kirşehir: 33 km NW Kirşehir, Bergsteppe  
29.5.1964 1500 m 64-20-23

var. *polymorpha* McNeill

- + B6 Sivas: 14 km N Sivas, Steppenhügel  
12.7.1969 1350 m 69-49-27

var. *tetrasticha* McNeill

- + B5 Kayseri: Erçiyas D., Fels-Schutt  
29.8.1977 2600 m 77-76-51

31.*M.erythrosepala* (Boiss.)Hand.-Mazz.var. *erythrosepala*

- B3 Kütahya: 50 km NW Afyon, Steppe  
1.6.1963 1000 m 63-46-11

32.*M.micrantha* Schischk.

- A5 Sinop: 13 km W Boyabat, Brachen  
4.7.1969 400 m 69-16-5

34.*M.corymbulosa* (Boiss.& Bal.)McNeillvar. *corymbulosa*

- + A4 Ankara: 16 km E Ayaş, Steppenhang  
17.7.1977 1190 m 77-56-32
- B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
9.7.1969 1500 m 69-42-22

## MINUARTIA (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

35. *M. leucocephaloides* (Bornm.) Bornm.

+ B2 Izmir: Boz D., Schutthalde

5.7.1968 1800 m 68-16-11

37. *M. mesogitana* (Boiss.) Hand.-Mazz.ssp. *kotschyana* (Boiss.) McNeill

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brachen

1.6.1973 900 m 73-14-7

ssp. *mesogitana*

+ B6 Sivas: Gök Pinar, Felssteppe

26.6.1971 1800 m 71-50-15

+ C4 Konya: Sertavul-Paß, Bergsteppe

9.6.1966 1600 m 66-34-40

40. *M. hybrida* (Vill.) Schischk.ssp. *hybrida*

A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu, offener

Pinus brutia-Wald

29.5.1966 300 m 66-2-16

+ B2 Izmir: Boz D., SW der Ortschaft, Waldrand

5.7.1968 1200 m 68-16-9

C2 Burdur: Saldasee, Buschvegetation

20.5.1963 1170 m 63-19-13

C3 Isparta: SW-Ufer Beyşehirsee, Weideland

30.6.1965 1150 m 65-41-12

ssp. *turcica* McNeill

+ A1 Çanakkale: S Eceabat, Pinus brutia-Wald

15.5.1963 200 m 63-7-27

+ B4 Konya: 30 km N Konya, trockenes Bachbett

11.6.1966 1300 m 66-40-42

C5 Adana: Tekir Tepesi, offener Pinus pall.-Wald

2.6.1962 1268 m 62-68-36

## 3. LEPYRODICLIS Fenzl

1. *L. holosteoides* (C.A. Meyer) Fenzl ex Fisch. & Mey.

+ A6 Sivas: Yıldız D., Bachrand

15.7.1969 1500 m 69-57-7

## 5. STELLARIA L.

1. *S. media* (L.) Vill.ssp. *media*

+ B2 Izmir: Boz D., Waldrand

5.7.1968 1200 m 68-16-18

ssp. *pallida* (Dumort.) Aschers. & Graebn.

+ B5 Nevşehir: N Zelve, Brunnen

29.6.1971 1200 m 71-59-9

+ C2 Antalya: Ak D., Bachrand

23.6.1965 1500 m 65-26-36

C3 Isparta: NE Anamas, Bachrand

16.7.1968 1500 m 68-37-16

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Bachrand

1.6.1973 900 m 73-14-9

## 7. CERASTIUM L.

10. *C. perfoliatum* L.

+ B5 Nevşehir: 8 km E Ürgüp, Feldrand

1.6.1964 1200 m 64-32-67

15. *C. fontanum* Baumg.ssp. *triviale* (Link) Jalas

+ A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Bachrand

3.7.1969 1300 m 69-13-9a

+ A6 Ordu: 6 km W Ünye, Bachrand

6.7.1969 10 m 69-21-4

## CERASTIUM (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

15. *C. fontanum*, ssp. *triviale* (Forts.)

- A6 Sivas: 36 km NE Sivas, Bachrand  
13.7.1969 1500 m 69-54-2  
A7 Giresun: 2 km N Kümbet, Bergwiesen  
7.7.1969 1600 m 69-26-1  
+ B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer  
4.7.1968 1300 m 68-15-1  
B5 Kayseri: Erciyas D., Wassergraben  
28.8.1977 2150 m 77-75-7  
B6 Sivas: 40 km E Kangal, Bachrand  
29.6.1970 1900 m 70-22-11

17. *C. dichotomum* L.ssp. *dichotomum*

- A6 Sivas: Yıldız D., offener Eichenbuschwald  
15.7.1969 2000 m 69-58-10  
B5 Nevşehir: 8 km E Ürgüp, Brache  
1.6.1964 1200 m 64-32-1  
B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand  
25.6.1971 1400 m 71-47-6  
B6 Sivas: 33 km S Zara, Bachrand  
9.7.1969 1700 m 69-38-3  
C3 Isparta: Dedegöl D., Felssteppe  
1.7.1965 1900 m 65-42-1  
C5 Adana: E Gülek Boğaz, offener Cedrus lib.-Wald  
3.6.1962 2000 m 62-71-3  
C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Laubwald  
5.6.1973 1300 m 73-21-11  
C7 Adiyaman: Nemrut D., Schutthalde  
8.6.1973 2140 m 73-29-8  
+ C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde  
25.6.1971 1510 m 71-45-17

ssp. *inflatum* (Link) Cullen

- B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht  
26.6.1971 1600 m 71-49-16  
+ C2 Antalya: Yumru D., Kugelpolstersteppe  
26.5.1963 2000 m 63-32-1  
+ C7 Adiyaman: Nemrut D., Schutthalden  
8.6.1973 2140 m 73-29-9

20. *C. glomeratum* Thuill.

- A2 Bursa: 25 km E Bursa, Eichenbuschwald  
2.6.1963 300 m 63-51-1a

21. *C. brachypetalum* Pers.ssp. *roeseri* (Boiss. & Heldr.) Nyman

- + A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, Quellfluren  
24.6.1970 1550 m 70-5-8  
+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde  
16.7.1969 1400 m 69-59-3  
+ B2 Izmir: Boz D., Zwergstrauchzone  
5.7.1968 1200 m 68-16-1  
+ B4 Konya: 30 km N Konya gegen Afyon,  
Eichenbuschwald  
11.6.1966 1300 m 66-40-44  
C2 Burdur: S-Ufer Saldasee, Buschvegetation  
20.5.1963 1170 m 63-19-1  
C3 Isparta: NW-Ende Beyşehirsee, Bergsteppe  
5.6.1964 1400 m 64-41-16  
C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang  
1.6.1973 900 m 73-13-20

## CERASTIUM (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

23. C. semidecandrum L.

A2 Bursa: 25 km E Bursa, Eichenbuschwald  
2.6.1963 300 m 63-51-1b

+ A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel

16.6.1971 1000 m 71-7-25

+ B2 Izmir: Boz D., Waldrand

5.7.1968 1300 m 68-16-1a

24. C. pumilum Curtis

+ A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Bachrand

3.7.1969 1300 m 69-13-9

26. C. fragillimum Boiss.

C2 Antalya: Yumru D., Bergsteppe

26.5.1963 1500 m 63-31-2

8. HOLOSTEUM L.2. H. umbellatum L.

var. glutinosum (Bieb.) Gay

+ C3 Burdur: 5 km S Burdur, Steppe

31.5.1963 1000 m 63-43-54

9. MOENCHIA Ehrh.3. M. mantica (L.) Bartl.

ssp. mantica

A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu, Pinus brutia-Wald

14.5.1963 300 m 63-2-12

11. SAGINA L.2. S. procumbens L.

A6 Sivas: Yildiz D., Bachrand

15.7.1969 1600 m 69-57-4

13. SPERGULARIA (Pers.) J. & C. Presl2. S. marina (L.) Gris.

B1 Balıkesir: 64 km SW Edremit, Sandstrand

1.7.1965 10 m 65-7-5

+ C1 Izmir: N Kuşadası, Felsküste

11.6.1964 10 m 64-57-2

14. POLYCARPON Loebl. ex L.1. P. tetraphyllum (L.) L.

+ B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer

4.7.1968 1300 m 68-15-4

C1 Izmir: Kuşadası, medit. Vegetation

17.6.1965 30 m 65-9-89

C4 İçel: 12 km N Silifke, medit. Vegetation

26.6.1971 300 m 71-26-7

16. TELEPHIUM L.1. T. imperati L.

ssp. orientale (Boiss.) Nyman

C2 Antalya: Avlan Gölü, Cedrus lib.-Waldrand

29.5.1963 1150 m 63-36-14

18. DIANTHUS L.1. D. cyri Fisch. & Mey.

+ C3 Konya: NE-Ufer Beyşehirsee, feuchte Senken

6.7.1970 1150 m 70-43-1

2. D. tripunctatus Sibth. & Sm.

B1 Manisa: 5 km SE Manisa, medit. Vegetation

13.6.1964 100 m 64-63-16

## DIANTHUS (Forts.)

## 13.CARYOPHYLLACEAE

- 3.D.strictus Banks & Sol.  
     var. gracilior (Boiss.)Reeve  
     + A6 Sivas: Yildiz D.,Feldrand  
         15.7.1969      1500 m      69-57-3  
     + B6 Maraş: 19 km E Göksun,Pinus pall.-Wald  
         31.8.1977      1330 m      77-79-8  
     var. subenervis (Boiss.)Reeve  
     + C6 Adana: Kara Tepe,medit. Vegetation  
         23.6.1971      100 m      71-31-7
- 6.D.anatolicus Boiss.  
     + A6 Sivas: Yildiz D.,Felssteppen  
         15.7.1969      2200 m      69-58-12  
     + B7 Sivas: Yama Dağlari,Schutthalden  
         1.8.1976      2200 m      76-14-11
- 21.D.leptopetalus Willd.  
     + A3 Sakarya: 24 km E Iznik,Pinus brutia-Waldrand  
         29.6.1977      400 m      77-11-5
- 23.D.plumbeus Schischk.  
     + B7 Sivas: Yama Dağlari,Steinsteppe  
         1.8.1976      1700 m      76-13-25
- 25.D.leucophaeus Sibth.& Sm.  
     var.patens Reeve  
     + C3 Isparta: Dedegöl D.,Felssteppe  
         8.7.1970      2000 m      70-46-7
- 29.D.floribundus Boiss.  
     + B5 Nevşehir: Göreme,lockerer Sandstein  
         5.6.1962      1200 m      62-75a-19
- 35.D.crinitus Sm.  
     var. crinitus  
     B5 Nevşehir: 8 km SE Avanos,Steppe  
         10.7.1977      1200 m      77-32-6  
     var. crassopetalus Boiss.  
     B7 Sivas: Yama Dağlari,Schutthalden  
         1.8.1976      2200 m      76-14-12
- 36.D.orientalis Adams  
     B6 Kayseri: 11 km S Pinarbaşı,Steppenhang  
         30.8.1977      1600 m      77-77-5  
     B6 Sivas: 36 km S Kangal,felsiger Steppenhügel  
         2.8.1976      1600 m      76-19-11  
     B7 Sivas: Yama Dağlari,Schutthalden  
         1.8.1976      2000 m      76-14-13
- 40.D.elegans d'Urv.  
     var. actinopetalus (Fenzl)Reeve  
     C3 Isparta: Dedegöl D.,Felswände  
         3.7.1965      1550 m      65-43-74
- 45.D.masmenaeus Boiss.  
     var. masmenaeus  
     + B6 Sivas: Gök Pinar,Steppenhang  
         9.9.1977      1800 m      77-106-11  
     B7 Sivas: Yama Dağlari,felsig-steiniger E-Hang  
         1.8.1976      2000 m      76-16-5
- 49.D.armeria L.  
     ssp. armeria  
     + B6 Sivas: 40 km E Kangal,Bachrand  
         29.6.1970      1900 m      70-22-13
- 51.D.corymbosus Sibth.& Sm.  
     A1 Tekirdağ: 15 km E Şarköy,Eichenbuschwald  
         23.6.1977      400 m      77-3-4

## DIANTHUS (Forts.)

## 13.CARYOPHYLLACEAE

## 58.D.zonatus Fenzl

var. aristatus (Boiss.)Reeve

- + B4 Ankara: 2 km W Hirfanlı,Brache  
26.6.1970 900 m 70-10-1
- B5 Niğde: 5 km NE Aksaray,Steinsteppe  
6.7.1970 1100 m 70-39-1

var. hypochlorus (Boiss.&amp; Heldr.)Reeve

- + B5 Kayseri: Erciyas D.,Felsblockhalde  
28.8.1977 2150 m 77-75-9
- C3 Isparta: Dedegöl D.,Felssteppe  
8.7.1970 2000 m 70-46-92

var. zonatus

- B2 Izmir: Boz D.,Gölcük,Trockenhang  
4.7.1968 1300 m 68-14-2
- + B6 Adana: 7 km N Saimbeyli,Felswand  
7.7.1977 1400 m 77-27-13

## 62.D.calocephalus Boiss.

- B1 Balıkesir: 30 km W Balıkesir,N-expon.Felswand  
14.6.1964 150 m 64-67-4
- B1 Manisa: 30 km NE Akhisar,Pinus brutia-Wald  
13.6.1964 200 m 64-66-2
- B7 Sivas: Yama Dağları,Steinsteppe  
1.8.1976 1700 m 76-13-24
- C4 İçel: 6 km S Uzuncaburç,Pinus brutia-Wald  
21.6.1971 500 m 71-25-11

## 67.D.giganteus d'Urv.

- A1 Edirne: 25 km SE Kreuzung Keşan,  
Pinus brutia-Waldrand  
23.6.1977 500 m 77-1-8
- A2 Bursa: 25 km E Söğütalan,Waldrand  
26.6.1977 500 m 77-6-11

## 19.PETRORHAGIA (Ser.)Link

## 3.P.cretica (L.)Ball &amp; Heywood

- + A6 Sivas: 11 km W Çirçir,Felsblockhalde  
16.7.1969 1400 m 69-59-5
- + C5 Niğde: 22 km E Ulukışla,Felssteppe  
1.6.1962 1200 m 62-66-8
- + C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı,steiler Steppenhang  
25.6.1971 1180 m 71-43-7

## 5.P.alpina (Habl.)Ball &amp; Heywood

ssp. alpina

- A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,Steppenhang  
16.7.1977 1550 m 77-52-28
- B5 Kayseri: Erciyas D.,Schutthalden  
5.8.1976 2400 m 76-28-20

## 10.P.velutina (Guss.)Ball &amp; Heywood

- A1 Edirne: 50 km N Gelibolu,Pinus brutia-Wald  
29.5.1966 300 m 66-2-18

## 20.VELEZIA L.

## 4.V.rigida L.

- + A1 Tekirdağ: 16 km N Şarköy,Feldrand  
23.6.1977 400 m 77-3-12
- + A6 Sivas: 48 km N Sivas,Brache  
13.7.1969 1500 m 69-50-3
- + B6 Malatya: 35 km SE Darende,Feldrand  
25.6.1971 1400 m 71-47-8

## VELEZIA (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

4. *V. rigida* (Forts.)

- C3 Konya: 61 km SW Konya, Steppenhügel  
6.7.1970 1200 m 70-42-2  
C6 Adana: Nur Dağı-Paß, Eichenbuschwald  
24.6.1971 1150 m 71-37-3

21. SAPONARIA L.1. *S. pumilio* Boiss.

- C3 Isparta: Dedegöl D., Kugelpolstersteppe  
1.7.1965 2200 m 65-42-7

8. *S. orientalis* L.

- A4 Ankara: 60 km NW Ankara, Brache  
24.6.1970 1000 m 70-6-3  
B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand  
26.6.1971 1400 m 71-47-7

9. *S. viscosa* C.A. Meyer

- + A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-29  
+ A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
13.7.1969 1500 m 69-50-2  
C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, offener Laubwald  
5.6.1973 1200 m 73-21-14

13. *S. halophila* Hedge & Hub.-Mor.

- + B6 Sivas: 30 km SW Kangal, sandiger Steppenhügel  
1.7.1970 1500 m 70-32-4

14. *S. chlorifolia* Kunze

- + C3 Isparta: Dedegöl D., offener Pinus pall.-Wald  
17.7.1968 1400 m 68-43-10

17. *S. kotschyi* Boiss.

- + B4 Konya: 53 km N Konya, breiter Feldrand  
29.5.1973 1000 m 73-3-5  
C5 Niğde: 3 km S Çaykavak-Paß, Brache  
9.7.1977 1400 m 77-30-9

18. *S. prostrata* Willd.

- ssp. *prostrata*  
B5 Kirşehir: 40 km SW Çiçekdağı-Paß, Brache  
26.6.1970 1000 m 70-12-2

24. GYPSOPHILA L.8. *G. sphaerocephala* Fenzl ex Tchiha.var. *cappadocica* Boiss.

- B5 Nevşehir: 7 km NE Göreme, Steppenhügel  
5.7.1970 1200 m 70-38-2

var. *sphaerocephala*

- + B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht  
26.6.1971 1600 m 71-49-17  
B6 Malatya: 5 km NW Darende, steiler Steppenhang  
8.9.1977 1200 m 77-105-20

11. *G. pinifolia* Boiss. & Hausskn.

- + C7 Adıyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe  
8.6.1973 2140 m 73-29-10

26. *G. pallida* Stapf

- B7 Sivas: 8 km NE Divriği, Brache  
1.7.1970 1300 m 70-31-10

28. *G. aucheri* Boiss.

- + C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhang  
25.6.1971 1180 m 71-43-5

## GYPSOPHILA (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

29. *G. eriocalyx* Boiss.

- A4 Ankara: 13 km E Beypazari, Steppenhügel  
14.6.1973 700 m 73-42-1  
B5 Nevşehir: 2 km NW Gülşehir, Steppenhügel  
14.7.1977 900 m 77-48-3  
B5 Niğde: E Aksaray, Steppenhügel  
25.8.1977 1000 m 77-67-10

33. *G. parva* Bark.

- B6 Sivas: 2 km SE Sincan, Brachen  
30.6.1970 1500 m 70-26-2

38. *G. viscosa* Murray

- B4 Ankara: 42 km NW Kulu, breiter Feldrand  
29.5.1973 900 m 73-2-3  
B4 Kirşehir: 30 km NW Kirşehir, Brache  
29.5.1964 1000 m 64-21-10  
C3 Isparta: NW-Ende Beyşehirsee, Brache  
4.6.1964 1200 m 64-40-1

44. *G. pilosa* Hudson

- B4 Niğde: 25 km W Aksaray, Feldrand  
2.6.1964 950 m 64-33-1  
+ B6 Malatya: Darende(Ort), Ruderalvegetation  
25.6.1971 1000 m 71-48-2  
C2 Afyon: 35 km W Dinar, Feldrand  
7.6.1964 900 m 64-47-5  
C3 Antalya: 15 km NW Korkuteli, Feldrand  
20.6.1965 1000 m 65-22-3  
C4 İçel: 12 km S Mut, Feldrand  
6.6.1966 200 m 66-20-6

46. *G. venusta* Fenzl

- B5 Kirşehir: 40 km SW Çiçek Dağı-Paß, Brache  
26.6.1970 1000 m 70-12-1

25. *BOLANTHUS* (Ser.) Reichb.

1. *B. minuartioides* (Jaub. & Spach) Hub.-Mor.  
C2 Burdur: S-Ufer Saldasee, Buschvegetation  
25.6.1962 1170 m 62-36-7

27. *ACANTHOPHYLLUM* C.A. Meyer

3. *A. verticillatum* (Willd.) Hand.-Mazz.  
C6 Adana: 14 km E Osmaniye, Felssteppe  
24.6.1971 900 m 71-34-83

28. *VACCARIA* Medik.1. *V. pyramidata* Medik.

- var. *grandiflora* (Fisch. ex DC.) Cullen  
A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenreste  
15.6.1971 900 m 71-5-5  
B6 Sivas: ca. 8 km S Zara, Brachen  
8.7.1969 1500 m 69-36-8  
C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel  
22.6.1965 1150 m 65-25-58  
C3 Isparta: Dedegöl D., offener Pinus pall.-Wald  
17.7.1968 1400 m 68-43-11  
var. *pyramidata*  
+ C4 Konya: 21 km N Karaman, Feldrand  
9.6.1966 1000 m 66-36-34

29.SILENE L.

## 13.CARYOPHYLLACEAE

- 1.*S.italica* (L.)Pers.  
 A4 Ankara: 36 km NW Ankara,Grassteppe  
           8.6.1962           900 m       62-80-36  
 C6 Adana: 14 km SE Osmaniye,Bachrand  
           24.6.1971           900 m       71-34-86
- 12.*S.olympica* Boiss.  
 A6 Sivas: 36 km N Sivas,Felssteppe  
           13.7.1969           1800 m       69-52-4  
 + B5 Kayseri: Erciyas D.,Schutthalden  
           5.8.1976           2400 m       76-28-28
- 19.*S.armena* Boiss.  
       var. *armena*  
 B6 Sivas: 40 km E Kangal,Steppenhäng  
           29.6.1970           2000 m       70-22-21  
 + B7 Sivas: Yama Dağlari,Felssteppe  
           1.7.1976           2000 m       76-16-18
- 20.*S.laxa* Boiss.& Kotschy  
 + C7 Adiyaman: Nemrut D.,Gebirgssteppe  
           8.6.1973           2140 m       73-29-11
- 21.*S.chlorifolia* Sm.  
 A5 Çorum: Boğazkale,Steppenhügel  
           16.6.1971           1000 m       71-7-30  
 C4 Içel: 50 km W Mut,dichter Arbutus-Bestand  
           7.6.1966           700 m       66-29-3  
 C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı,steiler Steppenhäng  
           25.6.1971           1180 m       71-43-8
- 23.*S.caesarea* Boiss.& Bal.  
 + C4 Içel: Uzuncaburç,zwischen den Ruinen  
           21.6.1971           900 m       71-23-5
- 36.*S.stenobotrys* Boiss.& Hausskn.  
 + C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı,Felsblockhalde  
           25.6.1971           1510 m       71-45-19
- 37.*S.muradica* Schischk.  
 A4 Ankara: 16 km W Ayaş,Steppenhügel  
           14.6.1973           1195 m       73-41-7  
 + A6 Sivas: Yıldız D.,Bachrand  
           15.7.1969           1500 m       69-57-6
- 38.*S.cappadocica* Boiss.& Heldr.  
 B3 Eskişehir: 10 km E Eskişehir,Steppe  
           27.5.1964           800 m       64-10-11  
 B4 Konya: 53 km N Konya,breiter Feldrand  
           29.5.1973           1000 m       73-3-7  
 B5 Nevşehir: E Topakli,Steppe  
           29.5.1964           1200 m       64-22-18  
 B5 Yozgat: 51 km E Sorgun,Eichenwald  
           27.6.1970           1200 m       70-16-2  
 B6 Adana: 7 km N Saimbeyli,Felswand  
           7.7.1977           1400 m       77-27-45  
 + C3 Burdur: 13 km S Burdur,Steppenrest  
           26.5.1962           1100 m       62-38-6  
 C3 Antalya: 28 km N Akseki,offener  
           Pinus pall.-Wald  
           29.5.1962           1300 m       62-59-20
- 39.*S.spergulifolia* (Desf.)Bieb.  
 B7 Sivas: Yama Dağlari,Schutthalden  
           1.8.1976           2000 m       76-14-36

## SILENE (Forts.)

## 13. CARYOPHYLLACEAE

40. *S. supina* Bieb.ssp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdh.

- + B5 Yozgat: 93 km W Yildizeli, offener Eichenwald  
27.6.1970 1200 m 70-16-2

C3 Isparta: Dedegöl D., Felssteppen

3.7.1965 1400 m 65-43-18

C5 Adana: Tekir Tepesi, Pinus pall.-Wald

2.6.1962 1270 m 62-68-8

41. *S. montbretiana* Boiss.

- + C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde

25.6.1971 1550 m 71-45-18

54. *S. vulgaris* (Moench) Garckevar. *commutata* (Guss.) Coode & Cullen

- + B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht

26.6.1971 1600 m 71-49-21

var. *macrocarpa* (Turrill) Coode & Cullen

- + B2 Izmir: Boz D., Waldrand

4.7.1968 1200 m 68-13-3

var. *vulgaris*

- + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Laubmischwald

13.7.1969 1700 m 69-51-6

A7 Giresun: 3 km SE Kümbet, Bergwiesen

7.7.1969 1700 m 69-27-9

C2 Antalya: Ak D., Bachrand

23.6.1965 1300 m 65-26-33

C6 Malatya: 31 km NE Gölbaşı, Bachrand

25.6.1971 1250 m 71-44-4

68. *S. ruscifolia* (Hub.-Mor. & Reese) Hub.-Mor.

- + C4 Konya: ca. 8 km W Konya, Bergsteppe

12.6.1966 1200 m 66-41-54

76. *S. caryophylloides* (Poirot) Otthssp. *echinus* (Boiss. & Heldr.) Coode & Cullen

C2 Antalya: Ak D., Gebirgssteppe

11.7.1968 2200 m 68-26-14

C3 Isparta: Dedegöl D., Gebirgssteppe

8.7.1970 2200 m 70-46-11

ssp. *subulata* (Boiss.) Coode & Cullen

- + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe

13.7.1969 1800 m 69-52-5

80. *S. compacta* Fischer

A2 Bilecik: 72 km W Eskişehir, Fagus orient.-Wald

1.7.1977 800 m 77-14-6

A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, Felssteppe

1.7.1971 1550 m 71-63-9

- + C5 Adana: 14 km S Feke, Pinus brutia-Wald

7.7.1977 1100 m 77-25-15

83. *S. alba* (Miller) Krausessp. *divaricata* (Reichb.) Walters

- + C3 Isparta: Dedegöl D., Schutthalde

3.7.1965 1600 m 65-43-30

ssp. *ericalycina* (Boiss.) Walters

A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Bachrand

3.7.1969 1300 m 69-13-15

- + C3 Isparta: Dedegöl D., Wasserfall-Umgebung

6.6.1964 1500 m 64-42-26

84. *S. noctiflora* L.

- + A3 Bolu: Abantsee, feuchte Wiesen

1.7.1969 1400 m 69-4-14a

## SILENE (Forts.)

## 13.CARYOPHYLLACEAE

- 87.*S.chaetodonta* Boiss.  
C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Flußbett  
9.6.1973 900 m 73-30-6
- 88.*S.kotschyi* Boiss.  
var. *kotschyi*  
+ C4 İçel: 9 km E Mut, Pinus brutia-Wald  
19.6.1971 460 m 71-15-5
- 92.*S.sedoides* Poiret  
+ C5 İçel: 27 km E Silifke, medit. Vegetation  
18.6.1971 10 m 71-13-11
- 104.*S.dichotoma* Ehrh.  
ssp. *dichotoma*  
B1 Çanakkale: Troja, zwischen Ruinen  
16.5.1963 50 m 63-8-11  
B4 Konya: 53 km N Konya, breiter Feldrand  
29.5.1973 1000 m 73-3-5  
C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel  
25.5.1963 1150 m 63-28-64  
ssp. *sibthorpiana* (Reichb.) Rech.  
A3 Bolu: 26 km W Gerede, Feld  
13.6.1971 1000 m 71-2-12  
A4 Bolu: 1 km W Gerede, Straßenrand-Böschung  
2.7.1969 1300 m 69-7-1  
+ A6 Samsun: 16 km W Samsun, Küste  
6.7.1969 5 m 69-20-2  
B4 Ankara: 39 km NW Şereflikoçhisar, Brache  
6.6.1962 1000 m 62-78-8
- 106.*S.nocturna* L.  
+ A6 Ordu: 6 km W Ünye, Küste  
6.7.1969 10 m 69-21-6
- 107.*S.discolor* Sibth. & Sm.  
C1 Izmir: Kuşadası, Strand  
17.6.1965 20 m 65-9-90
- 111.*S.colorata* Poiret  
B1 Çanakkale: Troja, zwischen Ruinen  
16.5.1963 50 m 63-8-8
- 113.*S.macrodonta* Boiss.  
+ B4 Konya: 53 km N Konya, Feldrand  
29.5.1973 1000 m 73-3-8  
C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel  
25.5.1963 1150 m 63-28-65  
C5 Adana: Tekir Tepesi, offener Pinus pall.-Wald  
2.6.1962 1268 m 62-68-41
- 115.*S.subconica* Friv.  
+ A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel  
15.6.1971 900 m 71-6-13  
+ A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-31  
B5 Yozgat: 1 km E Yozgat, felsiger Hügel  
27.6.1970 1300 m 70-15-1  
C3 Burdur: 3 km W Burdursee, Brache  
20.5.1963 900 m 63-22-4  
C3 Isparta: NW-Ende Beyşehirsee, Steppenhügel  
14.6.1966 1300 m 66-44-32  
+ C4 Konya: 4 km N Çumra, Schottergrube  
29.5.1973 1020 m 73-5-4

SILENE (Forts.)

13. CARYOPHYLLACEAE

118. *S. conoidea* L.

- + A6 Sivas: Yildiz D., Feldrand  
15.7.1969 1500 m 69-57-5
- B5 Yozgat: 28 km W Yozgat, Brache  
27.6.1970 1100 m 70-14-1
- C2 Afyon: 35 km W Dinar, Feldrand  
7.6.1964 900 m 64-47-7
- C3 Isparta: NW-Ende Beyşehirsee, Steppenhügel  
5.6.1964 1300 m 64-41-75

31. *LYCHNIS* L.

1. *L. coronaria* (L.) Desr.

- A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalden  
3.7.1969 1300 m 69-13-11

32. *AGROSTEMMA* L.

1. *A. githago* L.

- A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalden  
3.7.1969 1300 m 69-13-8
- C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brache  
1.6.1973 900 m 73-14-5

14. ILLECEBRACEAE

1. *HERNIARIA* L.

1. *H. glabra* L.

- C3 Isparta: Dedegöl D., Pinus pall.-Wald  
18.7.1968 1400 m 68-43-1

3. *H. micrantha* A.K. Jackson & Turrill

- + A4 Ankara: Kizilcahamam-Çeltikçi, Flußufer  
23.8.1977 950 m 77-59-19
- + B2 Izmir: Boz D., Zwergstrauchzone  
5.7.1968 1300 m 68-16-3

4. *H. hirsuta* L.

- A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
13.7.1969 1500 m 69-50-6
- C1 Izmir: N Kuşadası, medit. Vegetation  
17.6.1965 50 m 65-9-8

Folgende Belege wurden von Chaudhri als  
*H. cinerea* DC. bestimmt :

- B5 Kayseri: W Develi, Felssteppe  
12.7.1977 1100 m 77-40-8
  - B5 Kirşehir: 31 km S Kirşehir, Straßenrand  
17.7.1969 1000 m 69-64-6
  - C2 Burdur: 15 km E Saldasee, Brache  
20.5.1963 1200 m 63-20-25
  - C2 Denizli: S Pamukkale, Brache  
19.6.1965 300 m 65-14-31
  - C3 Antalya: W Antalya, Strand  
30.5.1963 10 m 63-40-5
  - + C4 İçel: Uzuncaburç, zwischen Ruinen  
21.6.1971 900 m 71-23-11
- H. caucasica* Ruprecht  
Diese Art scheint bei Davis "Flora of Turkey"  
nicht auf.
- + A7 Giresun: 25 km S Giresun, trockenes Bachbett  
7.7.1969 500 m 69-23-30

2. PARONYCHIA Miller

## 14. ILLECEBRACEAE

6. P. kurdica Boiss.

ssp. kurdica

var. kurdica

A7 Sivas: 10 km NW Şebinkarahisar,  
trockenes Flußbett

8.7.1969 1300 m 69-31-8

B6 Sivas: 18 km S Zara, Steppenhügel

9.7.1969 1500 m 69-37-28b

C4 Içel: 2 km N Mut, Brachen

5.6.1966 290 m 66-19-21

10. P. mughlai Chaudhri

C2 Burdur: 15 km E Saldasee, Serpentin hügel

20.5.1963 1200 m 63-20-23

13. P. amani Chaudhri

+ B4 Kirşehir: 33 km NW Kirşehir, Steppe

29.5.1964 1500 m 64-20-37

17. P. chionaea Boiss.

+ A6 Sivas: 36 km NE Sivas, Felssteppe

13.7.1969 2000 m 69-53-12

B2 Izmir: Boz D., Bergsteppe

5.7.1968 1500 m 68-16-2

B3 Bilecik: 51 km N Kütahya, Steppenreste

22.5.1962 1000 m 62-19-3

C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel

25.5.1963 1150 m 63-28-63

C3 Isparta: Dedegöl D., Felssteppe

3.7.1965 1400 m 65-43-12

18. P. anatolica Czeacz.

ssp. anatolica

+ C3 Isparta: NW-Ende Beyşehirsee, Steppenhügel

16.6.1967 1300 m 67-4-30

ssp. balansae Chaudhri

+ B3 Afyon: 35 km S Çifteler, Artemisia-Steppe

19.7.1968 1000 m 68-48-1

22. P. dudleyi Chaudhri

+ A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache

8.7.1969 950 m 69-32-11

+ C4 Konya: 20 km N Konya, Steppenhügel

10.6.1966 1300 m 66-37-40

23. P. galatica Chaudhri

B6 Sivas: 14 km N Sivas, Steppenhügel

12.7.1969 1450 m 69-49-112a

25. P. paphlagonica Chaudhri

+ B6 Sivas: 18 km S Zara, Steppenhügel

9.7.1969 1500 m 69-37-28a

28. P. adalia Chaudhri

+ B3 Kütahya: 50 km N Afyon, Steppe

1.6.1963 1000 m 63-46-36

B3 Eskişehir: 50 km N Kütahya, Steppe

1.6.1963 1000 m 63-50-10

+ C2 Antalya: Susuz D., Felsvegetation

28.5.1963 1900 m 63-35-34

4. SCLERANTHUS L.1. S. perennis L.

ssp. dichotomus (Schur) Stoj. &amp; Stefanov

+ A1 Edirne: 20 km E Edirne, Brache

5.6.1963 50 m 63-58-15

## SCLERANTHUS (Forts.)

## 14. ILLECEBRACEAE

2. *S. annuus* L.ssp. *annuus*

- + B2 Izmir: S Boz D., Waldrand  
5.7.1968 1100 m 68-16-16
- + B5 Kayseri: Erciyas D., Felsblockhalde  
11.7.1977 1700 m 77-35-12
- + C3 Isparta: NE Anamas, Bachrand  
16.7.1968 1500 m 68-37-14

ssp. *polycarpus* (L.) Thell.

- + A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalde  
3.7.1969 1300 m 69-13-14
- A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,  
felsiger Steppenhang  
24.6.1970 1500 m 70-5-13
- C3 Isparta: Dedegöl D., Schutthalden  
1.7.1965 1900 m 65-42-6
- ssp. *verticillatus* (Tausch) Arc.
- + C2 Burdur: 15 km E Saldasee, Brache  
20.5.1963 1200 m 63-20-26

3. *S. uncinatus* Schur

- A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,  
felsiger Steppenhang  
24.6.1970 1500 m 70-5-14

HABROSIA Fenzl

Scheint bei Davis "Flora of Turkey" nicht auf.

*H. spinuliflora* (Ser.) Fenzl

- + C7 Urfa: 24 km S Hilvan, Weingarten  
6.7.1973 700 m 73-25-23

## 15. POLYGONACEAE

1. ATRAPHAXIS L.1. *A. spinosa* L.

- B6 Sivas: Gök Pinar, Steppenhang  
9.9.1977 1800 m 77-106-5
- B7 Sivas: 8 km NE Divriği, Steppenhang  
1.7.1970 1200 m 70-31-22

2. *A. billardieri* Jaub. & Spachvar. *billardieri*

- + A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-76
- + A6 Sivas: 26 km W Suşehri, Steppenhügel  
8.7.1969 1600 m 69-34-25
- B5 Kayseri: W Develi, Steppenhügel  
27.8.1977 1150 m 77-71-7
- C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde  
25.6.1971 1510 m 71-45-34
- var. *tournefortii* (Jaub. & Spach) Cullen
- + A6 Sivas: 26 km W Suşehri, Steppenhügel  
8.7.1969 1600 m 69-34-35
- + C4 Konya: 4 km W Meram, Bergsteppe  
12.6.1966 1250 m 66-41-41

5. OXYRIA Hill1. *O. digyna* (L.) Hill

- + B5 Kayseri: Erciyas D., Schutthalden  
29.8.1977 2800 m 77-76-29

6. POLYGONUM L.

## 15. POLYGONACEAE

3. *P. amphibium* L.  
A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Ufervegetation  
27.6.1977 2 m 77-8-32
5. *P. lapathifolium* L.  
+ B5 Nevşehir: 3 km S Ürgüp, Bachrand  
27.8.1977 1150 m 77-72-10
7. *P. hydropiper* L.  
+ A4 Ankara: 2 km S Kizilcahamam, Flußufer  
23.8.1977 950 m 77-59-25
8. *P. setosum* Jacq.  
+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde  
16.7.1969 1400 m 69-59-25  
+ B6 Sivas: 31 km W Divriği, Steinsteppe  
29.6.1970 1400 m 70-23-7  
B7 Sivas: Yama Dağları, NE-expon. Schutthalde  
1.8.1976 2000 m 76-14-27  
B8 Elazığ: 40 km W Bingöl, Felsblockhalde  
1.9.1977 1350 m 77-83-10  
+ C3 Konya: ca. 34 km NE Beyşehir, Felssteppe  
6.7.1970 1200 m 70-42-17
14. *P. cognatum* Meissn.  
B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht  
3.8.1976 1600 m 76-24-30  
C2 Antalya: 32 km SW Elmali, Steppenhügel  
22.6.1965 1200 m 65-25-38
17. *P. arenastrum* Bor.  
B5 Nevşehir: Göreme, sandiges Tal  
26.8.1977 1250 m 77-68-48
18. *P. aviculare* L.  
C2 Antalya: Ak D., Yesil-Göl, Schutthalde  
10.7.1968 1800 m 68-25-34
19. *P. polycnemoides* Jaub. & Spach  
+ B6 Sivas: Gök Pinar, sandiger Steilhang  
9.9.1977 1800 m 77-106-20
21. *P. equisetiforme* Sibth. & Sm.  
+ C4 Içel: 3 km N Silifke, mediterr. Vegetation  
3.7.1977 200 m 77-15-17  
C5 Içel: 27 km E Silifke, mediterr. Vegetation  
18.6.1971 10 m 71-13-25
24. *P. pulchellum* Lois.  
B8 Elazığ: 30 km W Bingöl, breiter Feldrand  
6.9.1977 1800 m 77-100-2
25. *P. bellardii* All.  
A1 Edirne: Türk.-bulg. Grenze, Feldrand  
13.6.1962 50 m 62-97-19  
A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalde  
3.7.1969 1300 m 69-13-91  
C3 Antalya: 27 km SW Korkuteli, Steppenreste  
12.7.1968 1200 m 68-27-5  
C6 Adana: 25 km NE Feke, Bachrand  
7.7.1977 1200 m 77-26-24
26. *P. convolvulus* L.  
B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz  
4.7.1970 1250 m 70-37-29  
+ B6 Sivas: 8 km N Sivas, Brache  
28.6.1970 1350 m 70-19-37

7.RUMEX L.

## 15.POLYGONACEAE

- 1.*R.acetosella* L.  
 A2 Bursa: Ulu D.,Waldrand  
 20.7.1968 1800 m 68-53-21  
 + A6 Sivas: Yildiz D.,Felsblockhalden  
 29.7.1976 2200 m 76-8-92  
 B6 Sivas: ca.40 km E Kangal,Gebirgssteppe  
 29.6.1970 2000 m 70-22-67
- 2.*R.scutatus* L.  
 A4 Ankara: 16 km E Ayaş,Steppenhügel  
 14.6.1973 1195 m 73-41-49  
 + A6 Sivas: 11 km W Çirçir,Felsblockhalde  
 16.7.1969 1700 m 69-59-24  
 B5 Nevşehir: 4 km E Ürgüp, Steppenhügel  
 13.7.1977 1300 m 77-42-15  
 B6 Adana: 7 km N Saimbeyli,Felswand  
 7.7.1977 1400 m 77-27-41  
 B7 Sivas: Yama Dağları,Steinsteppe  
 1.8.1976 1700 m 76-13-50  
 C3 Isparta: NE Anamas,Ayvali Cay,Bergsteppe  
 16.7.1968 1500 m 68-37-92
- 5.*R.alpinus* L.  
 + B6 Sivas: ca.40 km E Kangal,Gebirgssteppe  
 29.6.1970 2000 m 70-22-68
- 12.*R.angustifolius* Campd.  
 ssp. *angustifolius*  
 + A6 Sivas: Yildiz D.,Felsblockhalden  
 29.7.1976 2400 m 76-8-93  
 C3 Isparta: Dedegöl D.,Gebirgssteppe  
 8.7.1970 2000 m 70-46-59  
 + C6 Adana: Nur Dağları,Felssteppe  
 5.6.1973 1600 m 73-22-15
- 13.*R.crispus* L.  
 + A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu,Bachrand  
 3.7.1969 1300 m 69-13-92
- 14.*R.conglomeratus* Murray  
 A2 Bursa: W Narlica,Ölbaumkulturen  
 29.6.1977 90 m 77-9-10  
 A2 Kocaeli: 40 km W Izmit,Pfirsichkulturen  
 23.6.1970 20 m 70-1-9  
 A4 Kastamonu: 2 km S Kizilcahamam,Flußufer  
 23.8.1977 950 m 77-59-30
- 19.*R.pulcher* L.  
 + A5 Sinop: 10 km E Gerze,Feldrand  
 5.7.1969 125 m 69-19-3  
 B2 Izmir: Boz D.,Gölcük,Seeufer  
 4.7.1968 1400 m 68-15-41  
 C1 Izmir: Kuşadası,Feldrand  
 17.6.1965 40 m 65-9-9  
 C2 Antalya: 32 km SW Elmalı,Feldrand  
 10.7.1968 1300 m 68-25a-30
- 21.*R.nepalensis* Sprengel  
 A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu,Bachrand  
 3.7.1969 1300 m 69-13-93  
 A7 Giresun: 22 km S Şebinkarahisar,Schutthalden  
 7.7.1969 1700 m 69-29-26  
 + C3 Isparta: Dedegöl D.,Bachrand  
 17.7.1968 1400 m 68-43-85

## RUMEX (Forts.)

## 15. POLYGONACEAE

23. *R. bucephalophorus* L.

C1 Izmir: Kuşadası, medit. Vegetation

17.6.1965 50 m 65-9-10

*R. crispus* x *nepalensis* = *R. remotiflorus* SamuelssonWurde in Davis "Flora of Turkey" nicht  
aufgenommen; wird für Amanus, Syrien u.  
Libanon angegeben.

+ C3 Isparta: Dedegöl D., Bachrand

7.7.1970 1300 m 70-45-17

## 16. CHENOPODIACEAE

2. BETA L.1. *B. trigyna* Waldst. & Kit.

+ B6 Sivas: 17 km S Kangal, Steppenhänge

2.8.1976 1500 m 76-17-10

*B. corolliflora* Zos. ex Buttler(siehe Anmerkung in Davis "Flora of Turkey",  
Seite 299)

+ A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Bachrand

3.7.1969 1300 m 69-13-94  
(det. Buttler)

+ A7 Giresun: 22 km N Şebinkarahisar, Schutthalden

7.7.1969 1700 m 69-29-27  
(det. Buttler)3. CHENOPODIUM L.1. *C. botrys* L.

+ B1 Çanakkale: 50 km W Edremit, medit. Vegetation

14.6.1964 500 m 64-71-15

B1 Izmir: 19 km N Selçuk, feuchte Senke

6.7.1968 50 m 68-17-1

B5 Yozgat: 49 km W Yozgat, Paganum-Steppe

28.7.1976 700 m 76-6-1

+ B6 Sivas: 11 km N Ulaş, Salzsteppe

31.7.1976 1350 m 76-10-3

+ C1 Izmir: Ephesos, zwischen Ruinen

17.6.1965 100 m 65-13-1

+ C2 Burdur: 3 km W Tefenni, trockenes Bachbett

9.7.1968 1100 m 68-22-7

+ C3 Isparta: 18 km W Eğirdir, Brache

15.7.1968 900 m 68-33-20

+ C4 İçel: 12 km NW Mut, Brache

6.6.1966 320 m 66-23-9

C4 Konya: 20 km N Konya, trockenes Bachbett

10.6.1966 1300 m 66-37-32

+ C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Flußbett

9.6.1973 1200 m 73-30-3

2. *C. foliosum* (Moench) Aschers.

A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Waldrand

3.7.1969 1300 m 69-13-36

B7 Sivas: 2 km NE Mursal, Bachrand

1.8.1976 1650 m 76-12-7

4. *C. murale* L.

+ B1 Izmir: 30 km W Izmir, Feld

4.7.1968 30 m 68-9-10

+ C4 İçel: 3 km N Silifke, medit. Vegetation

3.7.1977 200 m 77-15-2

+ C5 İçel: 27 km E Silifke, medit. Vegetation

29.5.1973 10 m 73-8-3

## CHENOPODIUM (Forts.)

## 16. CHENOPODIACEAE

7. *C. vulvaria* L.

- + A4 Ankara: 60 km NW Ankara, Brache  
24.6.1970 900 m 70-6-2  
+ C2 Denizli: 40 km W Tefenni, Wassergraben  
9.7.1968 1000 m 68-21-11

10. *C. polyspermum* L.

- + B5 Nevşehir: Göreme, sandiges Tal  
26.8.1977 1200 m 77-68-16

11. *C. album* L.ssp. *album*var. *album*

- C3 Isparta: 18 km W Eğridir, Brache  
15.7.1968 1000 m 68-33-18

var. *microphyllum* (Boenn.) Aellen

- + B1 Balıkesir: 12 km S Burhaniye, Ölbaumkulturen  
3.7.1967 20 m 67-46-2

ssp. *iranicum* Aellen

- + B6 Sivas: 3 km E Gürün, Wassergraben  
8.9.1977 1260 m 77-103-6

*C. ambrosioides* L.

(Neu für die Türkei)

- + C4 Içel: 32 km W Gilindere, Feldrand  
4.6.1966 100 m 66-14-7a

5. *ATRIPLEX* L.4. *A. laevis* C.A. Meyer

- + B4 Ankara: N-Ende Tuz-Gölü, Salzsteppe  
26.6.1970 900 m 70-8-1  
B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz  
4.7.1970 1250 m 70-37-5

7. *A. rosea* L.

- A4 Ankara: 2 km S Kızılcahamam, Flußufer  
23.8.1977 950 m 77-59-1

6. *HALIMIONE* Aellen1. *H. portulacoides* (L.) Aellen

- C5 Içel: 27 km E Silifke, medit. Vegetation  
29.5.1973 10 m 73-8-4

12. *KOCHIA* Roth1. *K. prostrata* (L.) Schrad.

- B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz  
4.7.1970 1250 m 70-37-10  
B9 Bitlis: 5 km W Adilcevaz, felsige Steilhänge  
4.9.1977 1750 m 77-92-10

2. *K. scoparia* (L.) Schrad.

- B5 Kirşehir: 31 km S Kirşehir, Feldrand  
17.7.1969 1000 m 69-64-5  
B5 Nevşehir: Göreme, lockerer Sandstein  
6.8.1976 1200 m 76-30-8

16. *HALOCNEMUM* Bieb.1. *H. strobilaceum* (Pall.) Bieb.

- + A5 Çorum: ca. 24 km S Sungurlu, Salzsteppe  
24.8.1977 670 m 77-63-8

22. *SALSOLA* L.2. *S. ruthenica* Iljin

- A1 Çanakkale: 6 km S Çanakkale, Strandvegetation  
2.7.1968 5 m 68-3-8  
B5 Nevşehir: Göreme, lockerer Sandstein  
17.7.1969 1200 m 69-63-11  
B5 Niğde: 33 km S Nevşehir, Feldrand  
5.6.1962 1300 m 62-74d-3

SALSOLA (Forts.)

## 16. CHENOPODIACEAE

2. S. ruthenica (Forts.)

C3 Isparta: 18 km W Eğridir, Brache  
15.7.1968 1000 m 68-33-19

3. S. tragus L.

+ B1 Izmir: 30 km W Izmir, Strandvegetation  
4.7.1968 5 m 68-9-6

13. S. laricina Pall.

+ C4 İçel: 21 km S Mut, lehmiger Steppenhang  
4.7.1977 200 m 77-19-9

24. NOAEA Moq.2. N. mucronata (Forssk.) Aschers. & Schweinf.  
ssp. mucronata

B5 Kayseri: 14 km S Incesu, Salzsteppe  
3.7.1970 1000 m 70-35-3

B5 Niğde: E Aksaray, Steppe  
25.8.1970 1000 m 77-67-11

B6 Malatya: E Kürecik, Straßenrand  
1.9.1977 1800 m 77-81-4

C4 İçel: 2 km N Mut, Brache  
5.6.1966 290 m 66-19-26

25. CYATHOBASIS Aellen1. C. fruticulosa (Bunge) Aellen

B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz  
4.7.1970 1250 m 70-37-7

26. PETROSIMONIA Bunge1. P. brachiata (Pallas) Bunge

+ A5 Çorum: ca. 24 km SW Sungurlu, Salzsteppe  
24.8.1977 670 m 77-63-9

## 17. AMARANTHACEAE

1. AMARANTHUS L.1. A. retroflexus L.

+ B6 Sivas: 3 km E Gürün, Wassergraben  
8.9.1977 1600 m 77-103-2

6. A. lividus L.

+ B1 Izmir: 30 km W Izmir, Feld  
4.7.1968 20 m 68-9-9a

8. A. albus L.

+ B1 Izmir: 30 km W Izmir, Feld  
4.7.1968 30 m 68-9-8

+ B2 Bilecik: 15 km NW Bozüyük, Feldrand  
19.7.1968 900 m 68-49-8

+ C1 Izmir: Ephesos, zwischen Ruinen  
1.7.1967 50 m 67-44-7

## 18. CYNOCRAMBACEAE

1. THELIGONUM L.1. T. cynocramba L.

C2 Denizli: Pamukkale, Mauerhöhlen  
31.5.1966 400 m 66-6-26

+ C4 İçel: 24 km E Mut, Felshöhlen  
19.6.1971 1000 m 71-19-5

## 22. TAMARICACEAE

2. TAMARIX L.1. T. hampeana Boiss. & Heldr.

+ C1 Izmir: Kuşadası, Strandvegetation  
17.6.1965 20 m 65-10-7

2. T. tetrandra Pallas ex Bieb.

+ C2 Antalya: 32 km SW Elmali, Bachrand  
25.6.1967 1200 m 67-25-2

## TAMARIX (Forts.)

## 22.TAMARICACEAE

## 3.T.parviflora DC.

C5 İçel: 27 km E Silifke, medit. Vegetation  
18.6.1971 10 m 71-13-32

## 4.T.smyrnensis Bunge

A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Damm  
27.6.1977 2 m 77-8-45

## + B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz

4.7.1970 1250 m 70-37-35

## B6 Malatya: 5 km NW Darende, feuchter Graben

8.9.1977 1200 m 77-105-37

## B6 Sivas: 2 km SE Sincan, Bachrand

30.6.1970 1450 m 70-27-6

## C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Flußbett

9.6.1973 900 m 73-30-30

## 3.MYRICARIA Desv.

## 1.M.germanica (L.) Desv.

B6 Malatya: 5 km NW Darende, feuchter Graben

8.9.1977 1200 m 77-105-28

## B7 Sivas: 8 km NE Divriği, Bachrand

1.7.1970 1300 m 70-31-31

## 23.FRANKENIACEAE

## 1.FRANKENIA L.

## 1.F.hirsuta L.

## + A5 Çorum: 24 km SW Sungurlu, Salzsteppe

24.8.1977 670 m 77-63-4

## + C1 Izmir: Kuşadası, Strand-Fels

11.6.1964 20 m 64-57-1

## 27.GUTTIFERAE

## 1.HYPERICUM L.

## 10.H.pallens Banks &amp; Sol.

C6 Adana: 20 km NW Kadirli, Felswand  
31.5.1973 250 m 73-10-11

## 16.H.hyssopifolium Chaix

ssp. elongatum Ledeb.

var. elongatum

## + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe

13.7.1969 1800 m 69-52-17b

## + C3 Isparta: Çiçek D., Cedrus libani-Wald

17.6.1966 1500 m 66-50-51

## 17.H.lydium Boiss.

A3 Ankara: 2 km E Nallihan, Gebüschvegetation

14.6.1973 800 m 73-43-4

A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe

13.7.1969 1800 m 69-52-17

B5 Nevşehir: 17 km SE Ürgüp, Straßenrand

1.6.1964 1200 m 64-29-2

C6 Adana: 10 km E Osmaniye, medit. Vegetation

24.6.1971 600 m 71-33-3

## 19.H.pseudolaeye Robson

## + B6 Sivas: 8 km S Zara, Brachen

8.7.1969 1500 m 69-36-23

B7 Sivas: Yama Dağları, felsig-steiniger Osthang

1.8.1976 2000 m 76-16-9

## 20.H.olivieri (Spach) Boiss.

## + B7 Malatya: 30 km E Kürecik, breiter Feldrand

9.6.1973 1000 m 73-31-9

## 22.H.uniglandulosum Hausskn. ex Bornm.

## + B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel

9.7.1969 1500 m 69-42-82

## HYPERICUM (Forts.)

## 27. GUTTIFERAE

24. *H. capitatum* Choisyvar. *luteum* Robson

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları,

Fagus orientalis-Wald

5.6.1973 1400 m 73-21-54b

26. *H. scabrum* L.

+ A6 Sivas: 36 km NE Sivas, Bergsteppe

13.7.1969 1500 m 69-54-8

A7 Giresun: 22 km N Şebinkarahisar, Schutthalden

7.7.1969 1700 m 69-29-20

B3 Afyon: 26 km S Emirdağ, Linum-Brache

20.6.1966 1000 m 66-54-31

B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, felsige Steilhänge

7.7.1977 1400 m 77-27-27

B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand

25.6.1971 1700 m 71-47-15

B7 Sivas: Yama Dağları, felsig-steinige Hänge

1.8.1976 2000 m 76-16-26

C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel

22.6.1965 1150 m 65-25-2

C3 Isparta: Anamas D., Steppenhügel

14.6.1966 1200 m 66-44-68

C5 Adana: Tekir Tepesi, offener Pinus pall.-Wald

2.6.1962 1260 m 62-68-22

32. *H. confertum* Choisyssp. *confertum*

C3 Antalya: 28 km N Akseki, offener Pinus

pallasiana-Wald

29.5.1962 1300 m 62-59-15

34. *H. linarioides* Bosse

A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,

felsiger Steppenhänge

24.6.1970 1500 m 70-5-42

A5 Sinop: 20 km N Boyabat, Pinus sylv.-Wald

5.7.1969 1400 m 69-17-15

35. *H. armenum* Jaub. & Spach

+ C6 Maraş: W Çokak, Ağça D., Felssteppe

2.6.1973 1700 m 73-15-45

45. *H. montanum* L.

+ A7 Giresun: 13 km S Dereli, Buschvegetation

7.7.1969 1000 m 69-24-4

46. *H. lanuginosum* Lam.var. *lanuginosum*

C4 Konya: 60 km W Mut, Pinus brutia-Wald

7.6.1966 600 m 66-30-4

C6 Adana: 3 km SE Kadirli, Myrthus-Macchie

22.6.1971 200 m 71-29-7

53. *H. montbretii* Spach

A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu, Pinus brutia-Wald

29.5.1966 300 m 66-2-25

B1 Çanakkale: W Edremit, Pinus brutia-Wald

14.6.1964 100 m 64-72-14

C6 Adana: 14 km E Osmaniye, Bachrand

24.6.1971 900 m 71-34-33

C6 Maraş: 30 km NW Kadirli, Waldrand

31.5.1973 500 m 73-11-7

## HYPERICUM (Forts.)

## 27.GUTTIFERAE

## 59.H.olympicum L.

ssp. olympicum

B1 Çanakkale: 13 km S Troja, Pinus brutia-Wald  
14.6.1964 200 m 64-72-4

## 62.H.origanifolium Willd.

A3 Bolu: Abant-See, Felssteppe

1.7.1969 1400 m 69-4-57

A5 Çorum: Boğazkale, Fels

16.6.1971 1000 m 71-7-48

A5 Sinop: 13 km W Boyabat, Fels

4.7.1969 400 m 69-16-16

B5 Nevşehir: 8 km SE Ürgüp, Steppe

1.6.1964 1200 m 64-32-62

C3 Antalya: 28 km N Akseki, Pinus pall.-Wald

29.5.1962 1300 m 62-59-17

C5 Adana: E Gülek Boğaz, offener

Cedrus libani-Wald

3.6.1962 2000 m 62-71-32

## 63.H.aviculariifolium Jaub. &amp; Spach

ssp. depilatum (Freyn &amp; Bornm.) Robson

var. depilatum

A3 Bolu: 35 km N Nallihan, Felswand

14.6.1973 900 m 73-44-7

B3 Isparta: NW Şarkikaraağaç, Felssteppe

20.6.1966 1350 m 66-53-4

B3 Konya: 10 km S Akşehir, Sultan D., Schutthalde

19.7.1968 1400 m 68-46-1

B3 Kütahya: 50 km N Afyon, Steppe

1.6.1963 1000 m 63-46-20

C2 Antalya: Ak D., Bergsteppe

23.6.1965 1400 m 65-26-67

## 66.H.tetrapterum Fries

+ B6 Sivas: 11 km N Sivas, feuchte Wiesen

10.9.1977 1300 m 77-109-8

C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Bachrand

25.6.1967 1150 m 67-25-13

C3 Isparta: Dedegöl D., feuchte Wiesen

7.7.1970 1400 m 70-45-11

C6 Malatya: 31 km N Gölbaşı, Bachrand

25.6.1971 1250 m 71-44-10

## 67.H.perforatum L.

A1 Edirne: türk.-bulg. Grenzstation, Feldrand

13.6.1962 150 m 62-97-1

A3 Bolu: Bolu D., Pinus sylvestris-Wald

24.6.1970 750 m 70-3-11

A3 Sakarya: 18 km E Adapazari, Feldrand

19.7.1969 30 m 69-66-5

A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, Pinus sylv.-Wald

24.6.1970 1500 m 70-5-43

A4 Çankiri: 46 km S Karabük, Feldrand

2.7.1969 800 m 69-8-26

A6 Ordu: 3 km E Bolaman, Corylus-Kulturen

6.7.1969 250 m 69-22-7

B2 Bilecik: 60 km W Eskişehir, Feldrand

19.7.1968 900 m 68-49-1

B3 Konya: 10 km S Akşehir, Sultan D., Schutthalde

19.7.1968 1400 m 68-46-1

## HYPERICUM (Forts.)

## 67.H.perforatum (Forts.)

- B6 Malatya: 5 km NW Darende, feuchter Graben  
8.9.1977 1200 m 77-105-22  
B9 Bitlis: 5 km S Bitlis, felsiger Flußeinschnitt  
5.9.1977 1400 m 77-94-11  
C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Bachrand  
10.7.1968 1200 m 68-25a-6  
C3 Isparta: 17 km E Eğridir, Pinus pall.-Wald  
15.7.1968 1200 m 68-36a-3  
C5 Adana: 14 km S Feke, Pinus brutia-Wald  
7.7.1977 1100 m 77-25-10  
C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
23.6.1971 100 m 71-31-25

## 68.H.triquetrum Turra

- B1 Çanakkale: Troja, Feldrand  
16.6.1965 50 m 65-4-4  
C1 Izmir: Kuşadası, medit. Vegetation  
17.6.1965 30 m 65-9-55  
C5 Adana: 3 km N Karataş, medit. Vegetation  
5.7.1977 15 m 77-22-7

28.MALVACEAE

5.MALVA L.

## 5.M.sylvestris L.

- + A7 Giresun: 25 km S Giresun, trockenes Bachbett  
7.7.1969 500 m 69-23-38

## 7.M.neglecta Wallr.

- + A4 Bolu: 1 km W Gerede, Böschung  
24.6.1970 1300 m 70-4-4  
B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz  
4.7.1970 1250 m 70-37-25  
C4 Içel: 25 km E Mut, Gebüschrand  
19.6.1971 1000 m 71-18-20

7.LAVATERA L.

## 5.L.punctata All.

- A2 Kocaeli: 5 km E Izmit, Pappelkultur  
23.6.1970 30 m 70-2-3  
A3 Sakarya: 18 km E Adapazarı, Feldrand  
19.7.1969 30 m 69-66-8  
C5 Adana: 1 km E Yumurtalık, medit. Vegetation  
4.6.1973 10 m 73-19-4

8.ALCEA L.

## 2.A.striata (DC.) Alef.

ssp. striata

- C6 Adana: 25 km NE Feke, Bachrand  
7.7.1977 1200 m 77-26-2  
+ C6 Maraş: 44 km S Maraş, Brache  
24.6.1971 600 m 71-38-3

## 4.A.digitata (Boiss.) Alef.

- + C4 Içel: S Uzuncaburç, Pinus brutia-Wald  
3.7.1977 800 m 77-17-2

## 5.A.setosa (Boiss.) Alef.

- + B4 Ankara: 20 km S Ankara, Gölbaşı, Feldrand  
18.7.1969 800 m 69-65-3

## 6.A.apterocarpa (Fenzl) Boiss.

- C3 Isparta: 18 km E Eğridir, Brache  
15.7.1968 1000 m 68-33-13

## ALCEA (Forts.)

28.MALVACEAE

## 10.A.hohenackeri (Boiss.&amp; Huet)Boiss.

+ B4 Ankara: Hirfanli-Stausee,Uferbereich

26.6.1970 800 m 70-11-2

+ C7 Urfa: 13 km S Hilvan,Feld

7.6.1973 800 m 73-26-11

## 13.A.pallida Waldst.&amp; Kit.

B1 Manisa: 1 km W Turgutlu,Feldrand

4.7.1968 100 m 68-11-3

B3 Konya: 10 km S Akşehir,Sultan D.,Schutthalde

19.7.1968 1300 m 68-46-16

+ B7 Sivas: 15 km NW Divriği,Bachrand

10.7.1969 1200 m 69-43-2

## 9.ALTHAEA L.

## 1.A.cannabina L.

A2 Bursa: W Narlica,Ölbaumkultur

29.6.1977 90 m 77-9-1

C6 Adana: Kara Tepe,medit. Vegetation

23.6.1971 100 m 71-31-39

## 3.A.officinalis L.

+ C3 Konya: NE-Ufer Beyşehirsee,feuchte Senke

6.7.1970 1150 m 70-43-9

29.TILIACEAE

## 1.TILIA L.

## 2.T.cordata Miller

+ C3 Isparta: Dedegöl D.,Pinus pall.-Wald

7.7.1970 1400 m 70-45-25

30.LINACEAE

## 1.LINUM L.

## 5.L.cariense Boiss.

B3 Kütahya: 20 km SE Kütahya,Steppenreste

1.6.1963 900 m 63-47-1

## 6.L.mucronatum Bertol.

ssp. armenum (Bordz.)Davis

A7 Giresun: 10 km W Şebinkarahisar,  
trockenes Flußbett

8.7.1969 1300 m 69-31-10

B6 Sivas: 44 km S Zara,Felsvegetation

9.7.1969 1600 m 69-39-12

B7 Malatya: 30 km E Kürecük,breiter Feldrand

9.6.1973 1000 m 73-31-11

C5 Adana: 5 km E Çiftahan,Steppe

5.6.1962 1200 m 62-74a-7

## 10.L.nodiflorum L.

+ A3 Bilecik: 27 km N Bilecik,Steppenreste

27.5.1964 300 m 64-7-7

A3 Sakarya: 6 km E Taraklı,Gebüschvegetation

14.6.1973 500 m 73-46-9

B3 Konya: 10 km S Akşehir,Sultan D.,Felssteppe

19.7.1968 1400 m 68-46-41

B5 Nevşehir: 14 km SE Ürgüp,Steppenhänge

1.6.1964 1200 m 64-30-15

B6 Sivas: 14 km N Sivas,Schutthalden

12.7.1969 1400 m 69-49-117

B7 Sivas: 8 km NE Divriği,Brache

1.7.1970 1200 m 70-31-13

## LINUM (Forts.)

## 30.LINACEAE

## 10.L.nodiflorum (Forts.)

- C3 Burdur: 40 km S Burdur, Garigues  
31.5.1963 900 m 63-42-25  
C5 Adana: Tekir Tepesi, Pinus pall.-Wald  
2.6.1962 1260 m 62-68-15  
C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
23.6.1971 100 m 71-31-36

## 14.L.corymbulosum Reichb.

- A1 Edirne: 25 km SE Kreuzung Keşan, Waldrand  
23.6.1977 500 m 77-1-24  
+ C4 Içel: 12 km N Silifke, medit. Vegetation  
21.6.1971 300 m 71-26-13  
C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
23.6.1971 100 m 71-31-38

## 15.L.trigynum L.

- A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Pinus brutia-Wald  
29.5.1966 300 m 66-2-22  
B1 Balıkesir: 28 km E Edremit, Pinus brutia-Wald  
14.6.1964 100 m 64-69-11

## 16.L.strictum L.

var. spicatum Pers.

- C1 Izmir: Kuşadası, medit. Vegetation  
17.6.1965 40 m 65-9-26

## 18.L.hirsutum L.

ssp. pseudoanatolicum Davis

- B5 Nevşehir: Göreme, sandiges Tal  
26.8.1977 1200 m 77-68-40  
C3 Burdur: 5 km S Burdur, Steppe  
31.5.1963 1100 m 63-43-70

## 28.L.tenuifolium L.

- A2 Bursa: 28 km E Bursa, Pinus brutia-Wald  
19.7.1968 500 m 68-50-6  
A4 Ankara: 16 km E Ayaş, Steppenhänge  
17.7.1977 1190 m 77-56-31  
B6 Sivas: 14 km N Sivas, Bachbett-Rand  
12.7.1969 1400 m 69-49-116  
B6 Malatya: 5 km NW Malatya, feuchter Graben  
8.9.1977 1200 m 77-105-25  
C4 Içel: 18 km E Mut, offener Pinus brutia-Wald  
19.6.1971 1100 m 71-17-16  
C5 Adana: Tekir Tepesi, Pinus pall.-Wald  
2.6.1962 1268 m 62-68-39

## 32.L.obtusatum (Boiss.) Stapf

- + C3 Isparta: Dedegöl D., Schutthalden  
1.7.1965 1900 m 65-42-62

## 34.L.austriacum L.

ssp. austriacum

- A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel  
15.6.1971 900 m 71-6-38

## 36.L.bienne Miller

- A3 Bolu: Bolu D., Waldrand  
24.6.1970 750 m 70-3-12  
A6 Ordu: 6 km W Ünye, Küste  
6.7.1969 10 m 69-21-21  
A7 Giresun: 25 km S Giresun, breites Bachbett  
7.7.1969 500 m 69-23-36  
C2 Antalya: Ak D., Bergsteppe  
23.6.1965 1500 m 65-26-10

## LINUM (Forts.)

## 30. LINACEAE

37. *L. usitatissimum* L.

- + A4 Çankiri: 46 km S Karabük, breiter Feldrand  
2.7.1969 900 m 69-8-40

38. *L. catharticum* L.

- + B6 Sivas: 40 km E Kangal, feuchte Wiesen  
29.6.1970 1900 m 70-22-57

## 31. GERANIACEAE

2. GERANIUM L.1. *G. glaberrimum* Boiss. & Heldr.

- + C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang  
1.6.1973 1000 m 73-13-32

2. *G. lasiopus* Boiss. & Heldr.

- + C3 Isparta: Dedegöl D., Felsspalten  
15.6.1966 1700 m 66-46-61

3. *G. lucidum* L.

- C2 Antalya: Avlan Gölü, Seeufer  
29.5.1963 1150 m 63-36-7

4. *G. purpureum* Vill.

- C3 Konya: 24 km S Beyşehir, ofener  
Eichenbuschwald  
29.6.1965 1200 m 65-40-5

7. *G. rotundifolium* L.

- A5 Çorum: Boğazkale, Ruderalvegetation  
16.6.1971 1000 m 71-7-102  
C2 Burdur: S-Ufer Saldasee, Buschvegetation  
20.5.1963 1170 m 63-19-10  
C3 Antalya: W Antalya, Konya Alti, Strand  
30.5.1963 3 m 63-40-29

8. *G. molle* L.ssp. *molle*

- + B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Trockenhang  
4.7.1968 1300 m 68-14-7  
C2 Antalya: Yumru D., Bergsteppe  
26.5.1963 1500 m 63-30-15

9. *G. pusillum* Burm. fil.

- A1 Edirne: E Edirne, Campingplatz  
12.6.1971 40 m 71-1-1  
A5 Çorum: Boğazkale, Ruderalvegetation  
16.6.1971 1000 m 71-7-45

12. *G. dissectum* L.

- + C2 Antalya: 32 km SW Elmali, Steppenhügel  
25.5.1963 1150 m 63-28-57

15. *G. tuberosum* L.ssp. *tuberosum*

- C2 Antalya: Yumru D., Kugelpolstersteppe  
26.5.1963 1900 m 63-32-38  
C3 Burdur: 5 km S Burdur, Steppe  
31.5.1963 1000 m 63-43-83

17. *G. libanoticum* Schenk

- C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Felssteppe  
5.6.1973 1800 m 73-22-8

18. *G. macrostylum* Boiss.

- A4 Ankara: 26 km N Kızılcahamam, Steppenhang  
14.6.1971 1550 m 71-3-22

## GERANIUM (Forts.)

## 31.GERANIACEAE

## 24.G.asphodeloides Burm.fil.

ssp. asphodeloides

A3 Bolu: Abantsee, Mischwald

1.7.1969 1400 m 69-4-52

## 28.G.pyrenaicum Burm.fil.

A3 Bilecik: 26 km N Bozüyük,

Quercus-Buschvegetation

22.5.1962 600 m 62-18-6

A5 Çorum: Boğazkale, Ruderalvegetation

16.6.1971 1000 m 71-7-44

A7 Giresun: 7 km N Kümbet, Picea orient.-Wald

7.7.1969 1400 m 69-25-8

B6 Sivas: 8 km N Sivas, feuchte Wiesen

28.6.1970 1350 m 70-19-24

## 29.G.cinereum Cav.

ssp. subcaulescens (L'Hérit.ex DC.) Hayek

var. subcaulescens

+ A6 Sivas: Yıldız D., Schutthalden

15.7.1969 2000 m 69-58-64

var. palmatipartitum Hausskn.ex Knuth

+ A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe

13.7.1969 1800 m 69-52-16

var. ponticum Davis &amp; Roberts

+ C6 Maraş: W Çokak, Gebirgssteppe

2.6.1973 1900 m 73-15-44

3.ERODIUM L'Hérit.

## 4.E.hoefftianum C.A.Meyer

C2 Antalya: Yumru D., Schutthalden

26.5.1963 1500 m 63-33-14

## 9.E.malacoides (L.) L'Hérit.

C2 Denizli: Pamukkale, zwischen den Ruinen

19.5.1963 400 m 63-15-23

## 11.E.absinthoides Willd.

ssp. absinthoides

+ B4 Kirşehir: 33 km N Kirşehir, Bergsteppe

29.5.1964 1500 m 64-20-9

## 19.E.cicutarium (L.) L'Hérit.

ssp. cicutarium

A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache

8.7.1969 950 m 69-32-9

B3 Isparta: Sultan D., Bergsteppe

16.6.1967 1400 m 67-2-23

B5 Nevşehir: N Zelve, sandiger Steppenhügel

29.6.1971 1200 m 71-59-13

B6 Sivas: 12 km N Sivas, trockenes Bachbett

10.9.1977 1400 m 77-108-23

C2 Antalya: 32 km SW Elmalı, Steppenhügel

25.5.1963 1150 m 63-28-56

C2 Burdur: E Saldasee, Steppenhügel

20.5.1963 1200 m 63-20-14

C3 Isparta: W Yenişarbademli, Brache

19.6.1967 1200 m 67-10-11

4.PELARGONIUM L'Hérit.

## 1.P.endlicherianum Fenzl

+ A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde

16.7.1969 1400 m 69-59-16

+ B3 Konya: Sultan D., Schutthalde

19.7.1968 1300 m 68-46-30

## 34. ZYGOPHYLLACEAE

3. TRIBULUS L.1. *T. terrestris* L.

B1 Çanakkale: Troja, Feldrand

16.6.1965 50 m 65-4-2

B4 Niğde: 25 km W Aksaray, Feldrand

2.6.1964 950 m 64-33-26

+ C1 Izmir: Kuşadası, Feldrand

11.6.1964 10 m 64-58-6

+ C4 Konya: 27 km W Ereğli, Steppe

1.6.1962 1000 m 62-64-7

4. NITRARIA L.1. *N. schoberi* L.

+ B4 Ankara: N-Ende Tuz Gölü, Salzsteppe

26.6.1970 900 m 70-8-26

5. PEGANUM L.1. *P. harmala* L.

+ C4 Konya: 27 km W Ereğli, Steppe

1.6.1962 1000 m 62-64-1

## 35. RUTACEAE

2. HAPLOPHYLLUM A. Juss.1. *H. suaveolens* (DC.) G. Donvar. *cilicicum* (Boiss.) C. C. Townsend

+ B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, Felswand

7.7.1977 1400 m 77-27-24

var. *glabrum* C. C. Townsend

C6 Maraş: W Çokak, Gebirgssteppe

2.6.1973 1700 m 73-15-68

2. *H. thesioides* (Fisch. ex DC.) G. Don

A3 Sakarya: 22 km W Taraklı, steile Böschung

29.6.1977 500 m 77-12-10

3. *H. telephioides* Boiss.

+ B4 Kirşehir: 33 km NW Kirşehir, Bergsteppe

29.5.1964 1500 m 64-20-25

7. *H. myrtifolium* Boiss.

B7 Sivas: 14 km N Divriği, Steppenhügel

30.6.1970 1250 m 70-30-4

9. *H. buxbaumii* (Poiret) G. Donssp. *buxbaumii*

C5 Adana: 7 km S Kamışli, Pinus pall.-Wald

8.7.1977 1150 m 77-28-8

C5 Niğde: 3 km S Çaykavak-Paß, Brache

9.7.1977 1400 m 77-30-4

14. *H. tuberculatum* (Forssk.) A. Juss.

+ B6 Sivas: 2 km SE Sincan, Steppenhügel

30.6.1970 1500 m 70-26-48

3. DICTAMNUS L.1. *D. albus* L.

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları,

*Fagus orientalis*-Bestand

5.6.1973 1300 m 73-21-56

## 37. ACERACEAE

1. ACER L.2. *A. trautvetteri* Medw.

A6 Sivas: 36 km N Sivas, Laubmischwald

13.7.1969 1700 m 69-51-1

## ACER (Forts.)

## 37.ACERACEAE

## 5.A.platanoides L.

- + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Laubmischwald  
13.7.1969 1700 m 69-51-2

## 7.A.campestre L.

ssp. campestre

- A3 Zonguldak: 18 km S Devrek, Mischwald  
9.6.1962 600 m 62-86-15

- A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Mischwald  
3.7.1969 1300 m 69-13-1

## 8.A.hyrceanum Fisch. &amp; Mey.

ssp. tauricolum (Boiss. &amp; Bal.) Yalt.

- + C3 Isparta: Dedegöl D., Fels  
3.7.1965 1600 m 65-43-35

## 41.RHAMNACEAE

1.PALIURUS Miller

## 1.P.spina-christi Miller

- A2 Bursa: 22 km N Bursa, mediterr. Vegetation  
3.6.1963 100 m 63-53-24

- A3 Sakarya: 6 km E Tarakli, Gebüschvegetation  
14.6.1973 500 m 73-46-15

- C6 Adana: 20 km NW Kadirli, mediterr. Vegetation  
31.5.1973 250 m 73-10-16

5.RHAMNUS L.

## 6.R.libanoticus Boiss.

- C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Felssteppe  
5.6.1973 1800 m 73-22-17

## 7.R.alaternus L.

- A2 Istanbul: Kadyköy, Garten, kultiviert  
20.7.1969 5 m 69-67-4

- C6 Adana: Kara Tepe, mediterr. Vegetation  
23.6.1971 100 m 71-31-69

## 8.R.catharticus L.

- + B5 Nevşehir: 17 km SE Ürgüp, Gebüschrand  
1.6.1964 1400 m 64-29-4

- + B6 Sivas: 12 km N Sivas, trockenes Bachbett  
30.7.1976 1350 m 76-9-36

## 10.R.petiolearis Boiss.

- + C4 Konya: 16 km N Konya, Stausee, Buschvegetation  
10.6.1966 1200 m 66-38-32

## 12.R.rhodopeus Velenovsky

- A3 Sakarya: 6 km E Tarakli, Buschvegetation  
29.6.1977 500 m 77-13-11

- B3 Kütahya: 10 km S Kütahya, Eichenbuschwald  
1.6.1963 1000 m 63-48-3

## 16.R.nitidus Davis

- C3 Isparta: Dedegöl D., Pinus pall.-Vegetation  
6.6.1964 1400 m 64-42-20

## 17.R.oleoides L.

ssp. graecus (Boiss. &amp; Reut.) Holmboe

- B5 Kayseri: 23 km W Kayseri, Steppe  
30.5.1964 1200 m 64-23-10

## 18.R.thymifolius Bornm.

- A3 Sakarya: 6 km E Tarakli, Buschvegetation  
29.6.1977 500 m 77-13-12

RHAMNUS (Forts.)

41. RHAMNACEAE

20. *R. pyrellus* O. Schwarz

+ B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz

4.7.1970 1250 m 70-37-30

C4 Konya: 43 km N Mut, Sertavul-Paß, Bergsteppe

9.6.1966 1610 m 66-34-15

43. ANACARDIACEAE

1. *COTINUS* Adans.

1. *C. coggyria* Scop.

C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation

23.6.1971 100 m 71-31-5

2. *RHUS* L.

1. *R. coriaria* L.

+ A3 Sakarya: 22 km W Taraklı, Buschvegetation

29.6.1977 500 m 77-12-17

B1 Manisa: 5 km SE Manisa, NE-expon. Steilhang, medit. Buschvegetation

13.6.1964 100 m 64-63-7

+ B6 Sivas: 3 km E Gürün, Wassergraben

8.9.1977 1260 m 77-103-13

C4 Içel: Uzuncaburç, zwischen Ruinen

21.6.1971 900 m 71-23-2

3. *PISTACIA* L.

2. *P. atlantica* Desf.

B1 Balıkesir: 9 km N Ayvalık, Ölbaumkulturen

3.7.1968 100 m 68-7-7

6. *P. terebinthus* L.

ssp. *palaestina* (Boiss.) Engler

B1 Manisa: 5 km SE Manisa, medit. Buschvegetation

13.6.1964 100 m 64-63-23

C5 Içel: 27 km E Silifke, medit. Vegetation

29.5.1973 10 m 73-8-17

ssp. *terebinthus*

A3 Sakarya: 24 km E Iznik, Pinus br.-Wald

29.6.1977 400 m 77-11-9

44. CELASTRACEAE

1. *EUONYMUS* L.

3. *E. latifolius* (L.) Miller

ssp. *latifolius*

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Laubwald

5.6.1973 1300 m 73-21-16

C6 Maraş: W Çokak, Bergsteppe

2.6.1973 1700 m 73-15-14

45. LEGUMINOSAE

8. *SOPHORA* L.

1. *S. alopecuroides* L.

var. *alopecuroides*

B5 Nevşehir: N Zelve, sandiger Steppen Hügel

29.6.1971 1200 m 71-59-24

B6 Malatya: Darende, Ruderalvegetation

25.6.1971 1000 m 71-48-3

11. *CHAMAECYTISUS* Link

3. *C. supinus* (L.) Link

A2 Bursa: Ulu D., offener Pinus-Abies-Wald

20.7.1968 1800 m 68-53-20

13. *GONOCYTISUS* Spach

1. *G. angulatus* (L.) Spach

+ C1 Izmir: Kuşadası, medit. Vegetation

1.7.1967 20 m 67-43-24

16.GENISTA L.

## 45.LEGUMINOSAE

## 1.G.tinctoria L.

A6 Ordu: 6 km W Ünye, Pinus sylv.-Wald  
6.7.1969 10 m 69-21-26

## 2.G.lydia Boiss.

var. antiochia (Boiss.) P.Gibbs

C6 Adana: Kara Tepe, mediterr. Vegetation  
23.6.1971 80 m 71-31-44

## 5.G.albida Willd.

B5 Nevşehir: 8 km NW Ürgüp, Sandsteppe  
12.6.1973 1200 m 73-39-35

## 10.G.aucheri Boiss.

A7 Sivas: 5 km W Suşehri, Brache  
8.7.1969 950 m 69-32-19

## 11.G.sessilifolia DC.

B5 Kırşehir: Çiçekdağı-Paßhöhe, Steinsteppe  
26.6.1970 1300 m 70-13-2

17.SPARTIUM L.

## 1.S.junceum L.

C6 Adana: 10 km SE Kadirli, Arbutus-Bestände  
22.6.1971 100 m 71-30-3

21.LOTONONIS Eckl. & Zeyh.

## 1.L.genistoides (Fenzl) Benth.

+ A3 Ankara: 2 km E Nallıhan, Gebüschvegetation  
14.6.1973 700 m 73-43-9

A3 Sakarya: 24 km E Iznik, Pinus br.-Waldrand  
29.6.1977 400 m 77-11-6

C4 İçel: 13 km E Mut, Aufforstung  
19.6.1971 700 m 71-16-25

25.GALEGA L.

## 1.G.officinalis L.

A2 Kocaeli: 5 km E İzmit, Pappelkultur  
23.6.1970 30 m 70-2-4

A3 Sakarya: 23 km W Hendek, feuchte Senke  
27.7.1976 70 m 76-1-6

26.COLUTEA L.

## 2.C.melanocalyx Boiss. &amp; Heldr.

ssp. davisiana (Browicz) Chamb.

+ B4 Ankara: 15 km W Kirikkale, Steppe  
28.5.1964 1000 m 64-16-25

+ C3 Isparta: Dedegöl D., Pinus pall.-Wald  
17.7.1968 1400 m 68-43-57

+ C4 Konya: 16 km N Konya, Steppe  
10.6.1966 1200 m 66-38-36

32.ASTRAGALUS L.

## 16.A.hamosus L.

+ A4 Bolu: 1 km W Gerede, Straßenrand  
24.6.1970 1300 m 70-4-5

A4 Ankara: 22 km N Ankara, Ruderalvegetation  
15.6.1971 1000 m 71-5-18

## 18.A.suberosus Banks &amp; Sol.

ssp. haerbachii (Sprun.) Matthews

+ B5 Nevşehir: Ürgüp, Campingplatz  
13.7.1977 1200 m 77-41-2

## 20.A.haussknechtii Bunge

+ B6 Sivas: 12 km S Gürün, Steinsteppe  
10.6.1973 1800 m 73-33-46

## ASTRAGALUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

- 22.A.macroscopus Boiss.  
 B5 Nevşehir: 8 km E Ürgüp,Steppe  
 1.6.1964 1200 m 64-32-21  
 + C7 Malatya: 74 km SW Malatya,Felsblockhalde  
 25.6.1971 1510 m 71-45-32  
 C7 Adiyaman: Nemrut D.,Felsblockhalde  
 8.6.1973 2140 m 73-29-40
- 55.A.leucothrix Freyn & Bornm.  
 A5 Çorum: Boğazkale,Steppenhügel  
 16.6.1971 1000 m 71-4-67
- 70.A.depressus L.  
 + C6 Maraş: W Çokak,Agça D.,Bergsteppe  
 2.6.1973 1700 m 73-15-56  
 C6 Adana: E Yarpuz,Nur Dağları,offener Laubwald  
 5.6.1973 1500 m 73-21-70
- 72.A.glycyphyllos L.  
 ssp. glycyphyllos  
 + A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu,Laubmischwald  
 3.7.1969 1300 m 69-13-77  
 A6 Ordu: 6 km W Ünye,Pinus sylv.-Wald  
 6.7.1969 10 m 69-21-24  
 ssp. glycyphylloides (DC.)Matthews  
 + A6 Sivas: 36 km N Sivas,Laubmischwald  
 13.7.1969 1700 m 69-51-16
- 80.A.christianus L.  
 C4 Içel: Uzuncaburç,zwischen Ruinen  
 21.6.1971 900 m 71-23-18
- 97.A.lanigerus Desf.  
 B6 Sivas: 22 km W Divriği,sandiger Steilhang  
 29.6.1970 1400 m 70-24-9
- 99.A.angustiflorus C.Koch  
 ssp. anatolicus (Boiss.)Chamberlain  
 + A3 Bilecik: 26 km N Bozüyük,Eichenbuschwald  
 22.5.1962 600 m 62-18-1  
 + C4 Içel: 13 km E Mut,Pinus brutia-Wald  
 19.6.1971 700 m 71-16-18  
 + C6 Adana: E Yarpuz,Nur Dağları,Laubwald  
 5.6.1973 1400 m 73-21-76
- 106.A.declinatus Willd.  
 + B6 Sivas: 40 km E Kangal,Bergsteppe  
 29.6.1970 1900 m 70-22-59
- 107.A.pinetorum Boiss.  
 B5 Nevşehir: 3 km S Ürgüp,Steppenhang  
 10.7.1977 1100 m 77-33-4
- 125.A.gummifer Lab.  
 B6 Sivas: 56 km S Zara,Steppenhügel  
 9.7.1969 1600 m 69-40-4
- 128.A.noeanus Boiss.  
 + A5 Çorum: Boğazkale,Steppenhügel  
 16.6.1971 1000 m 71-7-59  
 B5 Yozgat: 1 km E Yozgat,steiniger Steppenhügel  
 27.6.1970 1300 m 70-15-10
- 141.A.microcephalus Willd.  
 B5 Yozgat: 93 km W Yıldızeli,stark  
 devastierter Eichenwald  
 27.6.1970 1200 m 70-16-5

## ASTRAGALUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

- 145.A.pycnocephalus Fischer  
     var. pycnocephalus  
     B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, felsige Steilhänge  
         7.7.1977   1400 m   77-27-8  
     + B7 Sivas: Yama Dağlari, Dornpolstersteppe  
         1.8.1976   2200 m   76-15-4
- 149.A.barba-jovis DC.  
     var. barba-jovis  
     + A6 Sivas: Yildiz D., Felsblockhalden  
         29.7.1976   2000 m   76-8-29  
     + B5 Yozgat: 93 km W Yildizeli, stark  
         devastierter Eichenwald  
         27.6.1970   1200 m   70-16-6
- 150.A.plumosus Willd.  
     var. plumosus  
     + A6 Sivas: Yildiz D., Schutthalden  
         15.7.1969   2000 m   69-58-81
- 167.A.micropterus Fischer  
     B5 Kayseri: 4 km E d. Abzweigung v. Incesu  
         nach Develi, Steppenhügel  
         27.8.1977   1150 m   77-71-5
- 169.A.compactus Lam.  
     + A5 Kastamonu: 24 km E Tasköprü,  
         sandiger Steilhang  
         4.7.1969   500 m   69-15-11
- 170.A.lamarckii Boiss.  
     + C7 Malatya: 74 km SW Malatya, Felsblockhalde  
         25.6.1971   1510 m   71-45-31
- 174.A.kurdicus Boiss.  
     var. kurdicus  
     + A7 Giresun: 10 km NW Şebinkarahisar,  
         trockenes Flußbett  
         8.7.1969   1300 m   69-31-11
- 189.A.ptilodes Boiss.  
     var. ptilodes  
     + C4 Konya: 20 km NW Sertavul-Paß, Steppe  
         11.6.1966   1300 m   66-35-26
- 191.A.strictispinis Boiss.  
     + B5 Nevşehir: 4 km S Avanos, Brache  
         29.6.1971   1200 m   71-57-4
- 192.A.condensatus Ledeb.  
     B5 Nevşehir: 8 km SE Ürgüp, Steppe  
         1.6.1964   1200 m   64-32-22
- 193.A.podperae Širj.  
     + B3 Eskişehir: 32 km E Eskişehir, Steppe  
         16.6.1967   900 m   67-1-2
- 195.A.brachypterus Fischer  
     A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,  
         felsiger Steppenhang  
         24.6.1970   1550 m   70-5-57a  
     C3 Isparta: Dedegöl D., offener Pinus pall.-Wald  
         17.7.1968   1400 m   68-43-59
- 196.A.wiedemannianus Fischer  
     A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel  
         15.6.1971   900 m   71-6-40  
     B4 Konya: 30 km N Konya, beweidetes Hügelland  
         11.6.1966   1300 m   66-40-19

## ASTRAGALUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

- 200.A.trojanus Stev.  
+ B2 Izmir: Boz D.,Zwergstrauchzone  
5.7.1968 1400 m 68-16-105
- 205.A.parnassi Boiss.  
ssp. cylleneus (Boiss.& Heldr.)Hayek  
C3 Isparta: Dedegöl D.,Schutthalde  
8.7.1970 1600 m 70-46-53
- 211.A.deifolius DC.  
B5 Kirşehir: 40 km W Çiçekdağı-Paß,Brache  
26.6.1970 1000 m 70-12-11
- 220.A.lagurus Willd.  
B7 Sivas: Yama Dağları,Steinsteppe  
1.8.1976 1700 m 76-13-7
- 235.A.zederbaueri Stadlmann  
+ A3 Bilecik: 14 km N Bilecik,offener  
Pinus brutia-Wald  
22.5.1962 600 m 62-17-3
- 236.A.anthylloides Lam.  
B6 Sivas: 28 km NW Divriği,Steppenhügel  
9.7.1969 1500 m 69-42-109
- 245.A.ponticus Pall.  
A4 Çankiri: 46 km S Karabük,Steppenreste  
2.7.1969 900 m 69-8-42  
+ B5 Nevşehir: N Zelve,sandiger Steppenhügel  
29.6.1971 1200 m 71-59-19
- 258.A.macrocephalus Willd.  
ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain  
B5 Nevşehir: 8 km E Ürgüp,Steppe  
1.6.1964 1200 m 64-32-63  
C4 Içel: 50 km W Mut,Pinus brutia-Wald  
7.6.1966 700 m 66-29-4
- 262.A.lineatus Lam.  
var. jildisianus (Bornm.)Matthews  
B5 Kayseri: Erciyas D.,Schutthalden  
5.8.1976 2400 m 76-28-2  
var. lineatus  
+ C7 Adiyaman: Nemrut D.,Felsschutt  
8.6.1973 2140 m 73-29-39
- 264.A.odoratus Lam.  
C4 Içel: 25 km E Mut,Feldrand  
19.6.1971 1000 m 71-18-21
- 266.A.ornithopodioides Lam.  
A4 Ankara: 22 km N Ankara,Steppenreste  
15.6.1971 900 m 71-5-19  
B4 Konya: 53 km N Konya,breiter Feldrand  
29.5.1973 1000 m 73-3-29
- 270.A.lydius Boiss.  
A3 Bilecik: 26 km N Bozüyük,Gebüschvegetation  
22.5.1962 600 m 62-18-2  
A3 Sakarya: 6 km E Taraklı,Rhamnus-Vegetation  
29.5.1977 500 m 77-13-3  
+ C4 Konya: 65 km N Mut,Steinsteppe  
17.6.1971 1300 m 71-9-5
- 271.A.mesogitanus Boiss.  
C4 Içel: 13 km E Mut,Pinus brutia-Wald  
19.6.1971 700 m 71-16-20

## ASTRAGALUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

272. *A. setulosus* Boiss. & Bal.  
 B5 Nevşehir: 8 km N Ürgüp, Sandsteppe  
 12.6.1973 1000 m 73-39-49
278. *A. cadmicus* Boiss.  
 + A3 Bilecik: 26 km N Bozüyük, Gebüschvegetation  
 22.5.1962 600 m 62-18-4
280. *A. canescens* DC.  
 + B6 Sivas: 20 km W Divriği, Steppenhügel  
 10.7.1969 1400 m 69-44-41
281. *A. ascicocalyx* Bunge  
 + B6 Sivas: 40 km E Kangal, Felssteppe  
 29.6.1970 2000 m 70-22-58
288. *A. aduncus* Willd.  
 C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Flußbett  
 9.6.1973 900 m 73-30-22
289. *A. xylobasis* Freyn & Bornm.  
 var. *angustus* (Freyn & Sint.) Freyn & Bornm.  
 A3 Bolu: 35 km N Nallihan, Felswand  
 14.6.1973 800 m 73-44-9  
 A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
 16.6.1971 1000 m 71-7-61  
 + B5 Nevşehir: N Zelve, sandiger Steppenhügel  
 29.6.1971 1200 m 71-59-18  
 + C7 Malatya: 74 km SW Malatya, Felsblockhalde  
 25.6.1971 1510 m 71-45-30
302. *A. bicolor* Lam.  
 + B5 Nevşehir: N Zelve, sandiger Steppenhügel  
 29.6.1971 1200 m 71-59-17
309. *A. hirsutus* Vahl  
 A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe  
 13.7.1969 1900 m 69-53-16
317. *A. squalidus* Boiss. & Noë  
 + B6 Sivas: 12 km N Sivas, felsiger Steppenhügel  
 27.6.1970 1500 m 70-18-27
326. *A. schizopterus* Boiss.  
 + B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
 9.7.1969 1500 m 69-42-106  
 C6 Maraş: 30 km NW Kadirli, Waldrand  
 31.5.1973 500 m 73-11-12
338. *A. elongatus* Willd.  
 ssp. *elongatus*  
 + A3 Ankara: 35 km N Nallihan, Felswand  
 14.6.1973 800 m 73-44-10
340. *A. campylosema* Boiss.  
 ssp. *campylosema*  
 A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
 16.6.1971 1000 m 71-7-103
354. *A. aucheri* Boiss.  
 + A4 Ankara: 36 km NW Ankara, Grassteppe  
 8.6.1962 900 m 62-80-2
359. *A. angustifolius* Lam.  
 ssp. *angustifolius*  
 var. *angustifolius*  
 A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe  
 13.7.1969 1900 m 69-53-15a  
 B4 Kirşehir: 5 km E Sofular, Bergsteppe  
 29.5.1964 1500 m 64-20-30

## ASTRAGALUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 359.A.angustifolius (Forts.)

ssp. angustifolius, var. angustifolius (Forts.)

B5 Kayseri: Erciyas D., Dornpolstersteppe

4.8.1976 2200 m 76-27-5

C2 Antalya: 31 km SW Elmali, Steppenhügel

25.5.1963 1150 m 63-28-25

C4 Konya: Sertavul-Paß, Bergsteppe

9.6.1966 1610 m 66-34-17

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Mischwald

31.5.1973 900 m 73-12-29

var. violaceus Boiss.

C2 Antalya: Ak D., Bergsteppe

23.6.1965 1400 m 65-26-43

## 361.A.renzii Hub.-Mor.

+ C2 Antalya: Susuz D., offener Junip.exc.-Wald

21.6.1965 1300 m 65-24-32

## 367.A.melanocephalus Boiss.

+ B4 Konya: 30 km N Konya, beweidetes Hügelland

1.6.1966 1300 m 66-40-20

## 34.GLYCYRRHIZA L.

2.G.echinata L.

B1 Manisa: 5 km SE Manisa, Bachrand

13.6.1964 100 m 64-63-29

## 36.PSORALEA L.

1.P.bituminosa L.

+ C4 Içel: 3 km S Uzuncaburç, Pinus brutia-Wald

21.6.1971 800 m 71-24-23

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Mischwald

31.5.1973 900 m 73-12-33

## 39.CICER L.

4.C.anatolicum Alef.

B7 Sivas: Yama Dağları, Steinsteppe

1.8.1976 1700 m 76-13-18

8.C.arietinum L.

C3 Isparta: 18 km W Eğridir, Brache

15.7.1968 1000 m 68-33-17

## 40.VICIA L.

1.V.crocea (Desf.) B.Fedtsch.

A4 Bolu: Dorukhan, Mischwald

8.6.1962 925 m 62-84-8

2.V.freyntiana Bornm.

+ A6 Sivas: 36 km N Sivas, Laubmischwald

13.7.1969 1700 m 69-51-18

3.V.cassubica L.

A2 Bilecik: 72 km W Eskişehir, Waldrand

1.7.1977 800 m 77-14-7

5.V.cracca L.

ssp. cracca

+ B6 Maraş: W Göksun, Brache

31.8.1977 1340 m 77-78-10

ssp. stenophylla Vel.

A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu,

offener Laubmischwald

3.7.1969 1300 m 69-13-89

## VICIA (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

- 5.V.cracca (Forts.)  
 ssp. tenuifolia (Roth)Gaudin  
 + A3 Bolu: 26 km W Gerede,Gebüschrand  
 13.6.1971 1000 m 71-2-47  
 + A5 Sinop: 30 km N Boyabat,offener Mischwald  
 5.7.1969 1300 m 69-18-10
- 9.V.alpestris Stev.  
 ssp. hypoleuca (Boiss.)Davis  
 B6 Sivas: 40 km E Kangal,Felssteppe  
 29.6.1970 2000 m 70-22-64
- 22.V.caesarea Boiss.& Bal.  
 + A4 Ankara: 60 km NW Ankara,Brache  
 24.6.1970 1000 m 70-6-10  
 C3 Konya: 61 km SW Konya,felsiger Steppenhügel  
 6.7.1970 1200 m 70-42-16
- 23.V.ervilia (L.)Willd.  
 + A5 Çorum: Boğazkale,Ruderalvegetation  
 16.6.1971 1000 m 71-7-74  
 C6 Maraş: 30 km NW Kadirli,Waldrand  
 31.5.1973 500 m 73-11-19
- 28.V.hirsuta (L.)S.F.Gray  
 + A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu,Schutthalden  
 3.7.1969 1300 m 69-13-90
- 39.V.noeana Reuter ex Boiss.  
 var. noeana  
 A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,Felssteppe  
 1.7.1971 1550 m 71-63-11  
 + B6 Malatya: 56 km SE Darende,Feldrand  
 25.6.1971 1700 m 71-46-4  
 C6 Maraş: 10 km N Andirin,Feldrand  
 1.6.1973 900 m 73-14-41
- 43.V.peregrina L.  
 A4 Çankiri: 46 km S Karabük,Feldrand  
 2.7.1969 900 m 69-8-51  
 B5 Kirşehir: 40 km SW Çiçekdağı-Paß,Brache  
 26.6.1970 1000 m 70-12-14  
 C3 Isparta: 18 km W Eğridir,Brache  
 15.7.1968 1000 m 68-33-16
- 48.V.anatolica Turrill  
 + A4 Ankara: 60 km NW Ankara,Brache  
 24.6.1970 1000 m 70-6-9
- 49.V.annonica Crantz  
 var. pannonica  
 + A4 Ankara: 75 km NW Ankara,Eichenbuschwald  
 28.5.1973 1240 m 73-1-28
- 55.V.sativa L.  
 ssp. nigra (L.)Ehrh.  
 var. nigra  
 + B6 Sivas: 33 km S Zara,Schutthalden  
 9.7.1969 1700 m 69-38-18
- 57.V.narbonensis L.  
 var. narbonensis  
 + B5 Nevşehir: 14 km SE Ürgüp,Steppenhänge  
 1.6.1964 1300 m 64-30-5

41. LENS Miller

## 45. LEGUMINOSAE

3. *L. ervoides* (Brign.) Grande  
 C6 Adana: Kara Tepe, mediterr. Vegetation  
 23.6.1971 100 m 71-31-52
4. *L. orientalis* (Boiss.) Hand.-Mazz.  
 A5 Çorum: Boğazkale, Ruderalvegetation  
 16.6.1971 1000 m 71-7-75  
 + B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
 9.7.1969 1500 m 69-42-118
5. *L. culinaris* Medik.  
 + A4 Ankara: 22 km NW Ankara, Steppenhügel  
 30.6.1971 900 m 71-62-15

42. LATHYRUS L.

1. *L. aureus* (Stev.) Brandza  
 + C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, offener Laubwald  
 5.6.1973 1600 m 73-21-83
5. *L. niger* (L.) Bernh.  
 A1 Edirne: 25 km SE Kreuzung Keşan,  
 Pinus brutia-Wald  
 23.6.1977 500 m 77-1-23
9. *L. brachypterus* Čel.  
 var. *haussknechtii* (Širj.) Davis  
 + A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,  
 felsiger Steppenhang  
 24.6.1970 1550 m 70-5-64
15. *L. digitatus* (Bieb.) Fiori  
 A4 Ankara: 75 km NW Ankara, Eichenbuschwald  
 28.5.1973 1240 m 73-1-23
16. *L. tukhtensis* Czech.  
 A5 Sinop: 60 km W Sinop, offener Mischwald  
 5.7.1969 1300 m 69-18-7
22. *L. pratensis* L.  
 A4 Ankara: 31 km N Kizilcahamam,  
 Pinus sylv.-Waldrand  
 16.7.1977 1500 m 71-51-11
24. *L. laxiflorus* (Desf.) O. Kuntze  
 ssp. *laxiflorus*  
 A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, lockerer  
 Pinus brutia-Wald  
 14.5.1963 300 m 63-2-1  
 A4 Bolu: Dorukhan-Paßhöhe, Mischwald  
 8.6.1962 925 m 62-84-7  
 + C3 Isparta: Dedegöl D., Pinus pall.-Wald  
 3.7.1965 1500 m 65-43-96  
 C6 Maraş: 10 km N Andirin, Mischwald  
 31.5.1973 1000 m 73-12-32  
 ssp. *angustifolius* (Post ex Dinsm.) Davis  
 + A6 Sivas: Yıldız D., Felsblockhalden  
 29.7.1976 2200 m 76-8-68
25. *L. czechottianus* Bässler  
 A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu,  
 offener Laubmischwald  
 3.7.1969 1300 m 69-13-80  
 A6 Sivas: Yıldız D., offener Eichenbuschwald  
 15.7.1969 1800 m 69-58-83
26. *L. roseus* Stev.  
 A6 Sivas: 36 km N Sivas, Laubmischwald  
 13.7.1969 1700 m 69-51-17

## LATHYRUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 33.L.sphaericus Retz.

A1 Edirne: 50 km N Gelibolu,  
offener Pinus brutia-Wald  
14.5.1963 300 m 63-2-3

## 34.L.inconspicuus L.

C2 Antalya: S Avlan-Gölü, Cedrus lib.-Waldrand  
29.5.1963 1150 m 63-36-24

## 40.L.cassius Boiss.

C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
23.6.1971 80 m 71-31-46

## 43.L.cicera L.

A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-65

B5 Nevşehir: 14 km SE Ürgüp, Gebüsch  
1.6.1964 1300 m 64-30-8

C2 Burdur: Saldasee, S-Ufer, Gebüsch  
20.5.1963 1170 m 63-19-17

## 56.L.nissolia L.

+ C2 Denizli: Honaz D., offener Pinus pall.-Wald  
8.7.1968 1250 m 68-19-28

## 57.L.aphaca L.

var. affinis (Guss.) Arc.

+ C3 Isparta: Dedegöl D., offener Pinus pall.-Wald  
17.7.1968 1400 m 68-43-55

var. biflorus Post

A3 Bilecik: 27 km N Bilecik, Steppenreste  
27.5.1964 300 m 64-7-8

A3 Bolu: Bolu D., Eichenbüsche  
24.6.1970 750 m 70-3-15

C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brachen  
1.6.1973 900 m 73-14-36

var. pseudoaphaca (Boiss.) Davis

+ A1 Edirne: 50 km NW Gelibolu,  
offener Pinus brutia-Wald  
29.5.1966 300 m 66-2-15

## 43.PISUM L.

## 1.P.sativum L.

ssp. elatius (Bieb.) Aschers. & Graebn.

var. elatius

C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang  
1.6.1973 1000 m 73-13-44

## 45.ONONIS L.

## 4.O.natrix L.

ssp. hispanica (L. fil.) Coutinho

+ C1 Izmir: Kuşadası, medit. Vegetation  
1.7.1967 20 m 67-43-25

## 7.O.reclinata L.

+ C2 Denizli: Pamukkale, zwischen Ruinen  
31.5.1966 400 m 66-6-51

## 10.O.viscosa L.

ssp. breviflora (DC.) Nyman

+ A3 Sakarya: 6 km E Taraklı, Gebüschvegetation  
14.6.1973 500 m 73-46-12

ssp. sicala (Guss.) Hub.-Mor.

+ C4 Içel: 13 km E Mut, Pinus brutia-Wald  
19.6.1971 700 m 71-16-28

## ONONIS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 11.0.pusilla L.

- A5 Sinop: 13 km W Boyabat, Brache  
4.7.1969 400 m 69-16-26  
B6 Sivas: 14 km N Sivas, Steppenhügel  
12.7.1969 1350 m 69-49-82  
C3 Isparta: 3 km W Yenişarbademli,  
Abies cilicica-Wald  
19.6.1967 1300 m 67-11-28

## 12.0.arvensis L.

- + C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
23.6.1971 100 m 71-31-48

## 13.0.spinosa L.

- ssp. leiosperma (Boiss.) Širj.  
+ B5 Nevşehir: 3 km S Ürgüp, Bachrand  
27.8.1977 1150 m 77-72-8  
B6 Sivas: Gök Pinar, Seeufer  
7.9.1977 1600 m 77-101-25  
+ C4 Icel: 11 km S Mut, Brache  
8.6.1966 200 m 66-33-12

## 16.0.phyllocephala Boiss.

- C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
26.6.1971 100 m 71-31-49

## 46.TRIFOLIUM L.

## 3.T.repens L.

## var. repens

- A1 Edirne: E Edirne, Campingplatz  
12.6.1971 41 m 71-1-10  
A3 Sakarya: 23 km W Hendek, feuchte Senke  
27.7.1976 70 m 76-1-14  
+ B6 Sivas: Gök Pinar, felsige Schlucht  
26.6.1971 1600 m 71-49-57  
+ C3 Isparta: NE Anamas, Bachrand  
16.7.1968 1500 m 68-37-61

## var. giganteum Lag.-Foss.

- + A3 Bolu: 26 km W Gerede, Sumpfwiesen  
13.6.1971 1000 m 71-2-45

## 5.T.ambiguum Bieb.

- + B6 Sivas: 12 km N Sivas, felsiges Hochplateau  
27.6.1970 1500 m 70-18-32

## 6.T.hybridum L.

## var. hybridum

- A2 Kocaeli: 5 km E Izmit, feuchte Wiesen  
23.6.1970 30 m 70-2-8  
A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, feuchte Wiesen  
24.6.1970 1550 m 70-5-68  
+ A5 Sinop: 70 km SW Sinop, Pinus sylv.-Wald  
5.7.1969 1400 m 69-17-24  
+ C3 Isparta: Dedegöl D., Bachrand  
17.7.1968 1400 m 68-43-58

## var. anatolicum (Boiss.) Boiss.

- A2 Bursa: Ulu D., humusreiche Senken  
20.7.1968 2100 m 68-54-35

## 7.T.nigrescens Viv.

## ssp. petrisavii (Clem.) Holmboe

- B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer  
4.7.1968 1300 m 68-15-37  
C3 Isparta: W-Ufer Beyşehirsee, Weideland  
18.6.1967 1120 m 67-9-7

TRIFOLIUM L.

## 45. LEGUMINOSAE

17. *T. spadiceum* L.  
 A7 Giresun: 3 km SE Kümbet, Bergwiesen  
 7.7.1969 1700 m 69-27-40
22. *T. campestre* Schreb.  
 + A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalde  
 3.7.1969 1300 m 69-13-84  
 B1 Çanakkale: 12 km S Troja, Pinus brutia-Wald  
 6.5.1963 100 m 63-9-9  
 + B2 Izmir: Boz D., Kahlschlag  
 4.7.1968 700 m 68-12-5
25. *T. micranthum* Viv.  
 + B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer  
 4.7.1968 1300 m 68-15-35
29. *T. spumosum* L.  
 C6 Maraş: 10 km N Andirin, felsiger Berghang  
 1.6.1973 900 m 73-13-45
33. *T. argutum* Sol.  
 C6 Adana: 3 km SE Kadirli, Myrthus-Macchie  
 22.6.1971 100 m 71-29-10
34. *T. fragiferum* L.  
 var. *fragiferum*  
 + B2 Bilecik: 60 km W Eskişehir, Feldrand  
 19.7.1968 800 m 68-49-9  
 + B6 Sivas: Gök Pinar, Seeufer  
 7.9.1977 1600 m 77-101-36  
 var. *pulchellum* Lange  
 B1 Izmir: Bergama, Ruderalvegetation  
 3.7.1968 68 m 68-8-4
35. *T. physodes* Stev. ex Bieb.  
 var. *physodes*  
 + A3 Bolu: Bolu D., Eichenbüsche  
 24.6.1970 750 m 70-3-17  
 A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
 16.6.1971 1000 m 71-7-68  
 + C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brachen  
 1.6.1973 900 m 73-14-39  
 var. *psilocalyx* Boiss.  
 + C4 Içel: 6 km S Uzuncaburç, Pinus brutia-Wald  
 21.6.1971 500 m 71-25-37
37. *T. resupinatum* L.  
 var. *resupinatum*  
 C6 Maraş: 30 km NW Kadirli, Waldrand  
 31.5.1973 500 m 73-11-17  
 var. *microcephalum* Zoh.  
 A1 Edirne: E Edirne, Campingplatz  
 12.6.1971 41 m 71-1-11  
 A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Damm, Wiesen  
 27.6.1977 5 m 77-8-49
43. *T. pratense* L.  
 var. *pratense*  
 + B5 Kayseri: Erciyas D., Wassergraben  
 28.8.1977 2150 m 77-75-39  
 var. *americanum* Harz  
 + B2 Izmir: Boz D., Bachrand  
 4.7.1968 1200 m 68-13-26

## TRIFOLIUM (Forts.)

## 45. LEGUMINOSAE

46. *T. medium* L.var. *medium*

A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Laubmischwald

3.7.1969 1300 m 69-13-88

var. *ericalycinum* Hausskn.

A2 Bursa: 25 km E Söğütalan, Laubwald

26.6.1977 500 m 77-6-35

49. *T. ochroleucum* Huds.

A2 Bursa: 30 km E Söğütalan, Macchie

26.6.1977 250 m 77-5-40

C3 Isparta: Dedegöl D., Übergang der  
Pinus-Region in Geröllhalden

3.7.1965 1600 m 65-43-69

54. *T. caudatum* Boiss.

B2 Izmir: Boz D., Waldrand

5.7.1968 1200 m 68-16a-104

55. *T. pannonicum* Jacq.ssp. *elongatum* (Willd.) Zoh.

+ A6 Sivas: Yildiz D., Schutthalden

15.7.1969 1800 m 69-58-84a

+ C6 Adana: 10 km E Osmaniye, Felssteppe

24.6.1971 600 m 71-34-58

57. *T. stellatum* L.var. *stellatum*

C1 Izmir: N Kuşadasi, mediterr. Vegetation

17.6.1965 40 m 65-9-37

62. *T. tenuifolium* Ten.

A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Pinus br.-Wald

29.5.1966 300 m 66-2-11

64. *T. scabrum* L.

+ A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalde

3.7.1969 1300 m 69-13-87

C4 İçel: 9 km E Mut, Pinus br.-Wald

19.6.1971 460 m 71-15-9

65. *T. lucanicum* Gasp.

+ A5 Çorum: Boğazkale, Felssteppe

16.6.1971 1000 m 71-7-67

C2 Burdur: Saldasee, Pinus br.-Wald

20.5.1963 1170 m 63-19-23a

C3 Isparta: W-Ufer Beyşehirsee, Weideland

18.6.1967 1120 m 67-9-9

+ C4 İçel: 3 km S Uzuncaburç, Pinus br.-Wald

21.6.1971 800 m 71-24-24

68. *T. hirtum* All.

A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalden

3.7.1969 1300 m 69-13-86

C4 İçel: 13 km E Mut, Pinus br.-Wald

19.6.1971 700 m 71-16-30

69. *T. lappaceum* L.

A1 Çanakkale: 21 km N Eceabat, Cistus-Macchie

29.5.1966 30 m 66-3-21a

A1 Edirne: 20 km E Edirne, Brache

5.6.1963 500 m 63-58-4a

70. *T. cherleri* L.

A1 Çanakkale: 9 km N Bolayir,

Quercus cocc.-Garigues

15.5.1963 20 m 63-3-14

## TRIFOLIUM (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 70.T.cherleri (Forts.)

C1 Izmir: N Kuşadası, medit. Vegetation

17.6.1965 40 m 65-9-94

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, offener Laubwald

5.6.1973 1000 m 73-21-87

## 71.T.arvense L.

var. arvense

A1 Edirne: 20 km E Edirne, Brache

5.6.1963 500 m 63-58-20

A4 Kastamonu: 30 km S Kastamonu, Schutthalde

3.7.1969 1300 m 69-13-85

A6 Sivas: 11 km W Çirçir, Felsblockhalde

16.7.1969 1400 m 69-59-21

B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer

4.7.1968 1300 m 68-15-36

+ B7 Sivas: Yama Dağları, Feldrand

1.8.1976 1700 m 76-13-60

C2 Aydın: 100 km W Denizli, Ficus-Plantage

18.5.1963 70 m 63-14-7

C3 Isparta: W-Ufer Beyşehirsee, Weideland

18.6.1967 1120 m 67-9-5

## 73.T.angustifolium L.

var. angustifolium

A3 Sakarya: 6 km E Taraklı, Rhamnus-Vegetation

29.6.1977 500 m 77-13-15

## 74.T.purpureum Lois.

var. purpureum

A1 Çanakkale: 25 km N Gelibolu, medit. Vegetation

1.7.1968 10 m 68-2-59

## 78.T.apertum Bobrov

var. apertum

+ A1 Edirne: E Edirne, Campingplatz

12.6.1971 41 m 71-1-7

A2 Kocaeli: 5 km E Izmit, Pappelkultur

23.6.1970 30 m 70-2-9

## 84.T.constantinopolitanum Ser.

C5 Adana: 6 km N Karataş, Feldrand

5.7.1977 20 m 77-23-15

## 85.T.leucanthum Bieb.

C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, Laubwald

5.6.1973 1200 m 73-21-85

## 87.T.echinatum Bieb.

B1 Manisa: 15 km NE Akhisar,

offener Pinus brutia-Wald

13.6.1964 100 m 64-65-25

C4 Içel: Uzuncaburç, zwischen Ruinen

21.6.1971 900 m 71-23-19

## 90.T.pauciflorum d'Urv.

A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Pinus br.-Wald

19.5.1966 300 m 66-2-10

## 47.MELILOTUS L.

1.M.indica (L.) All.

+ A4 Ankara: 22 km N Ankara, Ruderalvegetation

15.6.1971 900 m 71-5-22

C2 Muğla: 28 km W Fethiye, Bachrand

27.6.1967 100 m 67-37-6

## MELILOTUS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 7.M.officinalis (L.)Desr.

- A3 Ankara: 2 km E Nallihan, Gebüschvegetation  
14.6.1973 700 m 73-43-10
- A6 Sivas: Sariyar, Feldrand  
15.7.1969 1500 m 69-57-22
- + B4 Ankara: Hirfanli-Stausee, Straßenrand  
26.6.1970 900 m 70-11-3
- B5 Nevşehir: 3 km S Ürgüp, Bachrand  
10.7.1977 1150 m 77-33-11
- B6 Sivas: 14 km N Sivas, Schutthalden  
12.7.1969 1300 m 69-49-80
- C3 Isparta: 1 km NE Isparta, Brache  
15.7.1968 1050 m 68-32-9

## 8.M.alba Desr.

- A1 Edirne: 25 km SE Kreuzung Keşan,  
Pinus brutia-Waldrand  
23.6.1977 500 m 77-1-26
- + A3 Sakarya: 18 km E Adapazari, Straßenrand  
19.7.1969 30 m 69-66-9
- + B1 Balıkesir: 9 km N Ayvalık, Ölbaumkulturen  
3.7.1968 50 m 68-7-6
- + B5 Nevşehir: 3 km S Ürgüp, Bachrand  
10.7.1977 1150 m 77-33-10
- C6 Malatya: 20 km NE Gölbaşı, trockenes Flußbett  
9.6.1973 900 m 73-30-23

## 48.TRIGONELLA L.

## 12.T.spruneriana Boiss.

var. spruneriana

- C3 Isparta: Çiçek D., Ruderalvegetation  
16.6.1967 1300 m 67-3-2

## 18.T.velutina Boiss.

- + A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
13.7.1969 1500 m 69-50-9
- B5 Nevşehir: 8 km E Ürgüp, Steppe  
1.6.1964 1200 m 64-32-42
- C3 Burdur: 5 km S Burdur, Bedlands  
31.5.1963 1000 m 63-43-21
- C3 Isparta: NW Beyşehirsee, Steppenhügel  
16.6.1967 1200 m 67-4-4

## 21.T.aurantiaca Boiss.

- A4 Ankara: 60 km NW Ankara, Brache  
24.6.1970 1000 m 70-6-8
- B5 Nevşehir: Göreme, Sandstein  
17.7.1969 1200 m 69-63-22

## 23.T.fischeriana Ser.

- + A6 Sivas: 48 km N Sivas, Brache  
13.7.1969 1500 m 69-50-8
- B5 Nevşehir: 4 km SE Avanos, Brache  
29.6.1971 1200 m 71-57-5
- C2 Antalya: Ak D., Yesilgöl, Schutthalde  
11.7.1968 1800 m 68-26-63

## 28.T.crassipes Boiss.

- + A4 Ankara: 75 km NW Ankara, Eichenbuschwald  
28.5.1973 1240 m 73-1-26
- + A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-70

## TRIGONELLA (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 30.T.rigida Boiss.&amp; Bal.

C6 Malatya: 100 km SW Malatya, trockenes Flußbett  
9.6.1973 900 m 73-30-24

## 34.T.monantha C.A.Meyer

ssp. monantha

B4 Nigde: 32 km W Aksaray, Feldrand  
6.7.1970 1000 m 70-40-12

B5 Kayseri: 50 km SW Kayseri, Salzsteppe  
1.6.1964 1000 m 64-28-6

C3 Isparta: NW Beyşehirsee, Steppenhügel  
16.6.1967 1200 m 67-4-2

ssp. noeana (Boiss.) Hub.-Mor.

B6 Malatya: 35 km SE Malatya, Feldrand  
25.6.1971 1400 m 71-47-21

## 36.T.monspeliaca L.

A4 Ankara: 22 km N Ankara, Steppenreste  
15.6.1971 900 m 71-5-26

+ A4 Çankiri: 46 km S Karabük, Feldrand  
2.7.1969 900 m 69-8-50

C3 Isparta: NW Beyşehirsee, Steppenhügel  
16.6.1967 1200 m 67-4-6

## 39.T.spicata Sibth.&amp; Sm.

A4 Çankiri: 46 km S Karabük, Steppenreste  
2.7.1969 900 m 69-8-49

## 41.T.procumbens (Besser) Reichb.

+ A1 Edirne: E Edirne, Campingplatz  
12.6.1971 41 m 71-1-2

## 46.T.foenum-graecum L.

C6 Maraş: 21 km W Fevzipaşa, Feldrand  
24.6.1971 500 m 71-35-3

50.MEDICAGO L.

## 1.M.radiata L.

B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
9.7.1969 1500 m 69-42-121

C2 Antalya: Elmali D., Steppenhänge  
23.6.1967 1200 m 67-21-66

C3 Isparta: NW Beyşehirsee, Steppenhügel  
16.6.1967 1200 m 67-4-3

C4 Içel: 18 km E Mut, Pinus br.-Wald  
19.6.1971 1100 m 71-17-25

+ C4 Konya: 20 km NW Sertavul-Paß, Steinsteppe  
17.6.1971 1300 m 71-9-6

C5 Adana: 7 km S Kamışli, Pinus pall.-Wald  
8.7.1977 1150 m 77-28-10

## 2.M.orbicularis (L.) Bart.

A5 Çorum: Boğazkale, Ruderalvegetation  
16.6.1971 1000 m 71-7-66

C6 Maraş: 30 km NW Kadirli, Waldrand  
31.5.1973 500 m 73-11-15

## 3.M.lupulina L.

A1 Edirne: 25 km SE Kreuzung Keşan,  
Pinus brutia-Wald

23.6.1977 500 m 77-1-25

+ A4 Bolu: 1 km W Gerede, Straßenrand-Böschung  
2.7.1969 1300 m 69-7-8

+ C3 Isparta: NE Anamas, Bachrand  
16.7.1968 1500 m 68-37-57

## MEDICAGO (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

- 4.*M.sativa* L.  
     ssp. *sativa*  
     + C2 Antalya: Ak D., Bachrand  
         23.6.1965      1300 m      65-26-45
- 5.*M. x varia* Martyn  
     B5 Kayseri: Erciyas D., Felsblockhalde  
         11.7.1977      1700 m      77-35-7  
     B6 Adana: 7 km N Saimbeyli, felsige Steilhänge  
         7.7.1977      1400 m      77-27-32  
     + C4 Konya: 2 km E Ermenek, Friedhofsgelände  
         7.6.1966      1250 m      66-32-3
- 6.*M.falcata* L.  
     + B7 Sivas: Yama Dağları, Feldrand  
         1.8.1976      1700 m      76-13-40  
     + C4 İçel: 18 km E Mut, Brache  
         19.6.1971      1100 m      71-17-27
- 11.*M.noeana* Boiss.  
     + C3 Isparta: W Yenişarbademli,  
         offene Buschvegetation (Juniperus)  
         19.6.1967      1200 m      67-10-6
- 16.*M.minima* (L.) Bart.  
     var. *minima*  
     A4 Çankiri: 46 km S Karabük, Steppenreste  
         2.7.1969      900 m      69-8-45  
     C6 Maraş: 30 km NW Kadirli, Waldrand  
         31.5.1973      500 m      73-11-16
- 18.*M.polymorpha* L.  
     var. *vulgaris* (Benth.) Shinnars  
     A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Pinus br.-Wald  
         29.5.1966      300 m      66-2-14
- 24.*M.rigidula* (L.) All.  
     var. *rigidula*  
     C3 Isparta: Beyşehirsee, SW-Ufer, Weideland  
         30.6.1965      1150 m      65-41-19  
     C3 Konya: 61 km SW Konya, felsiger Steppenhügel  
         6.7.1970      1200 m      70-42-14  
     C6 Maraş: 10 km N Andirin, Brache  
         1.6.1973      900 m      73-14-37  
     var. *cinerascens* (Jord.) Rouy  
     + B1 Manisa: 15 km NE Akhisar, Pinus br.-Wald  
         13.6.1964      100 m      64-65-16  
     + C2 Antalya: 31 km SW Elmalı, Steppenhügel  
         25.5.1963      1150 m      63-28-39  
     + C3 Antalya: W Antalya, Konya Alti, Strand  
         30.5.1963      5 m      63-40-17  
     C3 Isparta: NW-Ufer Beyşehirsee, Weideland  
         30.6.1965      1150 m      65-41-20  
     + C4 Konya: 21 km N Karaman, Feldrand  
         9.6.1966      1000 m      66-36-29  
     C4 İçel: 18 km E Mut, Pinus brutia-Wald  
         19.6.1971      1100 m      71-17-26  
     var. *submitis* (Boiss.) Heyn  
     + B6 Malatya: 35 km SE Darende, Feldrand  
         25.6.1971      1400 m      71-47-19  
     + C3 Isparta: Beyşehirsee, W-Ufer, Weideland  
         18.6.1967      1120 m      67-9-11

52.DORYCNIUM Miller

## 45.LEGUMINOSAE

3.D.graecum (L.) Ser.

A2 Bilecik: 72 km W Eskişehir,  
Fagus orient.-Wald

1.7.1977 800 m 77-14-2

A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,  
felsiger Steppenhang

24.6.1970 1550 m 70-5-62

+ B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
9.7.1969 1500 m 69-42-112

C6 Adana: Kara Tepe, medit. Vegetation  
23.6.1971 80 m 71-31-43

4.D.pentaphyllum Scop.

ssp. herbaceum (Vill.) Rouy

A5 Sinop: 70 km W Sinop, Pinus sylv.-Wald  
5.7.1969 1400 m 69-17-21

ssp. anatolicum (Boiss.) Gams

A6 Ordu: 6 km W Ünye, Pinus sylv.-Wald  
6.7.1969 10 m 69-21-25

+ C6 Adana: E Yarpuz, Nur Dağları, offener Laubwald  
5.6.1973 1200 m 73-21-79

ssp. haussknechtii (Boiss.) Gams

C3 Isparta: NW Beyşehirsee, Steppenhügel  
16.6.1967 1200 m 67-4-10

53.LOTUS L.3.L.cytisoides L.

+ C1 Izmir: Kuşadasi, Felsen

17.6.1965 10 m 65-11-3

C5 İçel: 27 km E Silifke, medit. Vegetation  
18.6.1971 10 m 71-13-22

8.L.angustissimus L.

A2 Kocaeli: 5 km E Izmit, Pappelkultur  
23.6.1970 30 m 70-2-6

12.L.corniculatus L.

var. corniculatus

A5 Sinop: 70 km SW Sinop, Pinus sylv.-Wald  
5.7.1969 1400 m 69-17-22

+ A7 Giresun: 3 km SE Kümbet, Bergwiesen  
7.7.1969 1700 m 69-27-36

+ B6 Sivas: 8 km N Sivas, feuchte Wiesen  
28.6.1970 1350 m 70-19-34

var. tenuifolius L.

A2 Bursa: 4 km S Uluabat, Damm  
27.6.1977 10 m 77-8-24

A3 Bolu: 26 km W Gerede, Sumpfwiesen  
13.6.1971 1000 m 71-2-41

C3 Isparta: Çiçek D., Ruderalvegetation  
16.6.1967 1300 m 67-3-3

var. alpinus Ser.

A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam, Steppenhang  
17.7.1977 1550 m 77-52-23

C3 Isparta: Dedegöl D., Pinus pall.-Wald  
17.7.1968 1400 m 68-43-61

15.L.gebelia Vent.

var. gebelia

B7 Sivas: 8 km NE Divriği, Brache

1.7.1970 1300 m 70-31-20

C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhang  
25.6.1971 1180 m 71-43-20

LOTUS (Forts.)

45.LEGUMINOSAE

15.L.gebelia (Forts.)

var. hirsutissimus (Ledeb.)Dinsm.

C6 Malatya: 29 km N Gölbaşı, steiler Steppenhang  
25.6.1971 1180 m 71-43-19

16.L.aegaeus (Gris.)Boiss.

A4 Ankara: 26 km N Kizilcahamam,  
felsiger Steppenhang

24.6.1970 1550 m 70-5-65

C3 Konya: 61 km SW Konya, felsiger Steppenhang  
6.7.1970 1200 m 70-42-13

C4 İçel: 18 km E Mut, Pinus brutia-Wald  
19.6.1971 1100 m 71-17-24

C5 Adana: Tekir Tepesi, offener Pinus pall.-Wald  
3.6.1962 1300 m 62-73-3

54.TETRAGONOLOBUS Scop.

1.T.maritimus (L.)Roth

B6 Sivas: 2 km SE Sinçan, Bachrand  
30.6.1970 1450 m 70-27-5

55.HYMENOCARPUS Savi

1.H.circinnatus (L.)Savi

A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Pinus br.-Wald  
14.5.1963 300 m 63-2-17

C2 Antalya: 27 km S Gömbe, Macchie  
26.6.1967 850 m 67-30-4

56.ANTHYLLIS L.

2.A.vulneraria L.

ssp. hispidissima (Sag.)Cullen

+ C4 Konya: Sertavul-Paß, Bergsteppe  
9.6.1966 1610 m 66-34-19

ssp. praepropera (Kerner)Bornm.

+ C4 İçel: 3 km S Uzuncaburç, Pinus br.-Wald  
21.6.1971 800 m 71-24-17

57.SECURIGERA DC.

1.S.securidaca (L.)Degen & Dörf.

A1 Çanakkale: 21 km S Gelibolu, Pinus br.-Wald  
14.6.1964 20 m 64-76-3

A1 Edirne: 3 km E Edirne, Feldrand  
14.5.1963 50 m 63-1-3

58.CORONILLA L.

2.C.scorpioides (L.)Koch

+ A3 Bolu: 26 km W Gerede, Felder  
13.6.1971 1000 m 71-2-40

A4 Çankiri: 46 km S Karabük, Feldrand  
2.7.1969 900 m 69-8-43

B2 Manisa: 15 km NE Akhisar, Pinus br.-Wald  
13.6.1964 100 m 64-65-23

C3 Burdur: 40 km S Burdur, Quercus cocc.-Garigues  
31.5.1963 900 m 63-42-7

4.C.orientalis Miller

var. orientalis

A5 Çorum: Boğazkale, Steppenhügel  
16.6.1971 1000 m 71-7-63

B7 Sivas: Yama Dağları, Schutthalden  
1.8.1976 2000 m 76-14-9

## CORONILLA (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 8.C.varia L.

## ssp. varia

A3 Sakarya: 6 km E Taraklı, Rhamnus-Vegetation

29.6.1977 500 m 77-13-5

A4 Çankiri: 46 km S Karabük, Feldrand

2.7.1969 900 m 69-8-44

+ B6 Sivas: 8 km N Sivas, Brache

28.6.1970 1350 m 70-19-33

C3 Isparta: Çiçek D., Feldrand

16.6.1967 1300 m 67-3-31

## ssp. libanotica Bornm.

+ C4 İçel: S Uzuncaburç, Pinus brutia-Wald

3.7.1977 800 m 77-17-9

## 59.ORNITHOPUS L.

## 1.O.compressus L.

+ B2 Izmir: Boz D., Gölcük, Seeufer

4.7.1968 1300 m 68-15-33

## 60.HIPPOCREPIS L.

## 2.H.ciliata Willd.

C1 Izmir: N Kuşadası, medit.Vegetation

11.6.1964 80 m 64-59-24

## 62.SCORPIURUS L.

## 1.S.muricatus L.

## var. subvillosus (L.) Fiori

B1 Çanakkale: 12 km S Troja, Pinus br.-Wald

16.5.1963 100 m 63-9-6

C1 Izmir: N Kuşadası, medit.Vegetation

17.6.1965 40 m 65-9-85

C2 Denizli: Pamukkale, zwischen Ruinen

31.5.1966 400 m 66-6-55

## 63.HEDYSARUM L.

## 6.H.laxum Boiss.

+ B6 Sivas: 30 km SW Kangal, sandiger Steppenhügel

1.7.1970 1500 m 70-32-29

## 8.H.pestalozzae Boiss.

+ C5 Adana: E Çiftahan, Steppenhänge

5.6.1962 1200 m 62-74a-9

## 9.H.nitidum Willd.

B7 Sivas: 8 km NE Divriği, Brache

1.7.1970 1300 m 70-31-19

## 16.H.pogonocarpum Boiss.

+ C7 Malatya: 47 km NE Gölbaşı, Felsblockhalde

25.6.1971 1510 m 71-45-33

## 21.H.pycnostachyum Hedge &amp; Hub.-Mor.

+ B6 Sivas: 12 km S Gürün, Steinsteppe

10.6.1973 1800 m 73-33-49

## 64.ONOBRYCHIS Adans.

## 1.O.cornuta (L.) Desv.

+ A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe

13.7.1969 1900 m 69-53-19

B6 Sivas: 14 km N Sivas, Steppenhügel

12.7.1969 1500 m 69-49-81

C4 Konya: Sertavul-Paß, Bergsteppe

9.6.1966 1610 m 66-34-18

+ C7 Adiyaman: Nemrut D., Gebirgssteppe

8.6.1973 2140 m 73-29-41

## ONOBRYCHIS (Forts.)

## 45.LEGUMINOSAE

## 2.0.caput-galli (L.)Lam.

A1 Edirne: 50 km N Gelibolu, Pinus brutia-Wald  
29.5.1966 300 m 66-2-9

+ A3 Sakarya: 6 km E Tarakli, Gebüschvegetation  
14.6.1973 500 m 73-46-11

B1 Manisa: 15 km NE Akhisar, Pinus brutia-Wald  
13.6.1964 100 m 64-65-17

C1 Izmir: Kuşadası, medit.Vegetation  
17.6.1965 40 m 65-9-27

## 4.0.crista-galli (L.)Lam.

+ C4 İçel: 9 km E Mut, Pinus brutia-Wald  
19.6.1971 460 m 71-15-8

## 11.0.gracilis Besser

+ A4 Ankara: 60 km NW Ankara, Brache  
24.6.1970 1000 m 70-6-7

+ A5 Kastamonu: 24 km E Taşköprü,  
sandiger Steppenhäng  
4.7.1969 500 m 69-15-12

+ B4 Ankara: Tuz Gölü, N-Ende, Feldrand  
26.6.1970 910 m 70-8-18

## 14.0.elata Boiss.&amp; Bal.

B5 Nevşehir: 11 km S Ürgüp, Steppenhügel  
10.7.1977 1300 m 77-34-16

## 19.0.montana DC.

ssp. cadmea (Boiss.)P.W.Ball

+ A3 Bilecik: 26 km N Bozüyük, Eichenbüsche  
22.5.1962 600 m 62-18-5

A5 Sinop: 30 km Boyabat, sandige Böschung  
5.7.1969 1300 m 69-18-9

+ A6 Sivas: Yildiz D., Felssteppe  
15.7.1969 2000 m 69-58-84

## 22.0.armena Boiss.&amp; Huët

A3 Sakarya: 24 km E Iznik, Pinus brutia-Wald  
29.6.1977 400 m 77-11-7

## 24.0.viciifolia Scop.

+ B6 Sivas: 12 km N Sivas, trockenes Bachbett  
30.6.1976 1350 m 76-9-32

## 25.0.oxyodonta Boiss.

A4 Bolu: 41 km NW Kizilcahamam, Brache  
27.7.1976 1250 m 76-3-7

## 31.0.paucijuga Bornm.

+ B5 Nevşehir: 8 km NW Ürgüp, Sandsteppe  
12.6.1973 1200 m 73-39-38

## 33.0.argyrea Boiss.

ssp. argyrea

C5 Adana: E Çiftahan, Steppenhäng  
5.6.1962 1200 m 62-74a-2

ssp. isaurica Hedge & Hub.-Mor.

+ C5 Nigde: 22 km E Ulukışla, Steppe  
1.6.1962 1200 m 62-66-1

## 34.0.ornata (Willd.)Desv.

A4 Ankara: 20 km NW Ankara, Steppenhügel  
27.7.1976 900 m 76-4-22

ONOBRYCHIS (Forts.)

45.LEGUMINOSAE

- 41.O.hypargyrea Boiss.  
 A3 Ankara: 2 km E Nallihan, Gebüschvegetation  
 14.6.1973 700 m 73-43-11  
 + A3 Bilecik: 10 km N Bilecik, Eichenbuschwald  
 27.5.1964 600 m 64-8-10
- 42.O.tournefortii (Willd.) Desv.  
 + B3 Afyon: 26 km S Emirdağ, Linum hirsutum-Brache  
 20.6.1966 1000 m 66-54-18  
 B5 Nevşehir: 8 km E Ürgüp, Steppenhügel  
 1.6.1964 1200 m 64-32-74  
 + C2 Denizli: 25 km W Acigöl, trockenes Bachbett  
 7.6.1964 750 m 64-49-1  
 C5 Adana: 18 km N Kamışli, steiler Steppenhang  
 8.7.1977 1400 m 77-29-13
- 44.O.radiata (Desf.) Bieb  
 + B6 Sivas: 22 km W Divriği, sandiger Steilhang  
 29.6.1970 1400 m 70-24-11  
 + B7 Sivas: 8 km NE Divriği, Brache  
 1.7.1970 1300 m 70-31-21
- 45.O.cappadocica Boiss.  
 + B6 Sivas: 28 km NW Divriği, Steppenhügel  
 9.7.1969 1500 m 69-42-117
- 66.EBENUS L.  
 13.E.laguroides Boiss.  
 var. laguroides  
 + A6 Sivas: 36 km N Sivas, Felssteppe  
 13.7.1969 1900 m 69-53-18
- 67.ALHAGI Adans.  
 1.A.pseudalhagi (Bieb.) Desv.  
 B4 Niğde: 32 km W Aksaray, sandiger Feldrand  
 6.7.1970 1000 m 70-40-13

## REGISTER

- Acanthophyllum C.A.Meyer 28  
verticillatum (Willd.)Hand.-  
Mazz. 28
- Acer L. 48  
campestre L. 49  
ssp. campestre 49  
hyrcanum Fisch.& Mey. 49  
ssp. tauricolum (Boiss.&  
Bal.)Yalt. 49  
platanoides L. 49  
trautvetteri Medw. 48
- Aceraceae 48
- Adiantaceae 1
- Adiantum L. 1  
capillus-veneris L. 1
- Adonis L. 4  
ericalycina Boiss. 4
- Aethionema R.Br. 9  
arabicum (L.)Andrz.ex  
O.E.Schulz 9  
armenum Boiss. 10  
caespitosum (Boiss.)Boiss. 9  
capitatum Boiss.& Bal. 10  
eunomioides (Boiss.)Bornm. 9  
grandiflorum Boiss.&  
Hohen. 10  
iberideum (Boiss.)Boiss. 9  
schistosum Boiss.& Kotschy 9
- Agrostemma L. 32  
githago L. 32
- Alcea L. 43  
apterocarpa (Fenzl)Boiss. 43  
digitata (Boiss.)Alef. 43  
hohenackeri (Boiss.& Huet)  
Boiss. 44  
pallida Waldst.& Kit. 44  
setosa (Boiss.)Alef. 43  
striata (DC.)Alef. 43  
ssp. striata 43
- Alhagi Adans. 71  
pseudalhagi (Bieb.)Desv. 71
- Althaea L. 44  
cannabina L. 44  
officinalis L. 44
- Alyssum L. 11  
blepharocarpum Dudley &  
Hub.-Mor. 11  
borzaeanum Nyár. 12  
cassium Boiss. 13  
condensatum Boiss. &  
Hausskn. 13  
ssp. condensatum 13  
ssp. flexibile (Nyár.)  
Dudley 13  
constellatum Boiss. 12  
contemptum Schott &  
Kotschy 11
- Alyssum (Forts.)  
dasycarpum Steph. ex  
Willd. 11  
desertorum Stapf 11  
var. desertorum 11  
var. prostratum Dudley 11  
filiforme Nyár. 13  
harputicum Dudley 12  
hirsutum Bieb. 12  
lepidoto-stellatum (Hausskn.  
& Bornm.)Dudley 12  
meniocoides Boiss. 11  
minus (L.)Rothm. 11  
var. micranthum (Meyer)  
Dudley 11  
var. minus 11  
minutum Schlecht.ex DC. 11  
murale Waldst.& Kit. 13  
ssp. murale 13  
var. haradjianii (Rech.)  
Dudley 13  
pateri Nyár. 12  
ssp. pateri 12  
ssp. prostratum (Nyár.)  
Dudley 12  
praecox Boiss.& Bal. 12  
var. praecox 12  
pterocarpum Dudley 13  
sibiricum Willd. 12  
strictum Willd. 11  
strigosum Banks & Sol. 12  
ssp. strigosum 12  
szovitsianum Fisch.& Mey. 11  
thymops (Hub.-Mor.& Reese)  
Dudley 12
- Amaranthaceae 39
- Amaranthus L. 39  
albus L. 39  
lividus L. 39  
retroflexus L. 39
- Anacardiaceae 50
- Anchonium DC. 15  
elichrysifolium (DC.)  
Boiss. 15  
ssp. canescens (Hausskn.  
ex Bornm.)Cullen & Coode  
15
- Anemone L. 4  
blanda Schott & Kotschy 4
- Angiospermae 3
- Anogramma Link 1  
leptophylla (L.)Link 1
- Anthyllis L. 68  
vulneraria L. 68  
ssp. hispidissima (Sag.)  
Cullen 68  
ssp. praepropera (Kerner)  
Bornm. 68

## BERICHTIGUNG ZU STAPFIA NR. 03/78

SORGER: BEITRÄGE ZUR FLORA DER TÜRKEI II.

Im Register (Seite 76-87) sind bei allen Pflanzennamen falsche Seitenzahlen angegeben. Die richtige Seitenzahl erhält man durch Addition von 4 (z.B. Acer L. 48 ist nicht auf Seite 48 zu finden, sondern auf Seite 52 = 48 + 4).

- Arabidopsis* Heynh. 16  
   *thaliana* (L.) Heynh. 16  
*Arabis* L. 13  
   *caucasica* Willd. 13  
     ssp. *caucasica* 13  
   *nova* Vill. 14  
   *sagittata* (Bertol.) DC. 13  
   *turrita* L. 13  
*Arenaria* L. 18  
   *acerosa* Boiss. 19  
   *acutisepala* Hausskn. ex  
     Williams 19  
   *antitaurica* McNeill 18  
   *armeniaca* Boiss. 19  
   *cucubaloides* Smith 19  
   *drypidea* Boiss. 19  
   *gypsophiloides* L. 19  
     var. *gypsophiloides* 19  
   *ledebouriana* Fenzl 19  
     var. *armeniaca* McNeill 19  
     var. *ledebouriana* 19  
     var. *parviflora* Boiss. 19  
   *leptoclados* (Reichb.) Guss. 19  
   *macrosepala* Boiss. 19  
   *saponarioides* Boiss. & Bal. 19  
   *serpyllifolia* L. 18  
   *tmolea* Boiss. 18  
*Aspidiaceae* 2  
*Aspleniaceae* 1  
*Asplenium* L. 1  
   *haussknechtii* God. & Reut. 1  
   *ruta-muraria* L. 1  
   *trichomanes* L. 1  
*Astragalus* L. 51  
   *aduncus* Willd. 55  
   *angustiflorus* C. Koch 52  
     ssp. *anatolicus* (Boiss.)  
       Chamberlain 52  
   *angustifolius* Lam. 55  
     ssp. *angustifolius* 55  
       var. *angustifolius* 55  
       var. *violaceus* Boiss. 56  
   *anthylloides* Lam. 54  
   *asciocalyx* Bunge 55  
   *aucheri* Boiss. 55  
   *barba-jovis* DC. 53  
     var. *barba-jovis* 53  
   *bicolor* Lam. 55  
   *brachypterus* Fischer 53  
   *cadmicus* Boiss. 55  
   *campylosema* Boiss. 55  
     ssp. *campylosema* 55  
   *canescens* DC. 55  
   *christianus* L. 52  
   *compactus* Lam. 53  
   *condensatus* Ledeb. 53  
   *declinatus* Willd. 52  
   *deifolius* DC. 54  
   *Astragalus* (Forts.)  
     *depressus* L. 52  
     *elongatus* Willd. 55  
       ssp. *elongatus* 55  
     *glycyphyllos* L. 52  
       ssp. *glycyphylloides* (DC.)  
         Matthews 52  
       ssp. *glycyphyllos*  
     *gummifer* Lab. 52  
     *hamosus* L. 51  
     *haussknechtii* Bunge 51  
     *hirsutus* Vahl 55  
     *kurdicus* Boiss. 53  
       var. *kurdicus* 53  
     *lagurus* Willd. 54  
     *lamarckii* Boiss. 53  
     *lanigerus* Desf. 52  
     *leucothrix* Freyn & Bornm. 52  
     *lineatus* Lam. 54  
       var. *jildisianus* (Bornm.)  
         Matthews 54  
       var. *lineatus* 54  
     *lydius* Boiss. 54  
     *macrocephalus* Willd. 54  
       ssp. *finitimus* (Bunge)  
         Chamberlain 54  
     *macroscepus* Boiss. 52  
     *melanocephalus* Boiss. 56  
     *mesogitanus* Boiss. 54  
     *microcephalus* Willd. 52  
     *micropterus* Fischer 53  
     *noeanus* Boiss. 52  
     *odoratus* Lam. 54  
     *ornithopodioides* Lam. 54  
     *parnassi* Boiss. 54  
       ssp. *cylleneus* (Boiss. &  
         Heldr.) Hayek 54  
     *pinetorum* Boiss. 52  
     *plumosus* Willd. 53  
       var. *plumosus* 53  
     *podperae* Širj. 53  
     *ponticus* Pall. 54  
     *ptilodes* Boiss. 53  
       var. *ptilodes* 53  
     *pycnocephalus* Fischer 53  
       var. *pycnocephalus* 53  
     *renzii* Hub.-Mor. 56  
     *schizopterus* Boiss. 55  
     *setulosus* Boiss. & Bal. 55  
     *squalidus* Boiss. & Noë 55  
     *strictispinis* Boiss. 53  
     *suberosus* Banks & Sol. 51  
       ssp. *haarbachii* (Sprun.)  
         Matthews 51  
     *trojanus* Stev. 54  
     *wiedemannianus* Fischer 53  
     *xylobasis* Freyn & Bornm. 55  
       var. *angustus* (Freyn &  
         Sint.) Freyn & Bornm. 55

- Astragalus (Forts.)  
   zederbaueri Stadlmann 54  
 Athyriaceae 2  
 Athyrium Roth 2  
   distentifolium Tausch ex  
     Opiz 2  
 Atraphaxis L. 34  
   billardieri Jaub. & Spach 34  
   var. billardieri 34  
   var. tournefortii (Jaub. &  
     Spach) Cullen 34  
   spinosa L. 34  
 Atriplex L. 38  
   laevis C.A. Meyer 38  
   rosea L. 38  
 Aubrieta Adans. 14  
   canescens (Boiss.) Bornm. 14  
   ssp. canescens 14  
  
 Barbarea R.Br. 14  
   plantaginea DC. 14  
 Berteroa DC. 10  
   orbiculata DC. 10  
 Beta L. 37  
   trigyna Waldst. & Kit. 37  
 Bolanthus (Ser.) Reichb. 28  
   minuartioides (Jaub. & Spach)  
     Hub.-Mor.  
 Brassica L. 7  
   elongata Ehrh. 7  
   nigra (L.) Koch 7  
  
 Caltha L. 3  
   polypetala Hochst. ex  
     Lorent 3  
 Camelina Crantz 16  
   hispida Boiss. 16  
   var. grandiflora (Boiss.)  
     Hedge 16  
   microcarpa Andrzej. 16  
   stiefelhagenii Bornm. 16  
 Capparaceae 16  
 Cardaria Desv. 8  
   draba (L.) Desv. 8  
   ssp. chalepensis (L.)  
     O.E. Schulz 8  
 Caryophyllaceae 18  
 Celestraceae 50  
 Cerastium L. 22  
   brachypetalum Pers. 23  
   ssp. roeseri (Boiss. &  
     Heldr.) Nyman 23  
   dichotomum L. 23  
   ssp. dichotomum 23  
   ssp. inflatum (Link) Cullen  
     22  
 Cerastium (Forts.)  
   fontanum Baumg. 22  
   ssp. triviale (Link)  
     Jalas 22  
   fragillimum Boiss. 24  
   glomeratum Thuill. 23  
   perfoliatum L. 22  
   pumilum Curtis 24  
   semidecandrum L. 24  
 Ceratocephalus Moench 5  
   falcatus (L.) Pers. 5  
   testiculatus (Crantz) Roth 5  
 Ceterach DC. 2  
   officinatum DC. 2  
 Chamaecytisus Link 50  
   supinus (L.) Link 50  
 Cheilanthes Swartz 1  
   marantae (L.) Domin 1  
   persica (Bory) Kuhn 1  
 Chenopodiaceae 37  
 Chenopodium L. 37  
   album L. 38  
   ssp. album 38  
   var. album 38  
   var. microphyllum  
     (Boenn.) Aellen 38  
   ssp. iranica Aellen 38  
   ambrosioides L. 38  
   botrys L. 37  
   foliosum (Moench) Aschers.  
     37  
   murale L. 37  
   polyspermum L. 38  
   vulvaria L. 38  
 Cicer L. 56  
   anatolicum Alef. 56  
   arietinum L. 56  
 Cistaceae 16  
 Cistus L. 16  
   creticus L. 16  
   parviflorus Lam. 16  
   salviifolius L. 17  
 Clematis L. 4  
   flammula L. 4  
   orientalis L. 4  
   vitalba L. 4  
 Cleome L. 16  
   ornithopodioides L. 16  
 Clypeola L. 13  
   jonthlaspi L. 13  
 Colutea L. 51  
   melanocalyx Boiss. & Heldr.  
     51  
   ssp. davisiana (Browicz)  
     Chamb. 51  
 Conringia Adans. 8  
   orientalis (L.) Andrzej. 8  
   perfoliata (C.A. Mey.) Busch  
     8  
 Consolida (DC.) S.F. Gray 4  
   aconiti (L.) Lindley 4

- Consolida* (Forts.)  
*cruciata* (Davis & Hossain) Davis 4  
*glandulosa* (Boiss. & Huet) Bornm. 4  
*hellespontica* (Boiss.) Chater 4  
*orientalis* (Gay) Schröd. 4  
*scleroclada* (Boiss.) Schröd. 4  
*var. scleroclada* 4  
*Coronilla* L. 68  
*orientalis* Miller 68  
*var. orientalis* 68  
*scorpioides* (L.) Koch 68  
*varia* L. 69  
*ssp. varia* 69  
*ssp. libanotica* Bornm. 69  
*Coronopus* Zinn 8  
*squamatus* (Forssk.) Aschers. 8  
*Corydalis* Medik. 7  
*solida* (L.) Swartz 7  
*ssp. brachyloba* (Boiss.) Cullen & Davis 7  
*Cotinus* Adans. 50  
*coggia* Scop. 50  
*Cruciferae* 7  
*Cupressaceae* 2  
*Cyathobasis* Aellen 39  
*fruticulosa* (Bunge) Aellen 39  
*Cynocrambaceae* 39
- Delphinium* L. 3  
*albiflorum* DC. 3  
*cinereum* Boiss. 3  
*peregrinum* L. 3  
*venulosum* Boiss. 3  
*Descurainia* Webb & Berth. 15  
*kochii* (Petri) Schulz 15  
*sophia* (L.) Webb ex Prantl 15  
*Dianthus* L. 24  
*anatolicus* Boiss. 25  
*armeria* L. 25  
*ssp. armeria* 25  
*calocephalus* Boiss. 26  
*corymbosus* Sibth. & Sm. 25  
*crinitus* Sm. 25  
*var. crinitus* 25  
*var. crassopetalus* Boiss. 25  
*cyri* Fisch. & Mey. 24  
*elegans* d'Urv. 25  
*var. actinopetalus* (Fenzl) Reeve 25  
*floribundus* Boiss. 25  
*giganteus* d'Urv. 26  
*leptopetalus* Willd. 25  
*leucophaeus* Sibth. & Sm. 25  
*var. patens* Reeve 25
- Dianthus* (Forts.)  
*masmenaeus* Boiss. 25  
*var. masmenaeus* 25  
*orientalis* Adams 25  
*plumbeus* Schischk. 25  
*strictus* Banks & Sol. 25  
*var. gracilior* (Boiss.) Reeve 25  
*var. subenervis* (Boiss.) Reeve 25  
*tripunctatus* Sibth. & Sm. 24  
*zonatus* Fenzl 26  
*var. aristatus* (Boiss.) Reeve 26  
*var. hypochlorus* (Boiss. & Heldr.) Reeve 26  
*var. zonatus* 26  
*Dicotyledones* 3  
*Dictamnus* L. 48  
*albus* L. 48  
*Diploaxis* DC. 8  
*tenuifolia* (L.) DC. 8  
*Dorycnium* Miller 67  
*graecum* (L.) Ser. 67  
*pentaphyllum* Scop. 67  
*ssp. anatolicum* (Boiss.) Gams 67  
*ssp. haussknechtii* (Boiss.) Gams 67  
*ssp. herbaceum* (Vill.) Rouy 67  
*Draba* L. 13  
*bruniifolia* Stev. 13  
*ssp. bruniifolia* 13  
*Dryopteris* Adans. 2  
*borreri* Newm. 2  
*filix-mas* (L.) Schott 2  
*pallida* (Bory) Fomin 2
- Ebenus* L. 71  
*laguroides* Boiss. 71  
*var. laguroides* 71  
*Equisetaceae* 1  
*Equisetales* 1  
*Equisetum* L. 1  
*ramosissimum* Desf. 1  
*Erodium* L'Hérit. 47  
*absinthoides* Willd. 47  
*ssp. absinthoides* 47  
*cicutarium* (L.) L'Hérit. 47  
*ssp. cicutarium* 47  
*hoefftianum* C.A. Meyer 47  
*malacoides* (L.) L'Hérit. 47  
*Erysimum* L. 15  
*crassipes* Fisch. & Mey. 15  
*goniocalon* Boiss. 15  
*pulchellum* (Willd.) Gay 15  
*purpureum* Aucher 15

- Erysimum* (Forts.)  
*smyrnaeum* Boiss.& Bal. 15  
*thyrsoideum* Boiss. 15  
*Euonymus* L. 50  
*latifolius* (L.)Miller 50  
*ssp. latifolius* 50
- Fibigia* Medik. 10  
*clypeata* (L.)Medik. 10  
*eriocarpa* (DC.)Boiss. 10  
*macrocarpa* (Boiss.)Boiss. 10  
*Filicales* 1  
*Frankenia* L. 40  
*hirsuta* L. 40  
*Frankeniaceae* 40  
*Fumana* Spach 17  
*paphlagonica* Bornm.& Janchen 17  
*thymifolia* (L.)Verlot 17  
*var. viridis* (Ten.)Boiss. 17  
*Fumaria* L. 7  
*asepala* Boiss. 7  
*officinalis* L. 7  
*parviflora* Lam. 7  
*vaillantii* Lois. 7
- Galega* L. 51  
*officinalis* L. 51  
*Genista* L. 51  
*albida* Willd. 51  
*aucheri* Boiss. 51  
*lydia* Boiss. 51  
*var. antiochia* (Boiss.) P.Gibbs 51  
*sessilifolia* DC. 51  
*tinctoria* L. 51  
*Geraniaceae* 46  
*Geranium* L. 46  
*asphodeloides* Burm.fil. 47  
*ssp. asphodeloides* 47  
*cinereum* Cav. 47  
*ssp. subcaulescens* (L'Hérit.ex DC.)Hayek 47  
*var. palmatipartitum* Hausskn.ex Knuth 47  
*var. ponticum* Davis & Roberts 47  
*var. subcaulescens* 47  
*dissectum* L. 46  
*glaberrimum* Boiss.& Heldr. 46  
*lasiopus* Boiss.& Heldr. 46  
*libanoticum* Schenk 46
- Geranium* (Forts.)  
*lucidum* L. 46  
*macrostylum* Boiss. 46  
*molle* L. 46  
*ssp. molle*  
*purpureum* Vill. 46  
*pusillum* Burm.fil. 46  
*pyrenaicum* Burm.fil. 47  
*rotundifolium* L. 46  
*tuberosum* L. 46  
*ssp. tuberosum* 46  
*Glaucium* Adans. 6  
*cappadocicum* Boiss. 6  
*corniculatum* (L.)Rud. 6  
*ssp. refractum* (Náb.) Cullen 6  
*leiocarpum* Boiss. 6  
*Glycyrrhiza* L. 56  
*echinata* L. 56  
*Gonocytisus* Spach 50  
*angulatus* (L.)Spach 50  
*Guttiferae* 40  
*Gymnogrammaceae* 1  
*Gymnospermae* 2  
*Gypsophila* L. 27  
*aucheri* Boiss. 27  
*ericalyx* Boiss. 28  
*pallida* Stapf 27  
*parva* Bark. 28  
*pilosa* Hudson 28  
*pinifolia* Boiss.& Hausskn.27  
*sphaerocephala* Fenzl ex Tchihat. 27  
*var. cappadocica* Boiss. 27  
*var. sphaerocephala* 27  
*venusta* Fenzl 28  
*viscosa* Murray 28
- Habrosia* Fenzl 34  
*spinuliflora* (Ser.)Fenzl 34  
*Halimione* Aellen 38  
*portulacoides* (L.)Aellen 38  
*Halocnemum* Bieb. 38  
*strobilaceum* (Pall.)Bieb.38  
*Haplophyllum* A.Juss. 48  
*buxbaumii* (Poiret)G.Don 48  
*ssp. buxbaumii* 48  
*myrtifolium* Boiss. 48  
*suaveolens* (DC.)G.Don 48  
*var. cilicicum* (Boiss.) C.C.Townsend 48  
*var. glabrum* C.C.Townsend 48  
*telephioides* Boiss. 48  
*thesioides* (Fisch.ex DC.) G.Don 48  
*tuberculatum* (Forssk.)A.Juss. 48

*Hedysarum* L. 69  
     *laxum* Boiss. 69  
     *nitidum* Willd. 69  
     *pestalozzae* Boiss. 69  
     *pogonocarpum* Boiss. 69  
     *pycnostachyum* Hedge &  
         Hub.-Mor. 69  
*Heldreichia* Boiss. 9  
     *rotundifolia* Boiss. 9  
*Helianthemum* Miller 17  
     *ledifolium* (L.) Miller 17  
         var. *ledifolium* 17  
         var. *microcarpum* Willk. 17  
     *nummularium* (L.) Miller 17  
         ssp. *lycaonicum* Coode &  
             Cullen 17  
         ssp. *tomentosum* (Scop.)  
             Schinz & Thell. 17  
     *salicifolium* (L.) Miller 17  
*Helleborus* L. 3  
     *orientalis* Lam. 3  
*Herniaria* L. 32  
     *caucasica* Ruprecht 32  
     *glabra* L. 32  
     *hirsuta* L. 32  
     *micrantha* A.K. Jackson &  
         Turrill 32  
*Hesperis* L. 14  
     *bicuspidata* (Willd.) Poiret 14  
     *campicarpa* Boiss. 14  
     *matronalis* L. 14  
         ssp. *cilicica* (Siehe ex  
             Bornm.) Cullen 14  
*Hippocrepis* L. 69  
     *ciliata* Willd. 69  
*Holosteum* L. 24  
     *umbellatum* L. 24  
         var. *glutinosum* (Bieb.)  
             Gay 24  
*Hymenocarpus* Savi 68  
     *circinnatus* (L.) Savi 68  
*Hypecoum* L. 7  
     *imberbe* Sibth. & Sm. 7  
     *pendulum* L. 7  
*Hypericum* L. 40  
     *armenum* Jaub. & Spach 41  
     *aviculariifolium* Jaub. &  
         Spach 42  
         ssp. *depilatum* (Freyn &  
             Bornm.) Robson 42  
         var. *depilatum* 42  
     *capitatum* Choisy 41  
         var. *luteum* Robson 41  
     *confertum* Choisy 41  
         ssp. *confertum* 41  
     *hyssopifolium* Chaix 40  
         ssp. *elongatum* Ledeb. 40  
         var. *elongatum* 40

*Hypericum* (Forts.)  
     *lanuginosum* Lam. 41  
         var. *lanuginosum* 41  
     *linarioides* Bosse 41  
     *lydium* Boiss. 40  
     *montanum* L. 41  
     *montbretii* Spach 41  
     *olivieri* (Spach) Boiss. 40  
     *olympicum* L. 42  
         ssp. *olympicum* 42  
     *organifolium* Willd. 42  
     *pallens* Banks & Sol. 40  
     *perforatum* L. 42  
     *pseudolaeve* Robson 40  
     *scabrum* L. 41  
     *tetrapterum* Fries 42  
     *triquetrifolium* Turra 42  
     *uniglandulosum* Hausskn. ex  
         Bornm. 40  
*Hypolepidaceae* 1

*Iberis* L. 9  
     *attica* Jord. 9  
     *taurica* DC. 9  
*Illecebraceae* 32  
*Isatis* L. 8  
     *aucheri* Boiss. 9  
     *buschiana* Schischkin 9  
     *candolleana* Boiss. 8  
     *cappadocica* Desv. 8  
         ssp. *cappadocica* 8  
         ssp. *subradiata* (Rupr.)  
             Davis 8  
         var. *subradiata* 8  
     *glaucia* Aucher ex Boiss. 9  
         ssp. *glaucia* 9  
     *tinctoria* L. 9  
         ssp. *corymbosa* (Boiss.)  
             Davis 9  
*Isoetaceae* 1  
*Isoetes* L. 1  
     *olympica* A. Braun 1

*Juniperus* L. 2  
     *drupacea* Lab. 2  
     *excelsa* Bieb. 3  
     *foetidissima* Willd. 3  
     *oxycedrus* L. 2  
         ssp. *oxycedrus* 2

*Kochia* Roth 38  
*prostrata* (L.) Schrad. 38  
*scoparia* (L.) Schrad. 38

*Lathyrus* L. 58  
*aphaca* L. 59  
     var. *affinis* (Guss.) Arc. 59  
     var. *biflorus* Post 59  
     var. *pseudoaphaca* (Boiss.)  
         Davis 59  
*aureus* (Stev.) Brandza 58  
*brachypterus* Čel. 58  
     var. *haussknechtii* (Širj.)  
         Davis 58  
*cassius* Boiss. 59  
*cicera* L. 59  
*czeczottianus* Bässler 58  
*digitatus* (Bieb.) Fiori 58  
*inconspicuus* L. 59  
*laxiflorus* (Desf.) O. Kuntze 58  
     ssp. *angustifolius* (Post  
         ex Dinsm.) Davis 58  
     ssp. *laxiflorus* 58  
*niger* (L.) Bernh. 58  
*nissolia* L. 59  
*pratensis* L. 58  
*roseus* Stev. 58  
*sphaericus* Retz. 59  
*tukhtensis* Czech. 58

*Lavatera* L. 43  
     *punctata* All. 43

*Leguminosae* 50

*Lens* Miller 58  
     *culinaris* Medik. 58  
     *ervoides* (Brign.) Grande 58  
     *orientalis* (Boiss.) Hand.-  
         Mazz. 58

*Lepidium* L. 8  
     *campestre* (L.) R.Br. 8  
     *cartilagineum* (J. May.)  
         Thell. 8  
         ssp. *cartilagineum* 8  
     *perfoliatum* L. 8  
     *sativum* L. 8  
         ssp. *sativum* 8  
         ssp. *spinescens* (DC.)  
             Thell. 8

*Lepyrodiclis* Fenzl 22  
     *holosteoides* (C.A. Meyer)  
         Fenzl ex Fisch. & Mey. 22

*Linaceae* 44

*Linum* L. 44  
     *austriacum* L. 45  
         ssp. *austriacum* 45  
     *bienne* Miller 45  
     *cariense* Boiss. 44  
     *catharticum* L. 46

*Linum* (Forts.)  
     *corymbulosum* Reichb. 45  
     *hirsutum* L. 45  
         ssp. *pseudoanatolicum*  
             Davis 45  
     *mucronatum* Bertol. 44  
         ssp. *armenum* (Bordz.)  
             Davis 44  
     *nodiflorum* L. 44  
     *obtusatum* (Boiss.) Stapf 45  
     *strictum* L. 45  
         var. *spicatum* Pers. 45  
     *tenuifolium* L. 45  
     *trigynum* L. 45  
     *usitatissimum* L. 46  
*Lotononis* Eckl. & Zeyh. 51  
     *genistoides* (Fenzl) Benth. 51  
*Lotus* L. 67  
     *aegaeus* (Gris.) Boiss. 68  
     *angustissimus* L. 67  
     *corniculatus* L. 67  
         var. *alpinus* Ser. 67  
         var. *corniculatus* 67  
         var. *tenuifolius* L. 67  
     *cytisoides* L. 67  
     *gebelia* Vent. 67  
         var. *gebelia* 67  
         var. *hirsutissimus*  
             (Ledeb.) Dinsm. 68  
*Lychnis* L. 32  
     *coronaria* (L.) Desr. 32

*Malcolmia* R.Br. 14  
     *africana* (L.) R.Br. 14

*Malva* L. 43  
     *neglecta* Wallr. 43  
     *sylvestris* L. 43

*Malvaceae* 43

*Matthiola* R.Br. 14  
     *longipetala* (Vent.) DC. 14  
         ssp. *longipetala* 14

*Medicago* L. 65  
     *falcata* L. 66  
     *lupulina* L. 65  
     *minima* (L.) Bart. 66  
         var. *minima* 66  
     *noeana* Boiss. 66  
     *orbicularis* (L.) Bart. 65  
     *polymorpha* L. 66  
         var. *vulgaris* (Benth.)  
             Shinners 66

*radiata* L. 65  
*rigidula* (L.) All. 66  
     var. *cinerascens* (Jord.)  
         Rouy 66  
     var. *rigidula* 66  
     var. *submitis* (Boiss.) Heyn  
         66

- Medicago* (Forts.)  
*sativa* L. 66  
*ssp. sativa* 66  
*x varia* Martyn 66  
*Melilotus* L. 63  
*alba* Desr. 64  
*indica* (L.) All. 63  
*officinalis* (L.) Desr. 64  
*Minuartia* L. 19  
*aizoides* (Boiss.) Bornm. 19  
*anatolica* (Boiss.) Woron. 21  
*var. arachnoidea* McNeill 21  
*var. lanuginosa* McNeill 21  
*var. polymorpha* McNeill 21  
*var. tetrasticha* McNeill 21  
*corymbulosa* (Boiss. & Bal.) McNeill 21  
*var. corymbulosa* 21  
*decipiens* (Fenzl) Bornm. 21  
*ssp. decipiens* 21  
*erythrosepala* (Boiss.) Hand.-Mazz. 21  
*var. erythrosepala* 21  
*glandulosa* (Boiss. & Huet) Bornm. 20  
*globulosa* (Lab.) Schinz & Thell. 20  
*hamata* (Hausskn.) Mattf. 21  
*hirsuta* (Bieb.) Hand.-Mazz. 20  
*ssp. falcata* (Gris.) Mattf. 20  
*hybrida* (Vill.) Schischk. 22  
*ssp. hybrida* 22  
*ssp. turcica* McNeill 22  
*intermedia* (Boiss.) Hand.-Mazz. 21  
*juniperina* (L.) Maire & Petitm. 20  
*juressi* (Willd. ex Schlecht.) Lacaita 20  
*ssp. asiatica* McNeill 20  
*leucocephala* (Boiss.) Mattf. 21  
*leucocephaloides* (Bornm.) Bornm. 22  
*mesogitana* (Boiss.) Hand.-Mazz. 22  
*ssp. kotschyana* (Boiss.) McNeill 22  
*ssp. mesogitana* 22  
*meyeri* (Boiss.) Bornm. 22  
*micrantha* Schischk. 21  
*montana* L. 20  
*ssp. wiesneri* (Stapf) McNeill 20  
*multinervis* (Boiss.) Bornm. 20  
*sclerantha* (Fisch. & Mey.) Thell. 21  
*Minuartia* (Forts.)  
*umbellulifera* (Boiss.) McNeill 20  
*ssp. pontica* (Bornm.) McNeill 20  
*ssp. umbellulifera* 20  
*var. umbellulifera* 20  
*Moenchia* Ehrh. 24  
*mantica* (L.) Bartl. 24  
*ssp. mantica* 24  
*Myricaria* Desv. 40  
*germanica* (L.) Desv. 40  
*Nasturtium* R.Br. 14  
*officinale* R.Br. 14  
*Nigella* L. 3  
*arvensis* L. 3  
*var. glauca* Boiss. 3  
*damascena* L. 3  
*nigellastrum* (L.) Willk. 3  
*oxypetala* Boiss. 3  
*Nitraria* L. 48  
*schoberi* L. 48  
*Noaea* Moq. 39  
*mucronata* (Forssk.) Aschers. & Schweinf. 39  
*ssp. mucronata*  
*Nymphaea* L. 6  
*alba* L. 6  
*Nymphaeaceae* 6  
*Ochthodium* DC. 10  
*aegyptiacum* (L.) DC. 10  
*Onobrychis* Adans. 69  
*argyrea* Boiss. 70  
*ssp. argyrea* 70  
*ssp. isaurica* Hedge & Hub.-Mor. 70  
*armena* Boiss. & Huet 70  
*cappadocica* Boiss. 71  
*caput-galli* (L.) Lam. 70  
*cornuta* (L.) Desv. 69  
*crista-galli* (L.) Lam. 70  
*elata* Boiss. & Bal. 70  
*gracilis* Besser 70  
*hypargyrea* Boiss. 71  
*montana* DC. 70  
*ssp. cadmea* (Boiss.) P.W. Ball 70  
*ornata* (Willd.) Desv. 70  
*oxydonta* Boiss. 70  
*paucijuga* Bornm. 70  
*radiata* (Desf.) Bieb. 71

- Onobrychis* (Forts.)  
*tournefortii* (Willd.) Desv. 71  
*viciifolia* Scop. 70  
*Ononis* L. 59  
*arvensis* L. 60  
*natrix* L. 59  
*ssp. hispanica* (L.fil.) Coutinho 59  
*phyllocephala* Boiss. 60  
*pusilla* L. 60  
*reclinata* L. 59  
*spinosa* L. 60  
*ssp. leiosperma* (Boiss.) Širj. 60  
*viscosa* L. 59  
*ssp. breviflora* (DC.) Nyman 59  
*ssp. sricula* (Guss.) Hub.-Mor. 59  
*Ornithopus* L. 69  
*compressus* L. 69  
*Oxyria* Hill 34  
*digyna* (L.) Hill 34  
  
*Paeonia* L. 5  
*mascula* (L.) Miller 5  
*ssp. arietina* (Anders.) Cullen & Heywood 5  
*Paeoniaceae* 5  
*Paliurus* Miller 49  
*spina-christi* Miller 49  
*Papaver* L. 6  
*argemone* L. 7  
*clavatum* Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 7  
*cylindricum* Cullen 6  
*dubium* L. 6  
*fugax* Poiret 6  
*var. fugax* 6  
*macrostomum* Boiss. & Huet ex Boiss. 6  
*rhoeas* L. 6  
*strictum* Boiss. & Bal. 6  
*tauricola* Boiss. 6  
*triniifolium* Boiss. 6  
*Papaveraceae* 6  
*Paronychia* Miller 33  
*adalia* Chaudh. 33  
*amani* Chaudh. 33  
*anatolica* Czeacz. 33  
*ssp. anatolica* 33  
*ssp. balansae* Chaudh. 33  
*chionaea* Boiss. 33  
*dudleyi* Chaudh. 33  
*galatica* Chaudh. 33  
  
*Paronychia* (Forts.)  
*kurdica* Boiss. 33  
*ssp. kurdica* 33  
*var. kurdica* 33  
*mughlaei* Chaudh. 33  
*paphlagonica* Chaudh. 33  
*Peganum* L. 48  
*harmala* L. 48  
*Pelargonium* L'Hérit. 47  
*endlicherianum* Fenzl 47  
*Petrorrhagia* (Ser.) Link 26  
*alpina* (Habl.) Ball & Heywood 26  
*ssp. alpina* 26  
*cretica* (L.) Ball & Heywood 26  
*velutina* (Guss.) Ball & Heywood 26  
*Petrosimonia* Bunge 39  
*brachiata* (Pallas) Bunge 39  
*Pinaceae* 2  
*Pinus* L. 2  
*brutia* Ten. 2  
*nigra* Arn. 2  
*ssp. pallasiana* (Lamb.) Holmboe 2  
*sylvestris* L. 2  
*Pistacia* L. 50  
*atlantica* Desf. 50  
*terebinthus* L. 50  
*ssp. palaestina* (Boiss.) Engler 50  
*ssp. terebinthus* 50  
*Pisum* L. 59  
*sativum* L. 59  
*ssp. elatius* (Bieb.) Aschers. & Graebn. 59  
*var. elatius* 59  
*Polycarpon* Loefl. ex L. 24  
*tetraphyllum* (L.) L. 24  
*Polygala* L. 18  
*anatolica* Boiss. & Heldr. 18  
*pruinosa* Boiss. 18  
*ssp. pruinosa* 18  
*Polygalaceae* 18  
*Polygonaceae* 34  
*Polygonum* L. 35  
*amphibium* L. 35  
*arenastrum* Bor. 35  
*aviculara* L. 35  
*bellardii* All. 35  
*cognatum* Meissn. 35  
*convolvulus* L. 35  
*equisetiforme* Sibth. & Sm. 35  
*hydropiper* L. 35  
*lapathifolium* L. 35  
*polycnemoides* Jaub. & Spach 35



- Silene* (Forts.)  
     ssp. *echinus* (Boiss. & Heldr.) Coode & Cullen 30  
     ssp. *subulata* (Boiss.) Coode & Cullen 30  
     *chaetodonta* Boiss. 31  
     *chlorifolia* Sm. 29  
     *colorata* Poiret 31  
     *compacta* Fischer 30  
     *conoidea* L. 32  
     *dichotoma* Ehrh. 31  
         ssp. *dichotoma* 31  
         ssp. *sibthorpiana* (Reichb.) Rech. 31  
     *discolor* Sibth. & Sm. 31  
     *italica* (L.) Pers. 29  
     *kotschy* Boiss. 31  
         var. *kotschy* 31  
     *laxa* Boiss. & Kotschy 29  
     *macrodonta* Boiss. 31  
     *montbretiana* Boiss. 30  
     *muradica* Schischk. 29  
     *noctiflora* L. 30  
     *nocturna* L. 31  
     *olympica* Boiss. 29  
     *ruscifolia* (Hub.-Mor. & Reese) Hub.-Mor. 30  
     *sedoides* Poiret 31  
     *spergulifolia* (Desf.) Bieb. 29  
     *stenobotrys* Boiss. & Hausskn. 29  
     *subconica* Friv. 31  
     *supina* Bieb. 30  
         ssp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdh. 30  
     *vulgaris* (Moench) Garcke 30  
         var. *commutata* (Guss.) Coode & Cullen 30  
         var. *macrocarpa* (Turrill) Coode & Cullen 30  
         var. *vulgaris* 30  
*Sinapis* L. 7  
     *alba* L. 7  
     *arvensis* L. 7  
*Sinopteridaceae* 1  
*Sisymbrium* L. 15  
     *altissimum* L. 15  
     *orientale* L. 15  
     *polyceratium* L. 15  
*Sophora* L. 50  
     *alopecuroides* L. 50  
         var. *alopecuroides* 50  
*Spartium* L. 51  
     *juncum* L. 51  
*Spergularia* (Pers.) J. & C. Presl 24  
     *marina* (L.) Gris. 24  
*Spermatophyta* 2  
*Stellaria* L. 22  
     *media* (L.) Vill. 22  
*Stellaria* (Forts.)  
     ssp. *media* 22  
     ssp. *pallida* (Dumort.) Aschers. & Graebn. 22  
*Tamaricaceae* 39  
*Tamarix* L. 39  
     *hampeana* Boiss. & Heldr. 39  
     *parviflora* DC. 40  
     *smyrnensis* Bunge 40  
     *tetrandra* Pall. ex Bieb. 39  
*Telephium* L. 24  
     *imperati* L. 24  
         ssp. *orientale* (Boiss.) Nyman 24  
*Tetragonolobus* Scop. 68  
     *maritimus* (L.) Roth 68  
*Thalictrum* L. 5  
     *lucidum* L. 5  
     *minus* L. 5  
         var. *majus* (Crantz) Crépin 5  
*Theligonum* L. 39  
     *cynocrambe* L. 39  
*Thlaspi* L. 10  
     *ceratocarpon* Murray 10  
     *lilacinum* Boiss. & Huet 10  
     *oxyceras* (Boiss.) Hedge 10  
     *violascens* Boiss. 10  
*Tilia* L. 44  
     *cordata* Miller 44  
*Tiliaceae* 44  
*Tribulus* L. 48  
     *terrestris* L. 48  
*Trifolium* L. 60  
     *ambiguum* Bieb. 60  
     *angustifolium* L. 63  
         var. *angustifolium* 63  
     *apertum* Bobrov 63  
         var. *apertum* 63  
     *argutum* Sol. 61  
     *arvense* L. 63  
         var. *arvense* 63  
     *campestre* Schreb. 61  
     *caudatum* Boiss. 62  
     *cherleri* L. 62  
     *constantinopolitanum* Ser. 63  
     *echinatum* Bieb. 63  
     *fragiferum* L. 61  
         var. *fragiferum* 61  
         var. *pulchellum* Lange 61  
     *hirtum* All. 62  
     *hybridum* L. 60  
         var. *anatolicum* (Boiss.) Boiss. 60  
         var. *hybridum* 60  
     *lappaceum* L. 62

*Trifolium* (Forts.)  
*leucanthum* Bieb. 63  
*lucanicum* Gasp. 62  
*medium* L. 62  
    var. *ericalycinum*  
        Hausskn. 62  
    var. *medium* 62  
*micranthum* Viv. 61  
*nigrescens* Viv. 60  
    ssp. *petrisavii* (Clem.)  
        Holmboe 60  
*ochroleucum* Huds. 62  
*pannonicum* Jacq. 62  
    ssp. *elongatum* (Willd.)  
        Zoh. 62  
*pauciflorum* d'Urv. 63  
*physodes* Stev.ex Bieb. 61  
    var. *physodes* 61  
    var. *psilocalyx* Boiss. 61  
*pratense* L. 61  
    var. *americanum* Harz 61  
    var. *pratense* 61  
*purpureum* Lois. 63  
    var. *purpureum* 63  
*repens* L. 60  
    var. *giganteum* Lag.-  
        Foss. 60  
    var. *repens* 60  
*resupinatum* L. 61  
    var. *microcephalum* Zoh. 61  
    var. *resupinatum* 61  
*scabrum* L. 62  
*spadiceum* L. 61  
*spumosum* L. 61  
*stellatum* L. 62  
    var. *stellatum* 62  
*tenuifolium* Ten. 62  
*Trigonella* L. 64  
    *aurantiaca* Boiss. 64  
    *crassipes* Boiss. 64  
    *fischeriana* Ser. 64  
    *foenum-graecum* L. 65  
    *monantha* C.A.Meyer 65  
        ssp. *monantha* 65  
        ssp. *noeana* (Boiss.)  
            Hub.-Nor. 65  
    *monspeliaca* L. 65  
    *procumbens* (Besser)Reichb.65  
    *rigida* Boiss.& Bal. 65  
    *spicata* Sibth.& Sm. 65  
    *spruneriana* Boiss. 64  
        var. *spruneriana* 64  
    *velutina* Boiss. 64  
*Tuberaria* (Dunal)Spach 18  
    *guttata* (L.)Fourr. 18  
        var. *guttata* 18

*Turritis* L. 14  
    *laxa* (Sibth.& Sm.)Hayek 14  
*Vaccaria* Medik. 28  
    *pyramidata* Medik. 28  
        var. *grandiflora* (Fisch.ex  
            DC.)Cullen 28  
        var. *pyramidata* 28  
*Velezia* L. 26  
    *rigida* L. 26  
*Vicia* L. 56  
    *alpestris* Stev. 57  
        ssp. *hypoleuca* (Boiss.)  
            Davis 57  
    *anatolica* Turritt 57  
    *caesarea* Boiss.& Bal. 57  
    *cassubica* L. 56  
    *cracca* L. 56  
        ssp. *cracca* 56  
        ssp. *stenophylla* Vel. 56  
        ssp. *tenuifolia* (Roth)  
            Gaudin 57  
    *crocea* (Desf.)B.Fedtsch.56  
    *ervilia* (L.)Willd. 57  
    *freyniana* Bornm. 56  
    *hirsuta* (L.)S.F.Gray 57  
    *narbonensis* L. 57  
        var. *narbonensis* 57  
    *noeana* Reuter ex Boiss. 57  
        var. *noeana* 57  
    *pannonica* Crantz 57  
        var. *pannonica* 57  
    *peregrina* L. 57  
    *sativa* L. 57  
        ssp. *nigra* (L.)Ehrh. 57  
        var. *nigra* 57  
*Viola* L. 18  
    *alba* Besser 18  
        ssp. *dehnhardtii* (Ten.)  
            Becker 18  
    *arvensis* Murray 18  
    *kitaibeliana* Roem.&  
        Schult. 18  
*Violaceae* 18  
  
*Zygophyllaceae* 48

Verzeichnis der berücksichtigten Veröffentlichungen:

- Baytop A. & Tuzlaci E. (1976): The Flora of Honaz Dagi I.  
Istanb. Ecz. Fac. Mec., 12,30.
- Davis P.H.: Flora of Turkey and the East Aegean Islands.  
Vol.I(1965), Vol.II(1967), Vol.III(1970)
- Düzenli A. (1977): Hasandağ (B5-Niğde) İcin Yeni Bitki  
Türleri. A.Ü.Fen Fakültesi Sistematiik Botanik  
Kürsüsü, Ankara.
- Huber-Morath, A. (1966): Beiträge zur Kenntnis der anatoli-  
schen Flora III. Bauhinia 3:7-45
- Huber-Morath, A. (1973): Ergänzungen zur Flora der Türkei.  
Verhandl. Naturf. Ges. Basel 83:193-318.
- Kilinç M. (1977): New Floristic Records From A5 (Kastamonu-Çorum). COMMUNICATIONS de la Faculté des  
Sciences de l'Université d'Ankara.
- Quezel P., Contandriopoulos J. & Pamukçuoğlu A. (1970):  
Contribution à l'étude de la flore des hautes  
montagnes de l'Anatolie occidentale.  
Candollea 25/2:341-387.
- Uslu T. (1977): New Floristic Records From the South of  
Turkey (İçel Province). COMMUNICATIONS de la  
Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara.
- Uslu T. (1977): A Plant Ecological and Sociological Re-  
search on the Dune and Maquis Vegetation  
between Mersin and Silifke. COMMUNICATIONS de  
la Faculté des Sciences de l'Université  
d'Ankara.
- Yurdakulol E. (1977): New Floristic Records From Southern  
Turkey (Adana, Distr. Karsani). COMMUNICATIONS  
de la Faculté des Sciences de l'Université  
d'Ankara.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Friederike Sorger

Uetzgasse 15

A-1100 WIEN

DIE ERGEBNISSE MEINER SAMMELREISEN

IM BERGLAND WESTLICH DES BEYŞEHIRSEES

Das Gebiet westlich des Beyşehirsees ist wenig bevölkert und nur extensiv genutzt, wodurch sich eine relativ ursprüngliche und stellenweise reiche Vegetation bis heute erhalten konnte.


In der vorliegenden Arbeit wird auf pflanzengeographisch und floristisch bemerkenswerte Funde hingewiesen und eine Liste der in diesem Gebiet gesammelten Belege angeführt. Zahlreiche Funde, die bisher noch nicht bestimmt werden konnten, fehlen in dieser Artenliste.

Zu großem Dank bin ich den Bearbeitern von Davis "Flora of Turkey" verpflichtet, die viele meiner Belege bestimmten. Herzlich danke ich Herrn K.Fitz (Naturh. Mus.-Wien) der mir half, zahlreiche in Davis "Flora of Turkey" noch nicht behandelte Arten zu bestimmen. Auch Herrn Dr. Huber-Morath (Basel), dem ich Belege unterbreiten durfte, danke ich für seine Mühe.

Die aus Davis "Flora of Turkey", Band 1 bis 5, entnommenen Verbreitungsangaben beschränken sich nur auf Gebiete die innerhalb der Türkei liegen.

Verwendete Abkürzungen :

A = Anamas  
 B = Beyşehirsee  
 C = Çiçek Dağları  
 D = Dedegöl Dağ  
 K = Kuru Tepe  
 S = Şarkikaraağaç  
 Y = Yenişarbademli  
 end. = endemisch für  
 die Türkei



Fundorte:	A	=	Anamas
	B	=	Beyşehirsee, Uferbereich
	C	=	Çiçek Dağları
	D	=	Dedegöl Dağı
	K	=	Kuru Tepe
	S	=	Şarkikaraağaç
	Y	=	Yenişarbademli

Westlich des Beyşehirsees liegen die mächtigen Dedegöl Dağlari (Anamas Dağlari), deren höchste Erhebung der Dipoyraz Dağ oder Dedegöl Dağ ist. Dieser liegt inmitten eines weitausgedehnten walddreichen Berglandes, das er mit seiner fast 3000 m Höhe weit überragt. Dieser Berg stellt einen hoch über die Waldgrenze erhobenen Rücken dar, der eine schroff aufgesetzte felsige Gipfelpartie trägt.

Die reichste Vegetation fand sich im Bereich eines in ca. 1450 m Höhe tosend aus dem Fels entspringenden Gebirgsbaches vor, inmitten eines Pinus pallasiana-Waldes gelegen. Auffallend war hier das Vorkommen von aus Mitteleuropa geläufigen Arten wie Mycelis muralis (L.) Dum., Sambucus ebulus L. und Epilobium angustifolium L. neben anderen für die dortige Flora charakteristischen Arten wie Tanacetum cilicicum (Boiss.) Grierson, Cistus laurifolius L., Cirsium sintenisii Freyn und Ranunculus sericeus Banks & Sol. Üppige Vegetation zeigte ferner eine in ca. 1700 m Höhe befindliche unbeweidete Felsblockhalde.

Die weiter oben stark ansteigenden Hänge erwiesen sich dagegen sehr vegetationsarm, die Pflanzendecke war von Schutt durchsetzt.

Reiche Vegetation zeigte dann wieder die Basis des schroffen felsigen Gipfels; riesige Schneemassen bleiben hier in einer Karstufe bis in den Hochsommer liegen und versorgen die anschließende Pflanzendecke mit genügend Feuchtigkeit. Sowohl die subnivale Polsterzone als auch die etwas tiefer gelegene farbenprächtige und artenreiche Dornpolstersteppe bargen eine Fülle endemischer Arten.

Den Dedegöl Dağlari sind die Çiçek Dağlari vorgeklagert, die direkt vom Westufer des Beyşehirsees aufsteigen. Bemerkenswert ist der in den Niederungen gegen das Seeufer stellenweise sehr dichte Juniperus foetidissima-Wald, der in den höheren Lagen in einen Cedrus libani - Juniperus excelsa-Wald übergeht. Steile, nahe-

zu vegetationslose Schutthalden führen bis zum Gipfel.

Eine artenreiche Vegetation fand sich in einem ca. 1500 m hoch liegenden unbeweideten Becken vor, das seine Feuchtigkeit von den im Frühjahr vom Berg kommenden Bächen bezieht und das durch einen feuchten vegetationsreichen Bergeinschnitt mit dem See in Verbindung steht.

Yenişarbademli ist eine kleine Ortschaft und liegt am Fuß des Dedegöl Dağ gegen den Beyşehirsee zu. Bemerkenswert war hier ein unweit gelegener teilweise abgeholzter *Abies cilicica*-Wald mit buschförmig wachsenden Eichenarten wie *Quercus cerris* L., *Qu. infectoria* Oliv. ssp. *infectoria*, *Qu. macrolepis* Kotschy und *Qu. trojana* Webb.

Im Bereich von Anamas (Aksu), einer kleinen Ortschaft am Westhang der Dedegöl Dağları zeigte sich am Rand eines Gebirgsbaches und am Fuß nahezu senkrecht aufsteigender Felswände eine üppige Vegetation. Überraschend war hier die große Anzahl von Moosen und von hochwüchsigen Stauden wie *Seseli gummiferum* Pallas ex Sm. ssp. *corymbosum* und *Cephalaria dipsacoides* Boiss. & Bal. in den Spalten der steilen Felswände.

Im Hügelland nordwestlich des Beyşehirsees (im Bereich des ca. 1600 m hohen Kuru Tepe und seiner südlichen Ausläufer) sind vor allem Steppenpflanzen beheimatet. Während die Kuppen der Steppenhügel strauchlos waren, bargen die Niederungen stellenweise reiche Gebüschvegetation mit *Amelanchier parviflora* Boiss. var. *parviflora*, *Amelanchier rotundifolia* (L.)Dum.-Courset ssp. *rotundifolia*, *Amygdalus orientalis* Miller, *Amygdalus webbii* Spach, *Amygdalus x balansae* Boiss., *Celtis tournefortii* Lam., *Cotoneaster nummularia* Fisch.& Mey., *Crataegus aronia* (L.)Bosc.ex DC. var. *aronia*, *Crataegus aronia* (L.)Bosc.ex DC. var. *minuta* Browicz, *Jasminum fruticans* L., *Juniperus oxycedrus* L., *Quercus trojana* Webb., *Rhamnus rhodopeus* Velenovsky und *Rosa canina* L.

Am Nordufer des Beysehirsees liegt ausgedehntes Weideland für Rinder und Pferde, wovon große Flächen mit *Iris pseudacorus* L. bewachsen waren, nur kleine Teile wurden ackerbaulich genutzt. Für das Westufer ist ein *Juniperus foetidissima*-Wald bezeichnend, der durch stellenweise Rodung Weideland für Schafe oder im Bereich von Ortschaften Kulturland bietet. Auffallend waren die einem Schilfgürtel vorgelagerten Bestände von *Nymphaea alba* L., *Nuphar lutea* (L.) Sm., *Polygonum amphibium* L. und *Ranunculus sphaerospermus* Boiss. & Blanche. In felsigen Buchten befanden sich hohe Büsche von *Euphorbia kotschyana* Fenzl, *Phlomis grandiflora* H.S. Thompson und *Marsdenia erecta* (L.) R.Br., dazwischen standen *Verbascum glomeratum* Boiss. mit nahezu 2 m Höhe und *Onopordum bracteatum* Boiss. & Heldr.

Pflanzengeographisch bemerkenswert ist die große Zahl von vorwiegend in Nordanatolien verbreiteten Arten, die hier im mittleren Südwestanatolien ein isoliertes Vorkommen haben. Die in folgender Aufzählung verwendeten Abkürzungen der Verbreitungsangaben wurden aus Davis "Flora of Turkey", Band 1 bis 5, übernommen.

<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm. : A2-7, B6	Isparta
Bachrand, 1400 m,	D, C3
<i>Amygdalus x balansae</i> Boiss. : A4, B2, 4	
Gebüschvegetation, 1250 m,	end. K, "
<i>Anthemis aciphylla</i> Boiss.	
var. <i>discoidea</i> Boiss. : A2, B2, 3	
Felsblockhalde, 1600 m,	end. D, "
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. : A1, 2, 5	
Bergeinschnitt, 1300 m,	C, "
<i>Astragalus paecilanthus</i> Boiss. : B2	end.
Pinus pall.-Wald, 1500 m,	D, "
Schutthalden, 1700 m,	D, "
<i>Astragalus warburgii</i> Bornm. : B3	
Felsblockhalde, 1600 m,	end. D, "
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. : A5	
W-Ufer, Verlandungszone, 1116 m,	B, "

<i>Bunium microcarpum</i> (Boiss.) Freyn	Isparta
ssp. <i>bourgaei</i> (Boiss.) Hedge & Lamond: A3-9, B7	
Felsblockhalde, 1600 m,	D, C3
<i>Chaerophyllum aureum</i> L. : A1, 4-9, B7	
Bachrand, 1400 m,	D, "
<i>Cirsium leucopsis</i> DC. : A2, 5, B3	
Bachrand, 1400 m,	end. D, "
<i>Dianthus lydus</i> Boiss. : A1, 4, B1, 2	
Cedrus libani-Waldrand, 1600 m,	end. C, "
<i>Equisetum arvense</i> L. : A2, 4, 8, B4, 7, 9	
feuchte Wiesen, 1300 m,	D, "
<i>Erysimum pulchellum</i> (Willd.) Gay : A2, 4, 5, 7-9,	
Dornpolstersteppe, 2200 m B6, 7	D, "
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller	
ssp. <i>lycaonicum</i> Coode & Cullen : A4, B2-4, 6	
Bergsteppe, 1300 m,	end. K, "
ssp. <i>ovatum</i> (Viv.) Schinz & Thellung : A4	
Pinus pallasiana-Wald, 1400 m,	D, "
<i>Paronychia anatolica</i> Czeaczott	
ssp. <i>anatolica</i> : A5	
Bergsteppe, 1300 m,	end. K, "
<i>Pilosella cymosa</i> (L.) C.H. & F.W. Schultz: A1, 2,	
Cedrus libani-Wald, 1600 m, A5, 7-9, B6, 8	C, "
<i>Pilosella x ruprechtii</i> (Boiss.) Seel & West:	
A3-5, 8, B7	
Pinus pallasiana-Wald, 1500 m,	D, "
<i>Quercus trojana</i> Webb. : (Hegi) Nord-West-	
Kleinasien	
Abies cilicica-Wald, 1300 m,	Y, "
<i>Ranunculus brutius</i> Ten. : A2-7, B2	
Bachrand, 1400 m,	D, "
<i>Rhamnus rhodopeus</i> Velenovsky : A1-5, B2-4	
Bergsteppe, 1300 m,	K, "
<i>Rhynchocorys elephas</i> (L.) Gris. : N & E-Anatlien	
Bachrand, 1400 m,	D, "
<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	
var. <i>adenophora</i> (C.Koch) Engler & Irmscher :	
Felswände, 1700 m, A2, 5-8, B3, 5, 8, 10	D, "
<i>Scorzonera pygmaea</i> Sibth. & Sm.	
ssp. <i>pygmaea</i> : A2	
Dornpolstersteppe, 2300 m,	end. D, "
<i>Sedum dasyphyllum</i> L. : C3	
Felshöhlen, 1600 m,	D, "
<i>Sempervivum armenum</i> Boiss. : A4, 7, 8, B8	
Schutthalden, 1700 m,	end. D, "

<i>Staurophragma natolicum</i> Fisch.& Mey. : A8,B5-7	Isparta
Bergsteppe, 1400 m,	K, C3
<i>Taraxacum turcicum</i> Van Soest : A2,8	end.
Bachrand, 1500 m,	A, "
<i>Thlaspi kotschyanum</i> Boiss.& Hohen. : B6	
Schutthalden, 1900 m,	D, "
<i>Tilia cordata</i> Mill. : A2	
Mischwald, 1350 m,	D, "
<i>Valeriana officinalis</i> L. : A1-3,8,9,B5,7,9	
Bachrand, 1400 m,	D, "
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	
var. <i>pannonica</i> : A1-3,9	
Bergeinschnitt, 1300 m,	C, "
<i>Vicia truncatula</i> Fisch.ex Bieb. : A4,5,9	
Pinus pallasiana-Wald, 1500 m,	D, "

Bei folgenden Arten zeigte sich eine Gebietserweiterung bis zum Beyşehirsee :

<i>Acer hyrcanum</i> Fisch.& Mey.	
ssp. <i>tauricolum</i> (Boiss.& Bal.) Yalt. : B6,C5,6,9	
Felsblockhalde, 1700 m,	D, "
<i>Arabis aubrietioides</i> Boiss. : B6,C4,5	
Fels, 1600-2100 m,	end. C, "
<i>Arenaria isaurica</i> Boiss. : C4	
vegetationsreiche Senke, 1500 m,	end. C, "
<i>Dianthus cyri</i> Fisch.& Mey. : B9,C7	
E-Ufer, 1120 m,	B, "
<i>Dianthus leucophaeus</i> Sibth.& Sm.	
var. <i>patens</i> Reeve : C5	
subnivale Polsterzone, 2400 m,	end. D, "
<i>Geranium lasiopus</i> Boiss.& Heldr. : C4	
Felswände, 1700 m,	end. D, "
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. : A1,2,B1,7,C6	
NW-Ufer, 1116 m,	B, "
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret : A1,2,4,C6	
W-Ufer, 1117 m,	B, "
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth : A3,4,6-9,B1,C6	
Felsblockhalde, 1700 m,	D, "
<i>Polygonum convolvulus</i> L. : A1-3,7-9,B2,4,5,9,C6	
Bachrand, 1400 m,	D, "

<i>Rumex acetosella</i> L. : A1-9,B1,2,4-7,9,10,C6 Schutthalden, 1600 m,	Isparta D, C3
<i>Rumex nepalensis</i> Sprengel : A2-4,7,B2,3,7,C6 Bachrand, 1400 m,	D, "
<i>Rumex remotiflorus</i> Samuelsson : Amanus Bachrand, 1400 m,	D, "
<i>Senecio othonnae</i> Bieb. : A1,2,9,B1,7-9,C6,10 Pinus pallasiana-Wald, 1400 m,	D, "
<i>Silene caramanica</i> Boiss.& Heldr. : C4,6 Bergsteppe, 1400 m,	end. K, "
<i>Thalictrum flavum</i> L. : A2,B1,6,9,C5 Bachrand, 1500 m,	A, "
<i>Thlaspi violascens</i> Boiss. : A4,5,C5 Pinus pallasiana-Wald, 1500 m,	end. D, "
<i>Xanthogalum purpurascens</i> Lallem. : A6-9,B2,7-9, Bachrand, 1400 m,	C5,9 D, "

Floristisch bemerkenswerte Funde sind weiters :

*Alyssum cephalotes* Boiss. : Bisher nur aus C2 Honaz Dağh bekannt. Nach Dudley in sched. zweiter Fundort in Anatolien. Dedegöl Dağ, auf einer verhältnismäßig vegetationsreichen Stelle im Bereich der Schutthalden, ca. 1900 m.

*Aethionema thesiifolium* Boiss.& Heldr. : Bisher nur von zwei Standorten um Egridir bekannt. Dritter Fundort Çiçek Dağlari, vegetationsreicher Bergeinschnitt, 1400 m.

*Baldellia ranunculoides* (L.)Parl. : Bisher nur aus A5 bekannt. Beyşehirsee, W-Ufer, 1116 m.

*Geranium lasiopus* Boiss.& Heldr. : Diese Art wurde seit Heldreich (C4 Konya) nicht mehr gefunden. Dedegöl Dağ, in Spalten senkrechter Felswände, ca. 1700 m.

*Rhamnus nitidus* Davis : Die bisher nur als Lokalendemit der Provinz C2 Antalya bekannte Art besitzt in C3 ein weiteres Vorkommen. Dedegöl Dağ, offener Pinus pallasiana-Wald, 1400 m.

*Rumex x remotiflorus* Samuelsson (*R.crispus x nepalensis*): Wird von Rechinger (Cand. XII 1949 : 144) für "Syrien, Amanus, 1000 m, Haradjan 811" angegeben. Wahrscheinlich Neufund für Anatolien. Dedegöl Dağ, Bachrand, 1300-1400 m.

- Silene phrygia* Boiss. : Erster Wiederfund seit Boissiers Zeiten (B2 - Balansa, C2 - Bourgeau).  
Kuru Tepe, Steppenhang, 1500 m.
- Thlaspi papillosum* Boiss. : Die bisher nur als Lokalen-  
demit der Provinz C2 Antalya bekannte Art besitzt  
in C3 Isparta ein weiteres Vorkommen. Dedegöl Dağ,  
Dornpolstersteppe, 2200 m.

Folgend angeführte Belege wurden als neue Arten  
bestimmt :

- Astragalus sorgerae* Hub.-Mor.& Chamb. : Dedegöl Dağ, an  
steilen, felsigen Berghängen und am Rand einer  
Felsblockhalde, 1600-1800 m.
- Celsia sorgerae* Hub.-Mor. : Çiçek Dağlari, *Cedrus libani*  
- *Juniperus excelsa*-Waldrand, felsig, 1600 bis  
1700 m.
- Lamium glandulosodentatum* Hub.-Mor. : Dedegöl Dağ, Fels-  
blockhalden, 2200-2400 m.
- Verbascum adenocarpum* Hub.-Mor. : Çiçek Dağlari, vegeta-  
tionsreiche Senke, 1500 m.

Auf den anschließenden Seiten folgt nun die einlei-  
tend erwähnte Liste der in den besuchten Gebieten gefun-  
denen Arten, wovon sämtliche Belege im HERBAR SORGER  
aufliegen.

<u>ACANTHACEAE</u>			
<i>Acanthus hirsutus</i> Boiss.	C		1300
<u>ACERACEAE</u>			
<i>Acer hyrcanum</i> Fisch. & Mey.			
ssp. <i>tauricum</i> (Boiss. & Bal.) Yalt.	D		1600
" <i>monspessulanum</i> L.			
ssp. <i>monspessulanum</i>	C		1300
<u>ALISMATACEAE</u>			
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	B		1116
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	B		1116
<u>AMARYLLIDACEAE</u>			
<i>Galanthus elwesii</i> J.D. Hook.	D		1600
<u>ANACARDIACEAE</u>			
<i>Pistacia terebinthus</i> L.			
ssp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Engler	A	K Y	1300-1500
<u>APOCYNACEAE</u>			
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. & Kit.	C K		1300-1600
<u>ARACEAE</u>			
<i>Arum orientale</i> Bieb.	D		1600
<u>ARALIACEAE</u>			
<i>Hedera helix</i> L.	A		1500
<u>ARISTOLOCHIACEAE</u>			
<i>Aristolochia maurorum</i> L.	B	K	1200
<u>ASCLEPIADACEAE</u>			
<i>Cynanchum canescens</i> (Willd.) K. Schum.	B	K	1200
" <i>fuscatum</i> (Vis.) Lk.		K Y	1200
<i>Marsdenia erecta</i> (L.) R. Br.	B		1200
<u>BERBERIDACEAE</u>			
<i>Berberis crataegina</i> DC.		Y	1200
<u>BORAGINACEAE</u>			
<i>Alkanna areolata</i> Boiss.	CD		1600
" <i>tinctoria</i> (L.) Tausch			
ssp. <i>anatolica</i> Hub.-Mor.		K	1200
" <i>tubulosa</i> Boiss.		K	1300
<i>Anchusa azurea</i> Miller	BC		1500
" <i>barrelieri</i> (All.) Vitman		D	1400
" <i>undulata</i> L.			
ssp. <i>hybrida</i> (Ten.) Coutinho	BCD		1150-1400
<i>Asperugo procumbens</i> L.	C		1300
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst.			
ssp. <i>arvensis</i>		KS	1300
ssp. <i>gasparrinii</i> (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes	CD		1400-1600

- 99 -

**BORAGINACEAE (Forts.)**

<i>Cerinth minor</i> L.			
ssp. <i>auriculata</i> (Ten.) Domac	K		1200
<i>Cynoglossum montanum</i> L.	C	Y	1300
<i>Echium italicum</i> L.	K		1150
<i>Heliotropium suaveolens</i> Bieb.	A		1200
<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt			
ssp. <i>alpestris</i>	CD		1600-1700
" <i>incrassata</i> Guss.	K		1300
" <i>minutiflora</i> Boiss.	S		1300
" <i>refracta</i> Boiss.			
ssp. <i>refracta</i>	C		1400-1600
" <i>stricta</i> Link	S		1300
<i>Omphalodes luciliae</i> Boiss.			
ssp. <i>luciliae</i>	D		2200
<i>Onosma armenum</i> DC.	K		1300
" <i>aucheranum</i> DC.	C		1800
" <i>bornmuelleri</i> Hausskn.	D		1600
" <i>bracteosum</i> Hausskn. & Bornm.	K		1400
" <i>stenolobum</i> Hausskn. ex Riedl	C		1600
" <i>tauricum</i> Pall.	C		1600
<i>Rindera lanata</i> (Lam.) Bunge			
var. <i>canescens</i> (A.DC.) Kusnez.	C		1600
<i>Rochelia cancellata</i> Boiss. & Heldr.	C		1300
" <i>disperma</i> (L.f.) C.Koch	K		1200
<i>Symphytum brachycalyx</i> Boiss.	D		1400-1600

**BUTOMACEAE**

<i>Butomus umbellatus</i> L.	B		1120
------------------------------	---	--	------

**CAMPANULACEAE**

<i>Asyneuma compactum</i> (Boiss. & Heldr.)			
Damboldt	D		1900-2400
" <i>limonifolium</i> (L.) Janchen			
ssp. <i>limonifolium</i>	C	K	1300-1600
" <i>linifolium</i> (Boiss. & Heldr.) Bornm.			
ssp. <i>linifolium</i>	A	CD	1300-1600
" <i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.			
ssp. <i>sibthorpium</i> (Roemer' & Schultes) Damboldt	D		1600-1800
<i>Campanula cymbalaria</i> Sibth. & Sm.	A	D	1500-2200
" <i>involuta</i> Auch. ex DC.	CD		1600
" <i>lyrata</i> Lam.	D	Y	1400
" <i>michauxioides</i> Boiss.	D		1400-1500
" <i>propinqua</i> F.Mey.	A		1500
<i>Legousia pentagonia</i> (L.) Bornm.	C	K	1300-1600

CAPRIFOLIACEAE*Lonicera etrusca* Santivar. *etrusca*

Y 1300

" *nummulariifolia* Jaub. & Spachssp. *nummulariifolia*

C 1600

*Sambucus ebulus* L.

D 1400

CARYOPHYLLACEAE*Agrostemma githago* L.

C 1300

*Arenaria acerosa* Boiss.

D 1500

" *isaurica* Boiss.

C 1600-1800

" *leptoclados* (Reichb.) Guss.

AB D 1150-1600

" *serpyllifolia* L.

C K Y 1300-1500

" *tmolea* Boiss.

D 1500

*Bolanthus minuartioides* (Jaub. & Spach)

K 1300

Hub.-Mor.

*Cerastium banaticum* (Roch.) Heuff.ssp. *banaticum*

C K 1300-1600

" *brachypetalum* Pers.ssp. *roeseri* (Boiss. & Heldr.) Nyman

A CDK Y 1300-1600

" *dichotomum* L.ssp. *dichotomum*

CD 1500-1900

" *fontanum* Baumg.ssp. *triviale* (Link) Jalas

A 1500

" *fragillimum* Boiss.

D 1500

" *macranthum* Boiss.

CD 1400-1900

*Dianthus* : siehe Nachtrag auf Seite 122 !*Gypsophila venusta* Fenzl

K 1200-1300

" *viscosa* Murr.

S 1200

*Minuartia anatolica* (Boiss.) Woron.var. *anatolica*

A CDK 1300-2000

" *erythrosepala* (Boiss.) Hand.-Mazz.var. *erythrosepala*

C 1700

" *hamata* (Hausskn.) Mattf.

C 1500

" *hybrida* (Vill.) Schischk.ssp. *hybrida*

AB D 1150-1500

" *juniperina* (L.) Maire & Petitm.

A CD 1400-2400

" *leucocephala* (Boiss.) Mattf.

D 2200-2400

" *leucocephaloides* (Bornm.) Bornm.

K 1300

" *meyeri* (Boiss.) Bornm.

D Y 1300-1700

" *multinervis* (Boiss.) Bornm.

B D 1150-1500

" *pestalozzae* (Boiss.) Bornm.

CD 2000-2400

" *recurva* (All.) Schinz & Thell.ssp. *oreina* (Mattf.) McNeill

D 1900-2400

" *umbellulifera* (Boiss.) McNeillssp. *umbellulifera*var. *umbellulifera*

D 2200

*Petrorhagia alpina* (Habl.) Ball & Heywoodssp. *olympica* (Boiss.) Ball & Heywood

D 1500-1600

*Sagina procumbens* L.

A 1500

*Saponaria chlorifolia* Kunze

D 1400

" *kotschyi* Boiss.

A 1500

" *mesogitana* Boiss.

C 1600

" *pumilio* Boiss.

D 2200-2600

## CARYOPHYLLACEAE (Forts.)

<i>Silene alba</i> (Miller) Krause			
ssp. <i>divaricata</i> (Reich.) Walters	CD		1300-1500
ssp. <i>eriocalycina</i> (Boiss.) Walters	CD		1300-1500
" <i>caramanica</i> Boiss. & Heldr.	K		1400
" <i>caryophylloides</i> (Poir.) Otth			
var. <i>echinus</i> (Boiss. & Heldr.) Coode & Cullen	D		2200-2500
" <i>compacta</i> Fischer	A		1250
" <i>conoidea</i> L.	K		1300
" <i>italica</i> (L.) Pers.	CD	Y	1300-1500
" <i>macrodonta</i> Boiss.	K		1300-1500
" <i>odontopetala</i> Fenzl	A	D	1500-2000
" <i>oreades</i> Boiss. & Heldr.	D		2200-2500
" <i>otites</i> (L.) Wibel	K		1400
" <i>phrygia</i> Boiss.	K		1500
" <i>rhynchocarpa</i> Boiss.	D		1700
" <i>subconica</i> Friv.	K		1300
" <i>supina</i> Bieb.			
ssp. <i>pruinosa</i> (Boiss.) Chowdh.	D		1400
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.			
ssp. <i>media</i>	CD		1300-1600
ssp. <i>pallida</i> (Dumort.) Aschers. & Graebn.	A		1500
<i>Telephium imperati</i> L.			
ssp. <i>orientale</i> (Boiss.) Nyman	A	C	1300-1500
<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik.			
var. <i>grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Cullen	D		1400
<i>Velezia rigida</i> L.	AB		1150-1500

CELASTRACEAE

<i>Euonymus latifolius</i> Scop.	D		1400
----------------------------------	---	--	------

CHENOPODIACEAE

<i>Atriplex rosea</i> L.		S	1150
<i>Beta lomatogona</i> Fisch. & Mey.	C	K	1300
<i>Chenopodium album</i> L.			
ssp. <i>album</i>			
var. <i>album</i>	B		1150
" <i>botrys</i> L.	A		1500
" <i>foliosum</i> (Moench) Aschers.	C		1200
<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Aschers. & Schweinf.		K	1200
<i>Salsola ruthenica</i> Iljin	A		1200

CISTACEAE

<i>Cistus laurifolius</i> L.	D		1500
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller			
ssp. <i>lycaonicum</i> Coode & Cullen	K		1300
ssp. <i>ovatum</i> (Viv.) Schinz & Thellung	D		1400-1500
" <i>salicifolium</i> (L.) Miller	B	K	1150-1200

COMPOSITAE

<i>Achillea kotschyi</i> Boiss.			
ssp. <i>kotschyi</i>	CD		1600-1700
" <i>nobilis</i> L.			
ssp. <i>neilreichii</i> (Kerner) Formanek	S		1150
" <i>wilhelmsii</i> C.Koch	KS		1200
<i>Anthemis aciphylla</i> Boiss.			
var. <i>aciphylla</i>	D		1500-1700
var. <i>discoidea</i> Boiss.	D		1500
" <i>austriaca</i> Jacq.	C		1600
" <i>cotula</i> L.	B		1200
" <i>cretica</i> L.			
ssp. <i>albida</i> (Boiss.) Grierson	A D Y		1300-1600
ssp. <i>anatolica</i> (Boiss.) Grierson	DK		1600
ssp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson	C		1600
ssp. <i>leucanthemoides</i> (Boiss.) Grierson	D		1700
" <i>pseudocotula</i> Boiss.	ABC K		1150-1600
" <i>tinctoria</i> L.			
var. <i>tinctoria</i>	A CD		1200-1600
" <i>wiedemanniana</i> Fisch. & Mey.	K		1200
<i>Artemisia absinthium</i> L.	D		1600
<i>Aster alpinus</i> L.	D		2200-2500
<i>Bellis perennis</i> L.	A D		1400-1500
<i>Carduus nutans</i> L.	K		1200
" <i>pycnocephalus</i> L.			
ssp. <i>albidus</i> (Bieb.) Kazmi	A C		1300-1500
" <i>rechingerianus</i> Kazmi	B		1120
<i>Carthamus lanatus</i> L.	K		1200
<i>Centaurea calolepis</i> Boiss.	K		1300
" <i>cariensis</i> Boiss.			
ssp. <i>longipapposa</i> Wagenitz	A		1500
ssp. <i>microlepis</i> (Boiss.) Wagenitz	K		1300
" <i>depressa</i> Bieb.	C		1300
" <i>drabifolia</i> Sm.			
ssp. <i>dentosa</i> (Bornm.) Wagenitz	CD		1300-2200
" <i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	C		1300
" <i>reuterana</i> Boiss.			
var. <i>phrygia</i> Bornm.	C		2100
var. <i>reuterana</i>	A		1500
" <i>solstitialis</i> L.			
ssp. <i>solstitialis</i>	C		1300
" <i>triumfetti</i> All.	CD		1300-1900
" <i>urvillei</i> DC.			
ssp. <i>stepposa</i> Wagenitz	B		1130
ssp. <i>urvillei</i>	D		1200
" <i>virgata</i> Lam.	A		1100
<i>Cephalorrhynchus tuberosus</i> (Stev.) Schchian	D		1400-1600
<i>Chardinia orientalis</i> (L.) O.Kuntze	K		1300
<i>Chondrilla juncea</i> L.			
var. <i>juncea</i>	K		1200

COMPOSITAE (Forts.)		
<i>Cicerbita variabilis</i> (Bornm.) Bornm.	CD	1400-1600
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		
ssp. <i>vestitum</i> (Wimmer & Grab.) Petrak	S	1150
" <i>leucopsis</i> DC.	D	1400
" <i>sintenisii</i> Freyn	D	1400
" <i>vulgare</i> (Savi) Ten.	D	1400
<i>Cnicus benedictus</i> L.		
var. <i>kotschyi</i> Boiss.	K	1300
<i>Crepis foetida</i> L.		
ssp. <i>commutata</i> (Spreng.) Babcock	B	1120
ssp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Celak	K	1200
" <i>macropus</i> Boiss. & Heldr.	K	1400
" <i>pulchra</i> L.		
ssp. <i>pulchra</i>	BC	1120-1600
" <i>reuterana</i> Boiss.		
ssp. <i>reuterana</i>	D	1400
" <i>sancta</i> (L.) Babcock		
ssp. <i>sancta</i>	A C K	1300-1600
<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Vis.	K	1200
<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.	D	1500
<i>Echinops viscosus</i> DC.		
ssp. <i>bithynicus</i> (Boiss.) Rech. fil.	K	1200
<i>Filago pyramidata</i> L.	B	1120
<i>Helichrysum plicatum</i> DC.		
ssp. <i>plicatum</i>	D	1600-1700
ssp. <i>polyphyllum</i> (Ledeb.) Davis & Kupicha	D	1600
<i>Hieracium lasiochaetum</i> (Bornm. & Zahn) Sell & West	D	1400
" <i>pannosum</i> Boiss.	C	1600
" <i>phrygiense</i> Sell & West	D	1400-2100
" <i>pseudodontotrichum</i> Hub. - Mor.	D	1900
<i>Inula anatolica</i> Boiss.	K	1300
" <i>heterolepis</i> Boiss.	A	1500
" <i>oculus christi</i> DC.	AB D	1150-1500
<i>Jurinea consanguinea</i> DC.	DK	1300-1600
" <i>pontica</i> Hausskn. & Freyn ex Hausskn.	K	1300
<i>Jurinella moschus</i> (Habl.) Bobrov	D	2200
<i>Leontodon asperrimus</i> (Willd.) J. Ball	K	1300
" <i>crispus</i> Vill.		
ssp. <i>asper</i> (Waldst. & Kit.) Rohl.		
var. <i>asper</i>	K	1200
" <i>oxylepis</i> Boiss. & Heldr.		
var. <i>oxylepis</i>	CDK	1300-1600
<i>Leucocyclus formosus</i> Boiss.		
ssp. <i>formosus</i>	CD	1300-1800

COMPOSITAE (Forts.)			
<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	K		1300
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dum.	D		1400
<i>Onopordum acanthium</i> L.	D		1400
" <i>anatolicum</i> (Boiss.) Eig	K		1300
" <i>bracteatum</i> Boiss. & Heldr.	B K		1120-1300
<i>Picnemon acarna</i> (L.) Cass.	Y		1200
<i>Picris campylocarpa</i> Boiss. & Heldr.	A	Y	1300-1500
<i>Pilosella</i> x <i>auriculoides</i> (A.F. Lang) Sell & West	D	Y	1300-1400
" <i>cymosa</i> (L.) C.H. & F.W. Schultz	C		1500
" <i>hoppeana</i> (Schultes) C.H. & F.W. Schultz			
ssp. <i>cilicica</i> (NP.) Sell & West	D		1600
ssp. <i>troica</i> (Zahn) Sell & West	D		1600
" <i>piloselloides</i> (Vill.) Sojak			
ssp. <i>piloselloides</i>	D		1400
" x <i>ruprechtii</i> (Boiss.) Sell & West	D		1400-1600
<i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter			
ssp. <i>eburneus</i> Greuter	A		1500
<i>Rhagadiolus angulosus</i> (Jaub. & Spach) Kupicha		K	1200
<i>Scariola viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	A		1500
<i>Scorzonera cana</i> (C.A. Meyer) Hoffm.			
var. <i>alpina</i> (Boiss.) Chamberlain	D		2200
var. <i>cana</i>		Y	1200
" <i>eriophora</i> DC.	K		1200-1300
" <i>laciniata</i> L.			
ssp. <i>calcitrapifolia</i> (Vahl) Maire	K		1200
" <i>pygmaea</i> Sibth. & Sm.			
ssp. <i>pygmaea</i>	D		2000-2500
" <i>suberosa</i> C. Koch			
ssp. <i>cariensis</i> (Boiss.) Chamberlain	K		1300
" <i>tomentosa</i> L.	K		1400
<i>Senecio othonnae</i> Bieb.	D		1400
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill			
ssp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball	D		1400
<i>Steptorhamphus tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	K		1350
<i>Tanacetum argenteum</i> (Lam.) Willd.			
ssp. <i>argenteum</i>	D		1600-2000
" <i>armenum</i> (DC.) Schultz Bip.	CD		1600-2600
" <i>cadmeum</i> (Boiss.) Heywood			
ssp. <i>cadmeum</i>	CD		1600-2000
" <i>cilicicum</i> (Boiss.) Grierson	D		1400-1600
<i>Tragopogon latifolius</i> Boiss.			
var. <i>angustifolius</i> Boiss.	DKS		1200-1500
" <i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz			
var. <i>abbreviatus</i> Boiss.	K		1200

## COMPOSITAE (Forts.)

Tripleurospermum callosum (Boiss.)

E.Hossain

B	KS	1150-1200
D		1500

Tussilago farfara L.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis L.

C	S	1500
---	---	------

" galaticus Choisy

B		1150
---	--	------

" lineatus L.

C	Y	1300
---	---	------

Cuscuta epithymum (L.)Murray

K		1200
---	--	------

CORNACEAE

Cornus mas L.

A	D	1400-1500
---	---	-----------

CRASSULACEAE

Rosularia chrysantha (Boiss.)Tahkt.

D		1600
---	--	------

" libanotica (Lab.)Muirhead

B	D	1150-1600
---	---	-----------

Sedum album L.

A	D	1500
---	---	------

" dasyphyllum L.

D		1600
---	--	------

" hispanicum L.

var. hispanicum

D		1600
---	--	------

" laconicum Boiss.&amp; Heldr.

DK		1400-1600
----	--	-----------

" magellense Ten.

D		1600
---	--	------

" rubens L.

B		1150
---	--	------

" sartorianum Boiss.

ssp. sartorianum

K		1300
---	--	------

" sempervivoides Bieb.

A	DK	1300-1600
---	----	-----------

Sempervivum armenum Boiss.

D		1700
---	--	------

Umbilicus erectus DC.

D		1500
---	--	------

CRUCIFERAE

Aethionema arabicum (L.)Andrz.ex DC.

K		1200
---	--	------

" cordatum (Desf.)Boiss.

CDK		1300-2200
-----	--	-----------

" oppositifolium (Pers.)Hedge

D		2200-2500
---	--	-----------

" subulatum (Boiss.&amp; Heldr.)Boiss.

D		2200-2600
---	--	-----------

" thesiifolium Boiss.&amp; Heldr.

C		1300
---	--	------

Alyssum aurantiacum Boiss.

D		2000
---	--	------

" cephalotes Boiss.

D		1900
---	--	------

" condensatum Boiss.&amp; Hausskn.

ssp. condensatum

CD		1500-2000
----	--	-----------

ssp. flexibile (Nyár.)Dudley

C		1300-1500
---	--	-----------

" contemptum Schott &amp; Kotschy

CD		1500-2000
----	--	-----------

" desertorum Stapf

var. desertorum

BC	K	1150-1300
----	---	-----------

" hirsutum Bieb.

C		1300
---	--	------

" minus (L.)Rothm.

var. macranthum (Meyer)Dudley

A	C	KSY	1200-1500
---	---	-----	-----------

var. minus

AB		1150-1500
----	--	-----------

" mouradicum Boiss.&amp; Bal.

D		1600-2400
---	--	-----------

" murale Waldst.&amp; Kit.

ssp. murale

var. murale

K		1200
---	--	------

" pateri Nyár.

ssp. pateri

K		1300
---	--	------

CRUCIFERAE (Forts.)

Alyssum (Forts.)		
" praecox Boiss.& Bal.	C	1500-1800
" sibiricum Willd.	A	1500
" strigosum Banks & Sol. ssp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley	C K Y A KS C	1200-1500 1150-1500 1600
Anchonium elichrysifolium (DC.)Boiss. ssp. elichrysifolium	D	2400-2600
Arabis aubrietioides Boiss.	C	1600-2100
" caucasica Boiss. ssp. caucasica	C	1600-2100
" nova Vill.	C K	1300
Aubrieta canescens (Boiss.)Bornm. ssp. canescens	A D	1500-2400
" pinardii Boiss.	CDK	1400-1700
Barbarea minor C.Koch var. eriopoda Busch	D	1900
" plantaginea DC.	A	1500
Camelina rumelica Vel.	C K	1300-1400
Capsella bursa-pastoris (L.)Medik.	C	1300
Cardamine hirsuta L.	D	1300-1600
Cardaria draba (L.)Desv.	D	1400
Descurainia sophia (L.)Webb ex Prantl	S	1200
Draba bruniifolia Stev. ssp. heterocoma (Fenzl)Coode & Cullen	D	1600
var. heterocoma	CD	2100-2400
var. nana (Stapf)Schultz	C	1300
" huetii Boiss.	D	1400
" muralis L.		
Erophila verna (L.)Chevall. ssp. verna	A	1500
Erysimum crassipes Fisch.& Mey.	K	1200-1300
" goniocaulon Boiss.	A	1500
" kotschyanum Gay	D	1600-2400
" pulchellum (Willd.)Gay	CD	1500-2500
" repandum L.	K	1200
" smyrnaeum Boiss.& Bal.	A	1500
Euclidium syriacum (L.)R.Br.	B S	1150-1200
Fibigia eriocarpa (DC.)Boiss.	C	1600
Hesperis bicuspidata (Willd.)Poiret	D	1600-1700
" kotschy Boiss.	K	1300

<b>CRUCIFERAE (Forts.)</b>		
<i>Iberis sempervirens</i> L.	CD	1300-2000
<i>Isatis glauca</i> Aucher ex Boiss. ssp. <i>glauca</i>	A	1100
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	S	1200
<i>Matthiola longipetala</i> (Vent.) DC. ssp. <i>bicornis</i> (Sibth. & Sm.) P.W. Ball	KS	1200-1400
" <i>montana</i> Boiss.	D	2200-2600
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	B	1200
<i>Rorippa aurea</i> (Boiss. & Heldr.) Hub.-Mor. " <i>sylvestre</i> (L.) Bess.	B D	1150 1300
<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	B KS	1150-1200
<i>Thlaspi kotschyannum</i> Boiss. & Hohen. " <i>papillosum</i> Boiss. " <i>perfoliatum</i> L. " <i>violascens</i> Boiss.	D D CD D	1900 2200-2500 1300-1400 1500
<i>Turritis laxa</i> (Sibth. & Sm.) Hayek	D	1400-1500
<b><u>CUCURBITACEAE</u></b>		
<i>Bryonia multiflora</i> Boiss. & Heldr.	C	1300
<b><u>CUPRESSACEAE</u></b>		
<i>Juniperus excelsa</i> Bieb. " <i>foetidissima</i> Willd. " <i>oxycedrus</i> L. ssp. <i>oxycedrus</i>	A CD BC K  B K Y	1200-1600 1150-1300  1150-1400
<b><u>CYPERACEAE</u></b>		
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer	A	1500
<i>Carex divulsa</i> Stokes " <i>hirta</i> L. " <i>otrubae</i> Podžera	 D D	Y 1300 1400 1400
<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek " <i>mamillata</i> Lindb. fil.	B D	1150 1300
<i>Scirpus maritimus</i> L. " <i>setaceus</i> L.	B A	1120 1500
<b><u>DIPSACACEAE</u></b>		
<i>Cephalaria dipsacoides</i> Boiss. & Bal. " <i>syriaca</i> (L.) Schrader	A B K	1500 1150-1250
<i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bert. var. <i>integrifolia</i>	A	1000
<i>Pterocephalus pinardii</i> Boiss. " <i>plumosus</i> (L.) Coulter	C K	1400 1300

DIPSACACEAE (Forts.)

<i>Scabiosa argentea</i> L.	K	1200
" <i>columbaria</i> L.		
ssp. <i>ochroleuca</i> (L.) Čelak.	D	1500-1600
var. <i>webbiana</i> (Don) Matthews		
" <i>rotata</i> Bieb.	B	1250

EPHEDRACEAE

<i>Ephedra major</i> Host	AB	1250-1500
---------------------------	----	-----------

EQUISETACEAE

<i>Equisetum arvense</i> L.	D	1400
-----------------------------	---	------

EUPHORBIACEAE

<i>Andrachne telephioides</i> L.	A K	1300-1500
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Raf.	B	1200
<i>Euphorbia anacampseros</i> Boiss.		
var. <i>anacampseros</i>	K	1400
" <i>cardiophylla</i> Boiss. & Heldr.	D Y	1300-1400
" <i>chamaesyce</i> L.	A	1500
" <i>eriphora</i> Boiss.	B	1200
" <i>falcata</i> L.		
ssp. <i>falcata</i>		
var. <i>falcata</i>	DK	1150-1400
" <i>helioscopia</i> L.	C	1300
" <i>herniariifolia</i> Willd.		
var. <i>glaberrima</i> Hal.	D	2200-2400
var. <i>herniariifolia</i>	A C	1500-1700
" <i>kotschyana</i> Fenzl	A K	1200-1500
" <i>macroclada</i> Boiss.	B K	1200-1300
" <i>microsphaera</i> Boiss.	B	1150
" <i>seguieriana</i> Necker		
ssp. <i>seguieriana</i>	B K	1150-1300
" <i>stricta</i> L.	AB D	1200-1500
" <i>szovitsii</i> Fisch. & Mey.		
var. <i>szovitsii</i>	DK	1150-1400
<i>Mercurialis ovata</i> Sternb. & Hoppe	D	1400

FAGACEAE

<i>Quercus cerris</i> L.	AB Y	1150-1500
" <i>infectoria</i> Oliv.		
ssp. <i>infectoria</i>	A Y	1200-1300
" <i>macrolepis</i> Kotschy	B	1150
" <i>pubescens</i> Willd. x <i>cerris</i> L.	D	1300
" <i>trojana</i> Webb.	C K Y	1200-1400

FILICALES

<i>Asplenium ruta muraria</i> L.	A CD	1500-1600
" <i>trichomanes</i> L.	A D	1500-1700
<i>Ceterach officinarum</i> DC.	A C Y	1300-1600
<i>Cheilanthes persica</i> (Bory) Kuhn	A	1500
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	A CD	1500-1800
<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Fomin	AB D Y	1150-1800

<u>FILICALES (Forts.)</u>		
Polystichum aculeatum (L.) Roth	D	1500-1800
<u>GERANIACEAE</u>		
Erodium amanum Boiss. & Kotschy	C K	1500-1800
" cicutarium (L.) L'Hérit.		
ssp. cicutarium	Y	1200
Geranium cinereum Cav.		
ssp. subcaulescens (L'Hérit. ex DC.) Hayek		
var. subcaulescens	D	1900-2200
" glaberrimum Boiss. & Heldr.	CD	1600
" lasiopus Boiss. & Heldr.	D	1600-1700
" lucidum L.	AB D	1120-1600
" purpureum Vill.	B	1120
" pusillum Burm. fil.	D	1700
" pyrenaicum Burm. fil.	A CD	1500-1600
" robertianum L.	D	1500
Pelargonium endlicherianum Fenzl	A C	1300-1500
<u>GLOBULARIACEAE</u>		
Globularia orientalis L.	K	1400
" trichosantha Fisch. & Mey.	CD	1700
<u>GRAMINEAE</u>		
Aegilops cylindrica Host	K	1200
" triunciales L.	K	1300
" umbellulata Zhuk.	K	1300
Agropyron divaricatum Boiss. & Bal.	K	1300
Alopecurus lanatus Sibth. & Sm.	D	2200-2400
Andropogon gryllus L.	K	1300
Avena barbata Pott	K	1300
Briza spicata Sibth. & Sm.	K	1300
Bromus scoparius L.	K	1150
" squarrosus L.	K	1300
" sterilis L.	C	1300
" tectorum L.	K	1300
" tomentellus Boiss.	DK	1300-1700
Echinaria capitata (L.) Desf.	K	1300
Eremopoa persica (Trin.) Rozhev.	D	1500
Festuca vallesiaca Gaudin	C K	1300-1700
Gaudinopsis macra (M.B.) Eig	K	1300
Hordeum murinum L.	B	1150
Koeleria glaucovirens Domin	K	1200

GRAMINEAE (Forts.)

<i>Melica ciliata</i> L.		
var. <i>tomentella</i> Boiss.	K	1400
" <i>penicillaris</i> Boiss. & Bal.	K	1300
<i>Milium vernale</i> Bieb.	D	1400
<i>Phleum graecum</i> Boiss. & Heldr.	K	1300
<i>Poa alpina</i> L.	D	2200
" <i>bulbosa</i> L.	K	1200
" <i>pratensis</i> L.	C	1600
<i>Stipa ehrenbergiana</i> Trin. & Rupr.	K	1300
" <i>holosericea</i> Trin.	D	1600
<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski	K	1200

GUTTIFERAE

<i>Hypericum aviculariifolium</i> Jaub. & Spach		
ssp. <i>depilatum</i> (Freyn & Bornm.) Robson		
var. <i>depilatum</i>	C K	1300-1600
ssp. <i>uniflorum</i> (Boiss. & Heldr.) Robson	D	1700
" <i>confertum</i> Choisy	CD	1600
" <i>elongatum</i> Ledeb.		
var. <i>elongatum</i>	C	1500
" <i>perforatum</i> L.	A D	1200-1500
" <i>scabrum</i> L.	K Y	1200-1300
" <i>sparsipunctatum</i> Robson	C	1600
" <i>tetrapterum</i> Fries.	D	1400

HALORAGIDACEAE

<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	B	1100
---------------------------------	---	------

ILLECEBRACEAE

<i>Herniaria glabra</i> L.	A D	1250-1400
" <i>hirsuta</i> L.	A	1500
" <i>incana</i> Lam.	A DK	1400

*Paronychia anatolica* Czeaczott

ssp. <i>anatolica</i>	K	1300
" <i>carica</i> Chaudhri		
var. <i>stipulata</i> Chaudhri	K	1300
" <i>chionaea</i> Boiss.	A D	1150-1400

*Scleranthus annuus* L.

ssp. <i>annuus</i>	A	1500
ssp. <i>polycarpus</i> (L.) Thell.	D	1600

IRIDACEAE

<i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl.	B	1200
------------------------------------	---	------

*Iris persica* L.

" <i>pseudacorus</i> L.	B K	1300
-------------------------	-----	------

JUNCACEAE

<i>Juncus bufonius</i> L.	B	1130
" <i>inflexus</i> L.	B	1130

*Luzula forsteri* (Sm.) DC.

	D	1300
--	---	------

LABIATAE

<i>Acinos rotundifolia</i> Pers.	D Y	1400
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. ssp. <i>chia</i> (Schreb.) Arcangeli	C K	1200-1600
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	CD Y	1300-1500
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	C	1200
" <i>glandulosodentatum</i> Hub.-Mor.	D	2200-2400
" <i>garganicum</i> L. ssp. <i>garganicum</i>	CD	1500
<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq. ssp. <i>macrodon</i> (Bornm.) P.H. Davis	CD	1500-1600
" <i>globosum</i> Montbr. & Auch.	CD	1700-1800
" <i>lutescens</i> Boiss.	C	1500-1700
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	D	1400
<i>Nepetha cilicica</i> Boiss.	D	1600
" <i>nuda</i> L. ssp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams	CD	1300-1800
<i>Origanum onites</i> L.	B	1150
" <i>vulgare</i> L.	D	1400
<i>Phlomis armeniaca</i> Willd.	CDK	1300-1600
" <i>grandiflora</i> H.S. Thompson	B	1150
" <i>herba-venti</i> L. ssp. <i>pungens</i> (Willd.) Maire ex De Philipps	C K	1250
" <i>nissolii</i> L.	B K	1150
" <i>samia</i> L.	Y	1300
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	D	1400
" <i>vulgaris</i> L.	A	1500
<i>Salvia bracteata</i> Banks & Sol.	K	1300
" <i>cadmica</i> Boiss.	C K	1300-1600
" <i>candidissima</i> Vahl	A	1200
" <i>ceratophylla</i> L.	K	1300
" <i>cryptantha</i> Montbr. & Auch.	K	1300
" <i>frigida</i> Boiss.	CD	1500-1600
" <i>grandiflora</i> Etlinger	A D Y	1300-1500
" <i>pisidica</i> Boiss. & Heldr.	K	1300
" <i>sclarea</i> L.	K Y	1200
" <i>syriaca</i> L.	K	1200
" <i>verticillata</i> L.	C	1600
" <i>virgata</i> Jacq.	K	1300
<i>Scutellaria albida</i> L. ssp. <i>albida</i>	D	1600
" <i>orientalis</i> L. ssp. <i>alpina</i> (Boiss.) O. Schwarz	D	1600
" <i>salviifolia</i> Benth.	Y	1300

## LABIATAE (Forts.)

*Sideritis libanotica* Lab.

ssp. <i>linearis</i> (Benth.) Bornm.	D	1600
" <i>montana</i> L.	K	1300
" <i>remota</i> D'Urv.	K	1300

*Stachys citrina* Boiss. & Heldr.

ssp. <i>citrina</i>	D	1600-2200
" <i>cretica</i> L.		
ssp. <i>anatolica</i> Rech. fil.	DK	1300-1400
" <i>germanica</i> L.		
ssp. <i>bithynica</i> (Boiss.) Bhattacharjee	D	1600
" <i>iberica</i> Bieb.		
ssp. <i>iberica</i>		
var. <i>densipilosa</i> Bhattacharjee	D	1500
" <i>lavandulifolia</i> Vahl		
var. <i>lavandulifolia</i>	D	1600
" <i>pseudosideritis</i> Bhattacharjee & Hub.-Mor.	B Y	1150-1300

*Teucrium chamaedris* L.

" <i>lamifolium</i> D'Urv.	B K	1200
" <i>montanum</i> L.	D	1600
" <i>orientale</i> L.	D	1700
" <i>scordium</i> L.	D	1600
ssp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Maire & Petitm.	A	1500

*Thymus glabrescens* Willd.

ssp. <i>urunovii</i> (Vel.) Jalas	C	2100
" <i>ocheus</i> Heldr. & Sart. ex Boiss.	D	1500
" <i>sipyleus</i> Boiss.	CDK	1200-2000
" <i>zygioides</i> Griseb.	K	1300

*Wiedemanniana orientalis* Fisch. &

C.A. Meyer

<i>Ziziphora capitata</i> L.	C	1300
" <i>tenuior</i> L.	K	1200
	C Y	1300

LEGUMINOSAE*Adenocarpus complicatus* (L.) Gay

A	1200
---	------

*Anthyllis vulneraria* L.

ssp. <i>pulchella</i> (Vis.) Bornm.	CD	1600-2100
-------------------------------------	----	-----------

*Astragalus acmonotrichus* Fenzl

C	1800
---	------

" *angustifolius* Lam.ssp. *angustifolius*var. *angustifolius*

A DK Y	1300-2200
B	1150

ssp. *pungens* (Willd.) Hayek" *brachypterus* Fischer

D	1400
---	------

" *depressus* L.

D	1600
---	------

" *hamosus* L.

B	1120
---	------

" *hirsutus* Vahl

CDK	1400-2200
-----	-----------

" *micropterus* Fischer

K	1300
---	------

" *odoratus* Lam.

B	1120
---	------

" *onobrychis* L.

CD	1400-1700
----	-----------

" *oxytropifolius* Boiss.

C K	1300-1600
-----	-----------

## LEGUMINOSAE (Forts.)

## Astragalus (Forts.)

" paecilanthus Boiss.& Heldr.	CD	1600-1700
" parnassi Boiss.	D	1600
" sorgerae Hub.-Mor.& Chamberlain	D	1600-1800
" vulnerariae DC.	K	1200
" warburgii Bornm.	D	1600
" wiedemannianus Fischer	C	1400-1600

Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.) Rothm.	D	1600-1700
--	---	-----------

Colutea melanocalyx Boiss.& Heldr.		
ssp. davisiana (Browicz) Chamb.	D	1400

Coronilla emerus L.		
ssp. emeroides (Boiss.& Sprun.) Uhrova	A	1500
" varia L.		
ssp. varia	CD	1300-1400

Dorycnium pentaphyllum Scop.		
ssp. haussknechtii (Boiss.) Gams	C	1200

Glycyrrhiza glabra L.		
var. glandulifera (Waldst.& Kit.) Boiss.	B	1200

Lathyrus aphaca L.		
var. affinis (Guss.) Arc.	D	1400
" chloranthus Boiss.	S	1200
" czeczottianus Bässler	C	1600
" digitatus (Bieb.) Fiori	C	1500
" inconspicuus L.	C S	1200-1300
" laxiflorus (Desf.) O.Kuntze		
ssp. laxiflorus	D Y	1400-1500
" pratensis L.	D	1300-1400

Lotononis genistoides (Fenzl) Benth.	K	1200
--------------------------------------	---	------

Lotus aegaeus (Gris.) Boiss.	DK	1200-1500
" corniculatus L.		
var. alpinus Ser.	D	1400
var. tenuifolius L.	A C	1300-1500

Medicago lupulina L.	A D	1300-1500
" minima (L.) Bart.		
var. minima	B K	1150-1200
" noeana Boiss.	Y	1200
" radiata L.	K	1200
" rigidula (L.) All.		
var. cinerascens (Jord.) Rouy	B K	1150-1200
var. rigidula	B K	1150-1200
var. submitis (Boiss.) Heyn	B	1120

Onobrychis cornuta (L.) Desv.	CD	1600-2200
" gracilis Besser	K	1200
" montana DC.		
ssp. cadmea (Boiss.) P.W. Ball	D	1600-2100

## LEGUMINOSAE (Forts.)

<i>Ononis pusilla</i> L.	Y	1300
" <i>spinosa</i> L.	K	1300
<i>Trifolium arvense</i> L.		
var. <i>arvense</i>	B	1120
" <i>caudatum</i> Boiss.	CD	1600-1700
" <i>hybridum</i> L.		
var. <i>hybridum</i>	D	1400
" <i>lucanicum</i> Gasp.	AB	1120-1500
" <i>nigrescens</i> Viv.	B	1120
" <i>ochroleucum</i> Huds.	D	1600
" <i>pannonicum</i> Jacq.		
ssp. <i>elongatum</i> (Willd.) Zoh.	C	1500-1700
" <i>phleoides</i> Pourr. ex Willd.	C	1500
" <i>repens</i> L.		
var. <i>repens</i>	A	1500
" <i>resupinatum</i> L.		
var. <i>resupinatum</i>	B	1120
" <i>speciosum</i> Willd.	B	1120
<i>Trigonella fischeriana</i> Ser.	C S	1200-1400
" <i>lunata</i> Boiss.	K	1200
" <i>monantha</i> C.A. Meyer		
ssp. <i>monantha</i>	B K	1200
" <i>monspeliaca</i> L.	B K	1120-1200
" <i>procumbens</i> (Besser) Reichb.	C Y	1200-1300
" <i>spruneriana</i> Boiss.		
ssp. <i>spruneriana</i>	C K	1200-1300
" <i>tenuis</i> Fisch.	BC	1150-1600
" <i>velutina</i> Boiss.	C K Y	1200-1400
<i>Vavilovia formosa</i> (Stev.) A. Fed.	D	2200
<i>Vicia cracca</i> L.		
ssp. <i>atroviolacea</i> (Bornm.) Davis	D	1500
ssp. <i>stenophylla</i> Vel.	C	1600
" <i>narbonensis</i> L.		
var. <i>narbonensis</i>	C	1500
" <i>pannonica</i> Crantz		
var. <i>pannonica</i>	C	1300
" <i>peregrina</i> L.	A	1100
" <i>truncatula</i> Fischer ex Bieb.	D	1500

LILIACEAE

<i>Allium cassium</i> Boiss.		
var. <i>hirtellum</i> Boiss.	D	1600
" <i>rotundum</i> L.	D	1600
" <i>stylosum</i> O. Schwarz	K	1300
<i>Asphodeline rigidifolia</i> Boiss.	K	1200
" <i>taurica</i> Pall.	DK	1300-1600
<i>Colchicum speciosum</i> Steven	D	1500
<i>Fritillaria cilicico-taurica</i> Hausskn. & Bornm.	D	1600
" <i>crassifolia</i> Boiss. & Huet	D	2200

<u>LILIACEAE (Forts.)</u>		
Muscari comosum (L.) Mill.	C	1600
" neglectum Guss.		
var. pulchellum Heldr. & Sart.	D	2200-2400
" racemosum (L.) Mill.	C	1800
Ornithogalum fimbriatum Willd.	CD	1600-1800
" montanum Cyr.	C	1400
" narbonense L.	B	1150
" oligophyllum Clarke	D	1500-1600
" pyrenaicum L.	K	1300
Polygonatum polyanthemum (M.B.) Dietr.	D	1500
Scilla nivalis Boiss. - Aggregat	D	2200
Tulipa undulatifolia Boiss.	C	1600
<u>LINACEAE</u>		
Linum obtusatum (Boiss.) Stapf	D	1900
<u>MALVACEAE</u>		
Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss.	A	1100
" pallida Waldst. & Kit.	B	1150
" pisidica Hub.-Mor.	A	950
Althaea officinalis L.	B	1150
Malva neglecta Wallr.	CD	1400
" sylvestris L.	B	1150
<u>NAJADACEAE</u>		
Najas marina L.	B	1110
<u>NYMPHAEACEAE</u>		
Nuphar lutea (L.) Sm.	B	1116
Nymphaea alba L.	B	1116
<u>OLEACEAE</u>		
Fraxinus oxycarpa Willd.	C	1300
Jasminum fruticans L.	K	1300
<u>ONAGRACEAE</u>		
Epilobium angustifolium L.	D	1400
" lanceolatum Seb. & Mauri	D	1500
" parviflorum Schreber	D	1400
<u>ORCHIDACEAE</u>		
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich.	Y	1300
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.	D	1400
Cephalanthera rubra (L.) Rich.	D	1400
Dactylorhiza iberica (M.B. ex Willd.) Soó	D	1400

<u>ORCHIDACEAE (Forts.)</u>		
<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	B	1120
" <i>pallens</i> L.	D	1400
" <i>palustris</i> Jacq.	B	1200
<u>OROBANCHACEAE</u>		
<i>Anoplon coccineum</i> (M.B.)H.Riedl & Schimon-Czeika	C	1500
<i>Orobanche alba</i> Steph.		
var. <i>wiedemannii</i> (Boiss.)G.Beck	D	1500
" <i>cilicica</i> G.Beck	D	1500
" <i>fuliginosa</i> Reuter		
var. <i>fuliginosa</i>	D	1600
<u>PAEONIACEAE</u>		
<i>Paeonia mascula</i> (L.)Miller		
ssp. <i>mascula</i>	D	1400
<u>PAPAVERACEAE</u>		
<i>Fumaria asepala</i> Boiss.	C	1300
" <i>parviflora</i> Lam.	S	1200
<i>Hypecoum imberbe</i> Sibth.& Sm.	C K	1300
" <i>pendulum</i> L.	C	1300
<i>Papaver apokrinomenon</i> Fedde	CD	1600-1700
" <i>argemone</i> L.	B	1150
" <i>dubium</i> L.	BCD	1400-1600
" <i>rhoeas</i> L.	K	1300
<u>PINACEAE</u>		
<i>Abies cilicica</i> (Ant.& Kotschy)Carr.		
ssp. <i>isaurica</i> Coode & Cullen	Y	1300
<i>Cedrus libani</i> A.Rich.	C	1550
<i>Pinus nigra</i> Arn.		
ssp. <i>pallasiana</i> (Lamb.)Holmboe	D Y	1300-1500
<u>PLANTAGINACEAE</u>		
<i>Plantago holosteum</i> Scop.		
var. <i>depauperata</i> (Godr.)Pilger	D	1800
" <i>lanceolata</i> L.	D	1400
" <i>major</i> L.		
ssp. <i>intermedia</i> (DC.)Arcangeli	A	1500
<u>PLUMBAGINACEAE</u>		
<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.)Boiss.	K	1300
" <i>lycaonicum</i> Boiss.& Heldr.	D	1600-2200
<i>Plumbago europaea</i> L.	C	1400
<u>POLYGALACEAE</u>		
<i>Polygala pruinosa</i> Boiss.		
ssp. <i>megaptera</i> Cullen	DK	1300-1900

POLYGONACEAE

<i>Atraphaxis billardieri</i> Jaub.& Spach	K	1200
<i>Polygonum amphibium</i> L.	B	1116
" <i>aviculara</i> L.	A	1500
" <i>bellardii</i> All.	D	1300
" <i>cognatum</i> Meissn.	K	1200
" <i>convolvulus</i> L.	D	1400
<i>Rumex acetosella</i> L.	D	1400-1600
" <i>angustifolia</i> Campd.		
ssp. <i>angustifolia</i>	D	1800
" <i>conglomeratus</i> Murray	A	1500
" <i>nepalensis</i> Sprengel	D	1400
" <i>pulcher</i> L.	B K	1200-1300
" <i>remotiflorus</i> Samuelsson		
(= <i>R.crispus</i> L. x <i>R.nepalensis</i> Sprengel)	D	1400
" <i>scutatus</i> L.	A	1500

POTAMOGETONACEAE

<i>Potamogeton crispus</i> L.	B	1115
" <i>lucens</i> L.	B	1115

PRIMULACEAE

<i>Androsacae maxima</i> L.	S	1300
" <i>villosa</i> L.		
ssp. <i>congesta</i>	D	2200-2400
<i>Lysimachia atropurpurea</i> L.	A	1500
" <i>vulgaris</i> L.	B	1150
<i>Primula vulgaris</i> Hudson	D	1500

PYROLACEAE

<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz	D	1400
---------------------------------	---	------

RANUNCULACEAE

<i>Adonis aestivalis</i> L.		
ssp. <i>aestivalis</i>	C	1300
" <i>flammea</i> Jacq.	K	1200
<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers.	C	1300
" <i>testiculatus</i> (Crantz) Roth	C	1500
<i>Consolida aconiti</i> (L.) Lindley	S	1150
" <i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater	K	1200-1300
" <i>orientalis</i> (Gay) Schröd.	BC	1130-1300
" <i>raveyi</i> (Boiss.) Schröd.	K	1200
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	D	1500
<i>Nigella arvensis</i> L.		
var. <i>glauca</i> Boiss.	KS	1200
" <i>nigellastrum</i> L.	K	1200

## RANUNCULACEAE (Forts.)

<i>Ranunculus arvensis</i> L.	B S	1200
" <i>brevifolius</i> Ten.	D	2300-2500
" <i>brutius</i> Ten.	D	1200-1500
" <i>constantinopolitanus</i> (DC.)D'Urv.	D	1300-1400
" <i>demissus</i> DC.	D	2200-2500
" <i>sceleratus</i> L.	B	1150
" <i>sericeus</i> Banks & Sol.	B D	1150-1300
" <i>sphaerospermus</i> Boiss.& Blanche	B	1120
" <i>sprunerianus</i> Boiss.	CD	1500-1700

<i>Thalictrum flavum</i> L.	A	1500
-----------------------------	---	------

RESEDACEAE

<i>Reseda lutea</i> L.		
var. <i>lutea</i>	B	1200
" <i>luteola</i> L.	B K	1200

RHAMNACEAE

<i>Rhamnus nitidus</i> Davis	D	1400
" <i>oleoides</i> L.		
ssp. <i>graecus</i> (Boiss.& Reut.)Holmboe	D	1700
" <i>rhodopeus</i> Velenovsky	A C K	1200-1500

ROSACEAE

<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Y	1300
<i>Alchemilla mollis</i> (Buser)Rothm.	D	1400-1500
<i>Amelanchier parviflora</i> Boiss.		
var. <i>parviflora</i>	K	1300
" <i>rotundifolia</i> (Lam.)Dum.-Courset		
ssp. <i>integrifolia</i> (Boiss.& Hohen.)		
Browicz	C	1300-1600
ssp. <i>rotundifolia</i>	A K	1300-1500
<i>Amygdalus x balansae</i> Boiss.	K	1200
(= <i>A.communis</i> x <i>A.orientalis</i> )		
" <i>orientalis</i> Miller	K	1200-1300
" <i>webbii</i> Spach	K	1300-1400
<i>Aphanes arvensis</i> L.	B	1120
<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.)DC.		
ssp. <i>agrimonoides</i>	D	1140-1500
<i>Cerasus prostrata</i> (Lab.)Ser.		
var. <i>prostrata</i>	A CD	1300-1900
<i>Cotoneaster nummularia</i> Fisch.& Mey.	DK	1200-1700
<i>Crataegus aronia</i> (L.)Bosc.ex DC.		
var. <i>aronia</i>	K	1200
var. <i>minuta</i> Browicz	K	1300
<i>Geum urbanum</i> L.	CD	1500-1600
<i>Malus sylvestris</i> Miller		
ssp. <i>orientalis</i> (A.Uglitzkich)Browicz	D	1400

ROSACEAE (Forts.)

<i>Orthurus heterocarpus</i> (Boiss.)Juz.	C	1600
<i>Potentilla kotschyana</i> Fenzl	CD	1500-1700
" <i>recta</i> L.	DK	1300
" <i>reptans</i> L.	AB D	1150-1500
" <i>speciosa</i> Willd.		
var. <i>discolor</i> Hal.	D	1600-2000
<i>Pyrus communis</i> L.		
ssp. <i>communis</i>	B	1130
<i>Rosa canina</i> L.	DK	1200-1400
" <i>pulverulenta</i> Bieb.	D	1400-1800
<i>Rubus canescens</i> DC.		
var. <i>canescens</i>	D	1500
" <i>sanctus</i> Schreber	D	1300-1600
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		
ssp. <i>muricata</i> (Spach)Briq.	A CD	1200-1700
<i>Sorbus umbellata</i> (Desf.)Fritsch		
var. <i>cretica</i> (Lindley)Schneider	D	1400-1500

RUTACEAE

<i>Haplophyllum buxbaumii</i> (Poir.)G.Don		
ssp. <i>buxbaumii</i>	K	1300
" <i>pumiliforme</i> Hub.-Mor.& Reese	Y	1300

SALICACEAE

<i>Populus tremula</i> L.	D	1300
<i>Salix cinerea</i> L.	D	1400

SANTALACEAE

<i>Thesium brachyphyllum</i> Boiss.	D	1800
" <i>humile</i> Vahl	Y	1300

SAXIFRAGACEAE

<i>Saxifraga exarata</i> Vill.		
var. <i>adenophora</i> (C.Koch)Engler & Irmscher	D	1600

SCROPHULARIACEAE

<i>Bungea trifida</i> (Vahl)C.A.Mey.	K	1300
<i>Celsia sorgerae</i> Hub.-Mor.	C	1700
<i>Digitalis cariensis</i> Boiss.	A	1500
" <i>davisiana</i> Heywood	D	1500
<i>Gratiola officinalis</i> L.	B	1120
<i>Linaria corifolia</i> Desf.	S	1200
" <i>grandiflora</i> Desf.	C	1600
" <i>genistifolia</i> (L.)Mill.		
ssp. <i>confertiflora</i> (Boiss.)Davis	B D	1150-1600

## SCROPHULARIACEAE (Forts.)

## Linaria (Forts.)

" simplex (Willd.)DC.	C	1600
Microrrhinum minus (L.)Fourr. - Aggregat	A D	1400-1500
Pedicularis cadmea Boiss.	CD	2100-2200
" comosa L.		
var. sibthorpii (Boiss.)Boiss.	B	1130
Rhynchocorys elephas (L.)Griseb.	D	1400
Scrophularia canina L.		
ssp. bicolor (Sibth.& Sm.)Greuter	A	1500
" catariifolia Boiss.& Heldr.	D	1500
" cryptophila Boiss.& Heldr.	A C	1500-1800
" scopolii (Hoppe ex)Pers.		
var. scopolii	CD	1600
Staurophragma natolicum Fisch.& Mey.	K	1300-1500
Verbascum adenocarpum Hub.-Mor.	C	1600
" blattaria L.	B	1130
" cheiranthifolium Boiss.		
var. heldreichii Boiss.	D	1500-1600
var. pisidicum (Boiss.& Heldr.)Murb.	C	1600
" glomeratum Boiss.	B	1150
" glomerulosum Hub.-Mor.	A	1150
" lasianthum Boiss.	A	1500
" myriocarpum Boiss.& Heldr.	A	1500
" phrygium Bornm.	S	1300
" salviifolium Boiss.	K	1300
Veronica acinifolia L.	A	1500
" aleppica Boiss.	Y	1300
" anagallis-aquatica L.	A	1500
" arvensis L.	CD	1300-1500
" beccabunga L.	A	1500
" biloba L.	C	1300-1600
" bornmuelleri Hausskn.	C	1600
" bozakmanii M.A.Fischer	K	1300
" caespitosa Boiss.	C	2100
" cuneifolia D.Don		
ssp. cuneifolia	CD	1600-1800
ssp. isaurica P.H.Davis	D	2000
" dichrus Schott & Kotschy	CD	1600-2000
" hederifolia L.	C K	1300-1600
" lysimachoides Boiss.	D	1600
" multifida L.	CD	1500
" thymoides P.H.Davis		
ssp. hasandagliensis M.A.Fischer	C	2100
ssp. pseudocinerea M.A.Fischer	D	2000
" triloba (Opiz)Kerner	C	1400

SOLANACEAE

## Solanum nigrum L.

ssp. schultesii (Opiz)Wessely	A	1500
-------------------------------	---	------

THYMELAEACEAE

<i>Daphne oleoides</i> Schreber	CD	1600
---------------------------------	----	------

TILIACEAE

<i>Tilia cordata</i> Mill.	D	1400
----------------------------	---	------

ULMACEAE

<i>Celtis glabrata</i> Stev.	C	1300
" <i>tournefortii</i> Lam.	K	1300

<i>Ulmus glabra</i> Hudson	D	1600
----------------------------	---	------

UMBELLIFERAE

<i>Actinolema macrolema</i> Boiss.	B S	1200
------------------------------------	-----	------

<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	C	1300
--	---	------

<i>Astrantia maxima</i> Pall.		
ssp. <i>haradjianii</i> (Grintz.) Rech. fil.	D	1400-1500

<i>Bunium ferulaceum</i> Sm.	C	1600
------------------------------	---	------

" <i>microcarpum</i> (Boiss.) Freyn		
ssp. <i>bourgaei</i> (Boiss.) Hedge & Lamond	CD	1400-1600
ssp. <i>microcarpum</i>	DK	1600-1900

<i>Bupleurum croceum</i> Fenzl		S 1200
--------------------------------	--	--------

" <i>heldreichii</i> Boiss. & Bal.	A	1000
------------------------------------	---	------

" <i>sulphureum</i> Boiss. & Bal.		K 1300
-----------------------------------	--	--------

<i>Caucalis platycarpus</i> L.		S 1200
--------------------------------	--	--------

<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	D	1400
--------------------------------	---	------

<i>Daucus carota</i> L.	B	1200
-------------------------	---	------

<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan		
ssp. <i>heldreichii</i> (Boiss.) Davis	D	1500-2000

" <i>campestre</i> L.		
var. <i>virens</i> Link	K	1300

<i>Ferulago trachycarpa</i> Boiss.	A D	1500-1600
------------------------------------	-----	-----------

<i>Johrenia tortuosa</i> (Fisch. & Mey.) Chamberlain	A	1500
---	---	------

<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	D	1400-1500
-----------------------------------	---	-----------

<i>Laserpitium petrophilum</i> Boiss. & Heldr.	D	1600-1700
--	---	-----------

<i>Malabaila secacul</i> Banks & Sol.	K	1300-1400
---------------------------------------	---	-----------

<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	B	1130
--------------------------------------	---	------

" <i>silaifolia</i> Bieb.	B	1120
---------------------------	---	------

<i>Peucedanum chryseum</i> (Boiss. & Heldr.) Chamberlain	A	1250
---	---	------

<i>Scandix macrorhyncha</i> C.A. Meyer	CD	1500-1600
--	----	-----------

" <i>stellata</i> Banks & Sol.	CDK	1300-1600
--------------------------------	-----	-----------

UMBELLIFERAE (Forts.)*Seseli gummiferum* Pallas ex Sm.ssp. *corymbosum* (Boiss. & Heldr.)

Davis

A 1500

*Smyrniurn connatum* Boiss. & Kotschy

C 1600

*Torilis leptophylla* (L.) Reichb.

A C K Y 1200-1500

" *ucranica* Sprengel

D 1300

*Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.

S 1200

*Turgeniopsis foeniculacea* (Fenzl) Boiss.

D 1500

*Xanthogalum purpurascens* Lallem.

D 1400-1500

URTICACEAE*Parietaria ramiflora* Moench

B 1200

VALERIANACEAE*Valeriana officinalis* L.

D 1400

*Valerianella carinata* Lois.

D 1400

" *coronata* (L.) DC.

K 1200

" *orientalis* (Schlecht.) Boiss. & Bal.

B 1150

" *vesicaria* (L.) Moench

K 1300

VIOLACEAE*Viola gracilis* Sibth. & Sm.

D 1800

" *kitaibeliana* Roem. & Schult.

C 1600

" *occulta* Lehm.

C 1300

" *odorata* L.

C 1600

" *sieheana* Becker

A 1500

Nachtrag zu CARYOPHYLLACEAE : siehe Seite 100*Dianthus cyri* Fisch. & Mey.

K 1120

" *elegans* D'Urv.var. *actinopetalus* (Fenzl) Reeve

D 1600

var. *elegans*

D 1700-1800

" *leucophaeus* Sibth. & Sm.var. *patens* Reeve

D 2000-2400

" *lydus* Boiss.

C 1500

" *micranthus* Boiss.

DK 1400-1600

" *zonatus* Fenzlvar. *hypochlorus* (Boiss. & Heldr.)

Reeve

2000-2200

var. *zonatus*

DK 1300-1600

Anschrift des Verfassers:

Dr. Friederike Sorger

Uetzgasse 15

A-1100 WIEN

Kuru Tepe  
Steppenhügel



Beyşehirsee  
NW Ende



*Iris pseudacorus*  
Schnitter





Beyşehirsee  
West Ufer  
*Juniperus*  
*foetidissima* -  
Wald



Beyşehirsee  
West Ufer



Çiçek Dağları  
*Juniperus*  
*excelsa*-  
*Cedrus libani*  
Waldrand

Dedegöl Dağ



*Epilobium*  
*angustifolium*  
und  
*Tanacetum*  
*cilicicum*



Dedegöl Dağ  
*Pinus pallasiana*





Dedegöl Dağ



*Jurinella*  
*moschus*  
und  
*Androsacae*  
*villosa*



Dornpolster-  
Steppe

*Ranunculus  
brevifolius*



Dornpolster-  
Steppe  
*Acantholimon*,  
*Pedicularis  
cadmea* und  
*Geranium  
cinereum*



Dedegöl Dağ  
Gipfel

